

# COVID-19 a zdravie obličiek: aký dopad môže mať infekcia a koho sledovať

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.05.2026

Pandémia COVID-19 mohla u mnohých ľudí vyvolať „krízový“ nárast problémov s obličkami. Podľa štúdie na viac než 3 miliónoch pacientov publikovanej v časopise *Communications Medicine* mali ľudia po COVID-19 vyššie riziko viacerých komplikácií v porovnaní s obdobím po chrípke: akútne poškodenie obličiek (AKI), vznik alebo zhoršenie chronického ochorenia obličiek (CKD) a tiež vyššie riziko progresie k zlyhaniu obličiek.

Tento článok prináša praktickejšie pohľady v podobe Q&A, kde nefrológ vysvetľuje, kto je najviac ohrozený, ako rýchlo sa môžu objaviť komplikácie a prečo je dôležité na obličky myslieť aj po „prekonaní“ infekcie.

## Pre koho je riziko najvyššie

Najväčší podiel komplikácií sa týka pacientov so závažným priebehom COVID-19, ale riziko nie je obmedzené len na túto skupinu. O problémoch s obličkami môže hovoriť aj to, že sa AKI v údajoch spomína najmä v prvých šiestich mesiacoch po infekcii SARS-CoV-2.

CKD býva často bezpríznakové: podľa článku sa až u veľkej časti pacientov neprejaví „viditeľne“, kým sa nezachytí pri bežných laboratórnych testoch. Typicky sa pritom pri CKD môžu odhaliť napríklad diabetická nefropatia, obezitná glomerulopatia alebo poškodenie obličiek pri hypertenzii.

## Aké ochorenia obličiek môže COVID-19 spustiť alebo zhoršiť

Infekcia nerobí vždy jednu jedinú diagnózu. Spektrum je široké: od akútneho poškodenia obličkových kanálikov až po rôzne zápalové a imunitne sprostredkované glomerulové ochorenia. Časť prípadov sa môže prejavíť agresívnejšími formami glomerulárneho poškodenia.

Článok zároveň zdôrazňuje, že častejšie ide o situácie, keď má človek už určitú zraniteľnosť alebo predispozíciu, a infekcia pôsobí ako spúšťač. Ako príklad spomína zvýšenú náchylnosť pri niektorých genetických variantoch (APOL1) a súvis s tzv. COVID-19-asociovanou nefropatiou.

## Kedy sa môžu objaviť problémy po infekcii

Načasovanie nie je rovnaké u všetkých. U niektorých pacientov sa prejavy môžu objaviť skoro, u iných sa imunitná odpoveď môže „ťahat“ v čase a klinické problémy sa môžu rozvinúť v priebehu týždňov až mesiacov. V časti prípadov môže dôjsť aj k úplnému návratu funkcie, keď imunitná aktivita utíchne.

## Kto by mal byť cielenejšie sledovaný

Článok odporúča, aby klinici zostali pozorní aj pri anamnéze COVID-19. Prakticky sa uvádza sledovanie močového nálezu:

- **spot močový pomer albumín/kreatinín (UACR)**, ktorý zachytí aj subtílnejšiu mikroalbuminúriu,
- a popri tom detailná anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, vrátane sledovania nového alebo zhoršujúceho sa tlaku krvi, diabetu a aj jemného, pretrvávajúceho poklesu funkcie obličiek v bežných kontrolných laboratórnych testoch.

Dôležitý je aj rodinný výskyt ochorení obličiek, kde môže byť na mieste úvaha o genetickom posúdení v selektovaných situáciách.

## Prečo je skoré nefrologické vyšetrenie také podstatné

Ak sa problém zachytí včas, môže to znamenať rozdiel medzi „manažovateľnou“ chronickou situáciou a progresiou k zlyhaniu obličiek. Článok zdôrazňuje, že liečebné možnosti sa v posledných rokoch výrazne rozšírili a skorý kontakt s nefrológom môže pacientovi zabezpečiť prístup k terapiám, k liečbe komplikácií a v niektorých diagnózach aj k intervenciám, ktoré menia dlhodobé výsledky.

## Nestačí len štandardná podporná liečba

Základ v manažmente CKD tvoria aj tradičné skupiny liekov (RAAS inhibítory, SGLT2 inhibítory, GLP-1 agonisty a MRA), ale článok upozorňuje, že rozhodujúce je aj pochopenie príčiny CKD. Ak je etiológia nejasná, má byť nižší prah na doplnenie vyšetrení, vrátane úvahy o biopsii obličiek, najmä ak je prítomná významná proteinúria a nie je jasná diabetická genéza.

## Ako dlho sledovať pacientov s komplikáciami po COVID-19

Kľúčová je kontinuita starostlivosti. Ide o dlhodobé ochorenie a výsledky môžu byť lepšie, keď pacient zostáva v pravidelnom, dlhodobo vedenom režime: kontrolné odbery, adherencia k liekom, úpravy životného štýlu.

Dôležitý je aj kardiovaskulárny aspekt, pretože fyzická kondícia a celkové zdravie často významne ovplyvňujú priebeh CKD.

## Vplyv aktuálnych variantov COVID-19

Článok uvádza, že súčasné kmene zvyčajne nevedú k takému rozsiahlemu renálnemu poškodzovaniu ako niektoré skoršie varianty počas vrcholu pandémie. Dopad sa zdá byť vo všeobecnosti miernejší, podobne ako sa mení správanie vírusov v čase. Napriek tomu vzhľadom na veľký počet infekcií na populácii aj malé zvýšenie individuálneho rizika môže znamenať reálne zdravotné zaťaženie, najmä u ľudí s chronickými ochoreniami.

---

**Zdroj:** *Infectious Disease Advisor (Renal and Urology News)* – „COVID-19 and Kidney Health Effects“. [Link na zdroj](#).

**Upozornenie:** Tento článok bol osobne spracovaný aj s pomocou rozličných nástrojov tzv. umelej inteligencie (AI).

---

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=covid-19-a-zdravie-obliciek-dopad-infekcie-sledovanie> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.