


# Kazuisticky: Ako zvládnuť hyperkaliémiu pri CKD a srdcovom zlyhávaní tak, aby sme neznižovali účinnú liečbu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Draslík sa dá riešiť samostatne — účinnú liečbu tak nie je nutné oslabiť.

V praxi narážame na rovnaký problém znova a znova: pacient má chronické obličkové ochorenie a zároveň srdcové zlyhávanie, je kandidát na liečbu založenú na RAAS inhibícii (ACEi/ARB) a často aj MRA (napr. spironolaktón). Lenže. Hyperkaliémia naháňa strach, klinici liečbu obmedzujú alebo prerušujú a tým pacient prichádza o liečbu, ktorá zlepšuje prognózu.

Tento článok vychádza zo vzdelávacej aktivity „Case-Based Approach: Managing Hyperkalemia in Patients With CKD and Heart Failure“ a prekladá jej hlavné myšlienky do praktického, kazuistického rámca.<sup>[1]</sup>

## Kazuistika na začiatok: 45-ročná žena s CKD 3b a HFrEF (NYHA II)

V aktivite sa začína prípadom 45-ročnej ženy s CKD 3b, eGFR < 40 ml/min, proteinúriou a súbežným srdcovým zlyhávaním NYHA II. Pacientka prichádza s veľkou obavou: „Mám CKD aj srdce. A keď mi stúpne draslík, čo potom?“

Pointa kazuistiky je, že obava z hyperkaliémie vedie k podliečeniu. V aktivite sa zdôrazňuje, že RAAS inhibítory sú základ znižovania kardiorenálneho rizika, no hyperkaliémia často bráni ich optimálnemu nasadeniu či udržaniu.<sup>[1]</sup>

## Kľúčový prelom v myslení: hyperkaliémia nemá automaticky zastaviť RAAS liečbu

V aktivite zaznieva, že pokyny (KDIGO 2024) majú jasný odkaz: hyperkaliémia by sama o sebe nemala byť dôvodom na ukončenie RAAS inhibície. Logika je jednoduchá a klinicky veľmi dôležitá:

1. **GDMT (guideline-directed medical therapy) zlepšuje morbiditu aj mortalitu,**

2. **k hyperkaliémii sa má pristúpiť aktívne**, nie ústupom zo základnej kardioprotektívnej liečby,
3. praktický postup je **udržať RAAS/MRA** a k tomu pridať **liečbu viažucu draslík** (plus tam, kde dáva zmysel, aj diuretiká na podporu exkrécie draslíka).<sup>[1]</sup>

V tejto logike sa hyperkaliémia prestáva riešiť ako „dôvod stopnúť“, a začína sa riešiť ako „dôvod doplniť správny nástroj“.

## Prečo je problém aj v poddiagnostikovaní a nedostatočnej eskalácii liečby

Jedným z „tvrdých“ argumentov v aktivite je register CARE-HK v populácii s HFrEF a častým pokročilejším CKD (napr. CKD 3b, eGFR < 40). V kazuistickej časti sa interpretuje, že:

- **RAASi alebo MRA neboli adekvátne využité u zhruba jednej tretiny** pacientov,
- **obavy z hyperkaliémie** sú podľa autorov hlavným dôvodom,
- hyperkaliemické epizódy sa ukazujú ako **rekurentné** a zároveň sa pozoruje **nízke používanie draslík-viažucích liekov**,
- s poklesom renálnych funkcií ďalej klesá optimalizácia GDMT a v pokročilých štádiách je podiel pacientov na odporúčanej liečbe alarmujúco nízky.<sup>[1]</sup>

Kazuistický záver je teda dvojitý: nie je to len otázka „čo urobiť pri jednej epizóde“, ale aj „čo urobiť, aby sa pacient nedostal do začarovaného kruhu podliečenia“.

## Potassium bindery: mechanizmy nie sú rovnaké, preto sa líšia aj bezpečnostné signály

Aktivita postavila praktické porovnanie dvoch moderných draslík-viažucích látok: **patiromer** a **sodium zirconium cyclosilicate (SZC)**.

### Rozdiel v mechanizme (a čo z toho môže byť klinicky)

- **Patiromer**: výmena draslíka za vápnik (calcium–potassium exchange).
- **SZC**: výmena draslíka za sodík (sodium–potassium exchange). V aktivite sa uvádza, že pri porovnateľných dávkach môže byť sodíkové zaťaženie klinicky relevantnou protihodnotou.<sup>[1]</sup>

Z toho vyplýva klinicky relevantná otázka: ak SZC prináša viac sodíka, môže to u niektorých pacientov zhoršiť retenciu tekutín a vyvolať alebo zhoršiť srdcové zlyhávanie.

### Bezpečnostné signály pre SZC (edém, zhoršenie HF)

Aktivita spomína, že v menších randomizovaných štúdiách aj v pooled analýzach sa pri SZC v populácii s neobjasneným alebo už prítomným HF objavoval signál pre zhoršenie srdcového zlyhávania a edémové udalosti, čo sa premietlo aj do regulačných aktualizácií.<sup>[1]</sup>

## Realita z trialov: REALIZE-K (SZC) vs. DIAMOND (patiromer)

### REALIZE-K (SZC) pri spironolaktóne

V REALIZE-K sa SZC používal v kontexte, kde mali pacienti udržať alebo pokračovať v liečbe spironolaktónom aj napriek riziku hyperkaliémie. V aktivite sa zdôrazňuje, že sa pozorovali bezpečnostné udalosti spojené so srdcovým zlyhávaním a viedlo to k zvýšeniu závažných nežiaducich príhod (serious adverse events) pre srdcové zlyhávanie.<sup>[1]</sup>

### DIAMOND (patiromer) a natriuretický profil

Ako kontrast sa spomína DIAMOND: pri patiromeri boli v subanalýze zaznamenané poklesy NT-proBNP v čase, ktoré sú konzistentné s očakávaným efektom pri dobre manažovanej neurohormonálnej liečbe u pacientov s HFrEF.<sup>[1]</sup>

Praktický význam: ak pacient potrebuje MRA a RAAS terapiu, výber draslík-viažucej liečby môže mať nielen vplyv na draslík, ale aj na kardiovaskulárnu toleranciu a bezpečnosť.

## Take-home message pre kliniku

- **RAAS blokádu neukončovať len kvôli hyperkaliémii**, ak sa dá pokračovať s podporou liečby viažucej draslík.<sup>[1]</sup>
- **Preklenúť strach z draslíka** správnou liečbou a monitoringom, aby pacient reálne dostal a udržal GDMT.
- **Multidisciplinárna spolupráca** (kardiológ, nefrológ, internista) je pri výbere vhodného binderu kľúčová, lebo bezpečnostné signály a mechanizmy nie sú rovnaké.

---

**Zdroj:** Medtelligence CE na ReachMD, „Case-Based Approach: Managing Hyperkalemia in Patients With CKD and Heart Failure“. [Zdroj aktivity](#).

---

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kazuistika-hyperkaliemia-ckd-hf-zachovanie-raas> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.