

# Cálculo Diferencial e Integral en Varias Variables

Mauro Polenta Mora

## Ejercicio 5

### Consigna

Representar geométricamente los complejos:

1.  $(1 + i)^n - (1 - i)^n$ , para algunos valores naturales  $n$
2. Las raíces quintas de 1: los  $z$  tales que  $z^5 = 1$
3. Las raíces décimas de 1
4. Los  $z$  tales que  $z^6 = 8(\sqrt{3} - i)$

### Resolución

#### Parte 1

Consideremos la notación polar de los siguientes complejos:

- $i + 1 = \sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i}$
- $i - 1 = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i}$

Por lo tanto el complejo que queremos representar es:

$$\begin{aligned}
& (\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}i})^n - (\sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{4}i})^n \\
& \quad =(\text{operatoria}) \\
& \sqrt{2}^n e^{n\frac{\pi}{4}i} - \sqrt{2}^n e^{-n\frac{\pi}{4}i} \\
& \quad =(\text{operatoria}) \\
& \sqrt{2}^n (e^{n\frac{\pi}{4}i} - e^{-n\frac{\pi}{4}i}) \\
& \quad =(\text{notación binómica}) \\
& \sqrt{2}^n \left( \left( \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) + i\text{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right) - \left( \cos\left(\frac{-n\pi}{4}\right) + i\text{sen}\left(\frac{-n\pi}{4}\right) \right) \right) \\
& \quad =(\text{usando que } \cos(-\theta)=\cos(\theta), \text{sen}(-\theta)=-\text{sen}(\theta)) \\
& \sqrt{2}^n \left( \left( \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) + i\text{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right) - \left( \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) - i\text{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right) \right) \\
& \quad =(\text{operatoria}) \\
& \sqrt{2}^n 2i\text{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right)
\end{aligned}$$

**Observación:** Con respecto a la propiedad  $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$ ,  $\text{sen}(-\theta) = -\text{sen}(\theta)$ . Quizás parezca que es complicado recordar esto, pero nos simplificó mucho las cuentas (incluso de otra forma quizás no salían) y no es tan difícil de ver. Gráficar las funciones seno y coseno nos permiten ver visualmente dichas igualdades.

Entonces con esta expresión, podemos calcular fácilmente cualquier potencia de la expresión.

- $n = 1 \rightarrow \sqrt{2} \cdot 2i\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot 2i\frac{\sqrt{2}}{2} = 2i$
- $n = 2 \rightarrow \sqrt{2}^2 \cdot 2i\text{sen}\left(\frac{2\pi}{4}\right) = 4i \cdot 1 = 4i$
- $n = 3 \rightarrow \sqrt{2}^3 \cdot 2i\text{sen}\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot 4i\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -4i$
- $n = 4 \rightarrow \sqrt{2}^4 \cdot 2i\text{sen}(\pi) = 8i(0) = 0$

Y así sucesivamente. La representación geométrica de esto es todo sobre la recta de los imaginarios, pues por la fórmula hallada solo tenemos parte imaginaria.

## Parte 4

Queremos representar los  $z$  tales que  $z^6 = 8(\sqrt{3} - i)$ .

Para esto hallemos la notación polar de  $8(\sqrt{3} - i)$ :

- $8(\sqrt{3} - i) = 8\sqrt{3} - 8i$

Por lo tanto tenemos que:

- Módulo:  $\sqrt{8\sqrt{3}^2 + 8^2} = \sqrt{256} = 16$
- Argumento:  $\arctan\left(\frac{-8}{8\sqrt{3}}\right) = \arctan\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = \arctan\left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{-\pi}{6}$

Por lo tanto queremos hallar un  $z = re^{i\theta}$  que cumpla lo siguiente:

- $r^6 e^{i6\theta} = 16e^{i\frac{\pi}{6}}$

Esto deriva en las siguientes ecuaciones:

Figura 1

Figure 1: Figura 1

- $r^6 = 16 \rightarrow r = \sqrt[6]{16}$
- $6\theta = \frac{-\pi}{6} + 2k\pi \rightarrow \theta = \frac{-\pi}{36} + \frac{k\pi}{3}$  con  $k \in \mathbb{Z}$

De donde obtenemos las raíces sextas de  $8(\sqrt{3} - i)$ :

- $z_0 = \sqrt[6]{16}e^{i\frac{-\pi}{36}}$
- $z_1 = \sqrt[6]{16}e^{i(\frac{-\pi}{36} + \frac{\pi}{3})}$
- $z_2 = \sqrt[6]{16}e^{i(\frac{-\pi}{36} + \frac{2\pi}{3})}$
- $z_3 = \sqrt[6]{16}e^{i(\frac{-\pi}{36} + \pi)}$
- $z_4 = \sqrt[6]{16}e^{i(\frac{-\pi}{36} + \frac{4\pi}{3})}$
- $z_5 = \sqrt[6]{16}e^{i(\frac{-\pi}{36} + \frac{5\pi}{3})}$

La imagen de lo que hallamos sería algo así (no encontré una imagen mejor):