

Ejercicio 6

Consigna

Sean $\mathcal{A} = \{1, t + 1, (t + 1)^2\}$ y $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 2, 3), (3, 2, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}_2[t]$ y \mathbb{R}^3 respectivamente. Consideramos $T : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineal tal que:

$${}_{\mathcal{B}}(T)_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Dado $q_0(t) = t^2 + t - 1, \forall t \in \mathbb{R}$, hallar $T(q_0)$.

Resolución

La idea es exactamente la misma que el ejercicio 5, primero quiero hallar las coordenadas en la base de partida de q_0 :

$$\begin{aligned} \text{coord}_{\mathcal{A}}(t^2 + t - 1) &= c_1(1) + c_2(t + 1) + c_3(t + 1)^2 \\ &= c_1(1) + c_2(t + 1) + c_3(t^2 + 2t + 1) \end{aligned}$$

Esto plantea el siguiente sistema:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Entonces:

- $c_3 = 1$
- $c_2 = 1 - 2c_3 = -1$
- $c_1 = -1$

$$\text{coord}_{\mathcal{A}}(t^2 + t - 1) = (-1, -1, 1)$$

Utilicemos la propiedad:

$$\text{coord}_{\mathcal{B}}(T(t^2 + t - 1)) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\text{coord}_{\mathcal{B}}(T(t^2 + t - 1)) = (-2, -3, 0)$$

Entonces resta “eliminar” las coordenadas, es decir:

$$T(t^2 + t - 1) = -2 \cdot (1, 1, 0) - 3 \cdot (1, 2, 3) = (-5, -8, -9)$$

Entonces la respuesta es:

$$T(t^2 + t - 1) = (-5, -8, -9)$$