

# Lógica

Mauro Polenta Mora

## Ejercicio 6

### Consigna

1. Sabemos que para toda sentencia  $\sigma$  y estructura  $A$  del tipo adecuado se cumple que  $A \models \sigma$  o  $A \models \neg\sigma$ . Muestre que esta propiedad no vale para  $\sigma$  con  $FV(\sigma) \neq \emptyset$ .
2. Muestre que ni aún para el caso en que  $\sigma$  sea una sentencia vale que  $\models \sigma$  o  $\models \neg\sigma$ .

### Resolución

#### Parte 1

Para esta parte queremos buscar una fórmula  $\sigma \in FORM_A$  tal que  $FV(\sigma) \neq \emptyset$  y una estructura  $A$  del tipo adecuado como contraejemplo, tal que se cumplen las siguientes afirmaciones:

1.  $A \not\models \sigma$
2.  $A \not\models \neg\sigma$

Veamos que significan ambas según la definición de  $\models$ :

1. Existe  $v^A$  tal que  $v^A(cl(\sigma)) = 0$
2. Existe  $v^A$  tal que  $v^A(cl(\neg\sigma)) = 0$

A partir de esto, establezcamos una estructura y la sentencia que vamos a usar:

- $A = \langle \mathbb{N}, Primo, +, 0 \rangle$  con el alfabeto predeterminado  $(P_1, f_1, c_1)$
- $\sigma = P_1(x)$

Ahora, veamos que podemos decir sobre  $A \models \sigma$ :

$$\begin{aligned}
& A \models P_1(x) \\
& \iff (\text{definición de } \models) \\
& v^A(cl(P_1(x))) = 1 \\
& \iff (\text{definición de clausura}) \\
& v^A((\forall x)P_1(x)) = 1 \\
& \iff (\text{como } v^A \text{ es una interpretación}) \\
& \min\{v^A(P_1(x)[\bar{n}/x]) \mid n \in \mathbb{N}\} = 1 \\
& \iff (\text{considerando el 4}) \\
& \text{ABSURDO! Pues 4 no es primo}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la suposición inicial fue incorrecta, esto implica que  $A \not\models \sigma$ . Veamos que podemos decir ahora sobre  $A \models \neg\sigma$ :

$$\begin{aligned}
& A \models \neg P_1(x) \\
& \iff (\text{definición de } \models) \\
& v^A(cl(\neg P_1(x))) = 1 \\
& \iff (\text{definición de clausura}) \\
& v^A((\forall x)\neg P_1(x)) = 1 \\
& \iff (\text{como } v^A \text{ es una interpretación}) \\
& \min\{v^A(\neg P_1(x)[\bar{n}/x]) \mid n \in \mathbb{N}\} = 1 \\
& \iff (\text{considerando el 2}) \\
& v^A(\neg P_1(\bar{2})) = 1 \\
& \iff (\text{como } v^A \text{ es una interpretación}) \\
& 1 - v^A(P_1(\bar{2})) = 1 \\
& \iff (\text{aritmética}) \\
& v^A(P_1(\bar{2})) = 0 \\
& \iff (v^A(P_1(\bar{2}))=1) \\
& \text{ABSURDO!}
\end{aligned}$$

Lo que escribimos parece más complicado de lo que realmente es, pero básicamente llegamos a que “2 es primo” es una afirmación **FALSA** a partir de nuestras hipótesis, lo cual es claramente absurdo. Esto implica que  $A \not\models \sigma$ .

Con esto concluimos la prueba de la primer parte.

## Parte 2

Para esta parte queremos ver que dada una sentencia  $\sigma \in SENT$ , tenemos que las siguientes afirmaciones se cumplen simultaneamente:

1.  $\not\models \sigma$
2.  $\not\models \neg\sigma$

Esto significa que lo que queremos probar es que existen dos estructuras  $A, B$  del tipo adecuado que cumple lo siguiente:

1.  $v^A(\sigma) = 0$
2.  $v^B(\neg\sigma) = 0$

Consideremos  $\sigma = (\forall x)P_1(x)$  y veamos ambas subpartes:

### Subparte 1

Consideremos para este caso lo siguiente:

- $A = \langle \mathbb{N}, \text{Primo}, +, 0 \rangle$  con el alfabeto predeterminado  $(P_1, f_1, c_1)$

Ya probamos en la parte anterior que  $v^A(\sigma) = 0$

### Subparte 2

- $B = \langle \mathbb{R}, \text{Negativo}, +, 1 \rangle$  con el alfabeto predeterminado  $(P_1, f_1, c_1)$ .

Donde negativo (unario) contiene todos los números negativos.

Probemos que  $v^B(\sigma) = 0$

$$\begin{aligned}
 & v^B((\forall x)P_1(x)) \\
 & = (\text{como } v^A \text{ es una interpretación}) \\
 & \min\{v^B(P_1(\bar{y})) \mid y \in \mathbb{R}\} \\
 & = (\text{considerando el 1}) \\
 & 0
 \end{aligned}$$

Esto concluye la prueba de la segunda parte.