



Владелец животного **Шевелева** Полина Викторовна, телефон **+7 (913) 145-77-51**, e-mail: poly.sheveleva@gmail.com, адрес г. Омск. ул. Волочаевская, д. 15А, кв. 54.

Пациент **453743**, кличка **Роня** (), вид Собака, пол Сука, порода Цвергшнауцер, возраст 9 лет 7 мес., масса тела 8.35.

### **Заключение ветеринарного врача-невролога No 453743-2023/5557**

**Причина обращения:** Состояние стабильное, как будто бы немного стала слабее ЛТК. Видимых ухудшений не отмечают. Нистагм сохраняется, на приёме у эндокринолога 7.10 отсутствовал, потом снова появился. Пересдавали анализы - ухудшение показателей печени, эндокринолог рекомендовал пересдать через 3-4 недели.

Аппетит: сохранен

Жажда: повышенная (800 мл в сутки)

МИ: повышенное, порции больше, частота не изменена

Дефекация: норма, стул оформленный

Рвота: нет

Метипред по 1 таб 2 раза в день в течение 9 дней.

**Проведенная диагностика, технические или лечебные работы:** ВСО розовые, СНК 1,5 сек

ПЛУ не увеличены

Тургор кожи не изменен

Брюшная стенка при пальпации умеренно напряжена, б/болезненна

Пульс на б/а хорошего наполнения

Пальпаторно температура конечностей одинакова

Уровень сознания, ментальный статус - норма

Сохраняется спонтанный горизонтальный нистагм, субъективно реже

Остальные РЧМН - норма

Проприорецепция нарушена на ПТК

Тонус, моторика хвоста - норма

Тонус + рефлекс анального сфинктера - норма

Дискомфорт при пальпации краниального ГОП

Дискомфорта при пальпации в месте предполагаемого дискоспондилита нет

**Дополнительно:** Вес - 8,35 кг

Клиндамицин отменить

1) Цитозар (300 мг/м<sup>2</sup> на курс) 500 мг/флакон - 31 мг за раз, 4 инъекции.

\* флакон 500 развести на 10 мл физ.раствора, перемешать. Из полученного раствора набрать 0,6 мл и выполнить инъекцию. Всего необходимо выполнить 4 инъекции с промежутком 12 часов. После окончания курса (4 укола) остатки препарата утилизировать. Хранить разведенным при комнатной температуре.

2) Метипред 4 мг/таб - по 1 таб 2 раза в день, до 14 дней, далее по 1/2 таблетки 2 раза в день, 2 недели, затем по 1/2 таблетки 1 раз в день, 2 недели, затем отменить

3) Азатиоприн 50 мг/капс - внутрь по 1/3 капс 1 раз в день, 3 недели, затем по 1/3 капс 1 раз в 2 дня.

ПОВТОРНАЯ МРТ ГОЛОВЫ + КОНТРАСТ ЧЕРЕЗ 2 МЕС

10.10.2023

Ветеринарный врач-хирург, невролог **Думанская Анастасия Романовна**