

# Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ) – versione provvisoria

PROVVISORIO – testo del modulo FisioScience, diverso dalla versione italiana validata (Galeoto G. et al., MLTJ 2019).

Nome e cognome (o codice): \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                  | Non del tutto         | Leggermente           | Moderatamente         | Abbastanza severo     | Molto severo          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Dolore/rigidità durante il giorno. Quanto grave è stato il tuo solito dolore e/o rigidità articolare o muscolare in generale durante il giorno nelle ultime due settimane?                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Dolore/rigidità durante la notte. Quanto grave è stato il tuo solito dolore e/o rigidità articolare o muscolare in generale durante la notte nelle ultime due settimane?                                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Cammino. Quanto hanno interferito i tuoi sintomi con la tua abilità nel camminare nelle ultime due settimane?                                                                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Lavarsi/vestirsi. Quanto hanno interferito i tuoi sintomi con la tua abilità nel lavarti o vestirti nelle ultime due settimane?                                                                                               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Livello di attività fisica. Quanto è stato problematico fare attività fisica (es. uscire per una camminata o jogging) al livello che desideri a causa della sintomatologia articolare e muscolare nelle ultime due settimane? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Lavoro/routine quotidiana. Quanto ha interferito la tua sintomatologia articolare o muscolare con il tuo lavoro o routine quotidiana nelle ultime due settimane? (incluso professione e lavori in casa)                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                             | Non del tutto         | Leggermente           | Moderatamente         | Abbastanza severo     | Molto severo          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7. Attività sociali e hobbies. Quanto ha interferito la tua sintomatologia articolare o muscolare con le tue attività quotidiane e hobbies nelle ultime due settimane?                                                                                      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8. Bisogno di aiuto. Quanto spesso hai avuto bisogno di aiuto da altri (incluso familiari, amici o caregivers) a causa della sintomatologia articolare e muscolare nelle ultime due settimane?                                                              | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9. Sonno. Quanto spesso hai avuto problemi nell'addormentarti o nel restare addormentato a causa della sintomatologia articolare e muscolare nelle ultime due settimane?                                                                                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10. Stanchezza o basse energie. Quanta stanchezza o basse energie hai percepito nelle ultime due settimane?                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11. Benessere emozionale. Quante volte hai percepito ansia o sei stato di basso umore a causa della sintomatologia articolare e muscolare nelle ultime due settimane?                                                                                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12. Comprensione delle proprie condizioni e qualsiasi trattamento in corso. Pensando alla tua sintomatologia articolare o muscolare, come senti di comprendere la tua condizione e qualsiasi trattamento in corso (incluso diagnosi e terapia)?             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 13. Confidenza nell'essere capace di gestire i tuoi sintomi. Quanto ti sei sentito confidente nell'essere capace di gestire da solo la tua sintomatologia articolare o muscolare nelle ultime due settimane? (es. medicazioni, cambio di stile di vita...)? | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Non del tutto      Leggermente      Moderatamente      **Abbastanza  
severo**      Molto severo

14. Impatto complessivo. Quanto ti ha infastidito complessivamente la tua sintomatologia articolare o muscolare nelle ultime due settimane?



*Livelli di attività fisica*

**AF. Nelle precedenti settimane, quanti giorni hai fatto un totale di 30 minuti o più di attività fisica che è stata abbastanza da aumentare la frequenza del battito cardiaco? Questo può includere sport, esercizi e camminata veloce o ciclismo, sia per raggiungere un posto che per attività ricreativa, ma non dovrebbe includere lavori domestici o attività fisica che fa parte del tuo lavoro**

- ☐ Niente
- ☐ 1 giorno
- ☐ 2 giorni
- ☐ 3 giorni
- ☐ 4 giorni
- ☐ 5 giorni
- ☐ 6 giorni
- ☐ 7 giorni