

Matematyka stosowana i metody numeryczne

Konspekt z wykładu

10 Całkowanie numeryczne

Wzory całkowania numerycznego pozwalają na obliczenie przybliżonej wartości całki:

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Podstawiając w miejsce funkcji podcałkowej $f(x)$ wielomian algebraiczny

$$\varphi(x) = f_0 N_0(x) + f_1 N_1(x) + \dots + f_n N_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i N_i(x)$$

otrzymamy tzw. wzór kwadraturowy.

10.1 Kwadratura całkowania

Wzorem kwadraturowym (kwadraturą) nazywamy:

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b \varphi(x) dx = \sum_{i=0}^n f_i \int_a^b N_i(x) dx = \sum_{i=0}^n w_i f_i = S(f)$$

w którym

$$w_i = \int_a^b N_i(x) dx, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$$

są tzw. współczynnikami wagowymi (wagami). Wartość w_i określa wielkość udziału rzędnej $f_i \equiv f(x_i)$ w wartości całej sumy $S(f)$.

W zależności od sposobu postępowania przy wyborze położenia węzłów interpolacji w przedziale całkowania kwadratury dzielimy na dwie grupy:

1. kwadratury Newtona - Cotesa, węzły są rozmieszczone równomiernie w całym przedziale całkowania (zamknięte końce)
2. kwadratury Gaussa, węzły są rozmieszczone nierównomiernie, tak aby zminimalizować błąd kwadratury (otwarte końce)

10.2 Kwadratury Newtona - Cotessa

10.2.1 Wzór prostokątów

Po zastosowaniu interpolacji funkcji podcałkowej $f(x)$ za pomocą wielomianu

$$\varphi(x) = f(x_0) = \text{const.}$$

otrzymujemy

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b f(x_0) dx \rightarrow S(f) = (b-a) f(x_0) \quad (1)$$

W zależności od wyboru położenia węzła x_0 otrzymujemy wzory:

a) lewych prostokątów, gdy $x_0 = a$

b) środkowych prostokątów, gdy $x_0 = (a+b)/2$

c) prawych prostokątów, gdy $x_0 = b$

10.2.2 Wzór trapezów

Jeśli do interpolacji funkcji $f(x)$ zastosujemy interpolację za pomocą wielomianu liniowego Lagrange'a, to otrzymamy wzór kwadraturowy, nazywany wzorem trapezów.

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b [f_0 L_0 + f_1 L_1] dx = \\ &\int_a^b \left[f(a) \frac{x-b}{a-b} + f(b) \frac{x-a}{b-a} \right] dx \rightarrow S(f) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \end{aligned} \quad (2)$$

10.2.3 Wzór Simpsona

Zastosowanie kwadratowej interpolacji Lagrange'a prowadzi do wzoru:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b [f_0 L_0 + f_1 L_1 + f_2 L_2] dx = \\ &\int_a^b \left[f_0 \frac{(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)} + f_1 \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)} + f_2 \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)} \right] dx \end{aligned}$$

Ostatecznie kwadratura (wzór) Simpsona przyjmuje postać:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{1}{3} h (f_0 + 4 f_1 + f_2) = S(f), \quad h = \frac{b-a}{2} \quad (3)$$

Wzór Simpsona jest rzędu czwartego, co oznacza, że jest dokładny nie tylko dla wielomianów stopnia drugiego, lecz także dla wielomianów stopnia trzeciego tzn. $I(W_3) = S(W_3)$ oraz $I(W_4) \neq S(W_4)$

10.3 Kwadratury Gaussa

Dokładność kwadratury można zwiększyć rezygnując z warunku równomiernego rozmieszczenia węzłów interpolacji. Wartości wag oraz położenia węzłów całkowania ustala się tak aby kwadratura całkowania przybliżona była wzorem dokładnym dla jednomianu możliwie wysokiego stopnia.

$$\sum_{i=0}^n w_i x_i^k = \int_a^b x^k dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 2n+1$$

W praktyce wagi i punkty Gaussa nie wyznacza się z powyższego warunku. Są one stabilizowane dla rodziny pewnych wielomianów ortogonalnych (z wagą) w przedziale $< -1, 1 >$.

$l.p.$	$\xi_i, \quad i = 0, \dots, n$	$w_i, \quad i = 0, \dots, n$
1	$\xi_0 = 0$	$w_0 = 2$
2	$\xi_0 = +1/\sqrt{3}$ $\xi_1 = -1/\sqrt{3}$	$w_0 = 1$ $w_1 = 1$
3	$\xi_0 = +\sqrt{0.6}$ $\xi_1 = 0$ $\xi_2 = -\sqrt{0.6}$	$w_0 = 5/9$ $w_1 = 8/9$ $w_2 = 5/9$
4	$\xi_0 = +0.86113631$ $\xi_1 = +0.33998104$ $\xi_2 = -0.33998104$ $\xi_3 = -0.86113631$	$w_0 = 0.34785485$ $w_1 = 0.65214515$ $w_2 = 0.65214515$ $w_3 = 0.34785485$

W ogólnym przypadku gdy liczymy całkę z dowolnego przedziału (a, b) , konieczna jest transformacja liniowa między danym przedziałem a przedziałem $< -1, 1 >$, tak aby można było zastosować dane z tabeli. Wzory na transformację $(a, b) \rightarrow < -1, 1 >$

$$\xi = \frac{2x - a - b}{b - a} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2}\xi$$

$$d\xi = \frac{2}{b - a}dx \quad \Leftrightarrow \quad dx = \frac{b - a}{2}d\xi$$

co daje:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b - a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2}\xi\right) d\xi$$

oraz wzór kwadraturowy Gaussa:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{2} \sum_{i=0}^n w_i f\left(\frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2}\xi_i\right). \quad (4)$$

Przykład:

Obliczyć $S(f) = \int_a^b f(x)$ gdy $f(x) = 4 \cdot x^3 + 5 \cdot x^2 + 1$ dla $a = -1.0$, $b = 1.0$, co oznacza, że $h = b - a = 2$.

Zastosować dwupunktową metodę Gaussa ($n = 1$):

Rozwiązanie:

$$w_0 = w_1 = 1, \quad \xi_0 = 1/\sqrt{3}, \quad \xi_1 = -1/\sqrt{3}$$

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^1 w_i f(\xi_i) = \\ &= \frac{b-a}{2} \left[f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{a+b}{2} - \frac{b-a}{2} \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right] = 5.33333 \end{aligned}$$

Wyniki dla przedstawianych wzorów:

Wartość dokładna	$I(f)$	= 5.3333
Wzór	Postać kwadratury	Wartość
prostokątów:		
lewych	$S(f) = h f(a)$	= 4
środkowych	$S(f) = h f\left(\frac{a+b}{2}\right)$	= 2
prawych	$S(f) = h f(b)$	= 20
trapezów	$S(f) = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)]$	= 12
Simpsona	$S(f) = \frac{1}{3} \frac{h}{2} [f(a) + 4 f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)]$	= 5.3333
Gaussa dla $n = 1$	$S(f) = \frac{b-a}{2} \sum_{i=0}^1 w_i f(\xi_i)$	= 5.3333

10.4 Wzory złożone (sumacyjne)

Bardzo skutecznym sposobem podwyższania dokładności całkowania numerycznego jest dokonanie podziału przedziału $[a, b]$ na podprzedziały $[a_j, b_j]$, $j = 1, 2, \dots, N$ przy zachowaniu związków:

$$a_1 = a, \quad b_N = b, \quad b_i = a_{i+1}, \quad i = 1, 2, \dots, N-1.$$

Teraz można zapisać:

$$I(f) = \int_a^b f(x) dx = \sum_{j=1}^N \int_{a_j}^{b_j} f(x) dx = I_1(f) + I_2(f) + \dots + I_N(f) \quad (5)$$

Do obliczania każdego składnika $I_i(f)$ sumy można wykorzystać dowolny wzór kwadraturowy.

10.4.1 Metoda lewych, środkowych i prawych prostokątów

$$(a) \quad \int_a^b f(x) dx \approx H \sum_{j=1}^N f(x_{j-1}) = H (f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_{N-1})$$

$$(b) \quad \int_a^b f(x) dx \approx H \sum_{j=1}^N f\left(\frac{x_j - x_{j-1}}{2}\right) = H (f_{01} + f_{12} + f_{23} + \dots + f_{N-1N})$$

gdzie $f_{j-1j} = f\left(\frac{x_{j-1}+x_j}{2}\right), \quad j = 1, 2, \dots, N$

$$(c) \quad \int_a^b f(x)dx \approx H \sum_{j=1}^N f(x_j) = H(f_1 + f_2 + \dots + f_N)$$

10.4.2 Metoda trapezów

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{2}H \sum_{j=1}^N [f(x_{j-1}) + f(x_j)] = H \left(\frac{1}{2}f_0 + f_1 + f_2 + \dots + \frac{1}{2}f_N \right)$$

lub

$$\int_a^b f(x)dx \approx H \left[\frac{1}{2}f_0 + \sum_{j=1}^{N-1} f_j + \frac{1}{2}f_N \right]$$

10.4.3 Metoda Simpsona

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{3}H [(f_0 + f_N) + 4(f_1 + f_3 + \dots + f_{N-1}) + 2(f_2 + f_4 + \dots + f_{N-2})],$$

przy czym $H = (x_N - x_0)/N$, (N musi być liczbą parzystą).

10.4.4 Metoda Gaussa

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{1}{2} \frac{b-a}{N} \sum_{j=1}^N \sum_{i=0}^{lpc=2} w_i f(X_i),$$

gdzie

$$X_i = \frac{x_j + x_{j+1}}{2} + \frac{x_{j+1} - x_j}{2} \xi_i.$$

11 Różniczkowanie numeryczne

Zadanie różniczkowania numerycznego polega na obliczeniu wartości pochodnych k -tego rzędu funkcji $y = f(x)$, za pomocą wzorów przybliżonych tzw. wzorów różnicowych. Są to wzory służące do obliczenia pochodnej w węźle i za pomocą znanych wartości funkcji w innych węzłach, np.: mamy dane wartości funkcji $f(x_0)$, $f(x_1)$, $f(x_2)$ w równo oddalonych węzłach x_0 , x_1 , x_2 , należy zbudować wzory różnicowe do obliczenia pierwszej i drugiej pochodnej w węzłach $x_i, i = 0, 1, 2$.

11.1 Rozwinięcie funkcji w szereg Taylora

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2}h^2 f''(x) + \frac{1}{6}h^3 f'''(x) + \frac{1}{24}h^4 f^{IV}(x) + \dots$$

11.1.1 Centralne wzory różnicowe

$$f'_1 = \frac{1}{2h} (-f_0 + f_2), \quad f''_1 = \frac{1}{h^2} (f_0 - 2f_1 + f_2)$$

11.1.2 Iloraz wprzód

$$f'_0 = \frac{1}{2h} (-3 f_0 + 4 f_1 - f_2), \quad f''_0 = \frac{1}{h^2} (f_0 - 2 f_1 + f_2)$$

11.1.3 Iloraz wstecz

$$f'_2 = \frac{1}{2h} (f_0 - 4 f_1 + 3 f_2), \quad f''_2 = \frac{1}{h^2} (f_0 - 2 f_1 + f_2)$$