

АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ

Встреч не было.

Р Ы Б Ы

Гигантская акула - *Cetorhinus maximus* Gennerus.

Одинокая молодая акула была добыта В.И. Пушкарёвым 12 октября 1964 г. в Колвицкой губе. Длина ее 340 см, вес без внутренностей - 225 кг. Подобную же по длине (350 см) и весу (280 кг) акулу в ноябре 1964 г. добыли около села Уйбы. Надо отметить, что со слов кандалакшских старожилов (Е.Г. Чалков и др.) акулы, попадая в вершину Кандалакшского залива, обычно заходят в Колвицкую губу, где их и удастся наблюдать. В марте там иногда отлавливали отдельных рыбешек на крючки с наживкой из тюленьего сала (1947 - 1953 г.г.).

Гигантская акула достоверно встречена в Белом море впервые. А.И. Андрияшев (1954) в книге "Рыбы северных морей СССР" пишет, что гигантская акула в настоящее время лишь в редких случаях заходит до Мурмана и малочисленна у берегов Норвегии, где 100-150 лет назад ее регулярно промышляли.

Сельдь. Промыслового лова не было. Впервые после ряда лет запрета была разрешена ловля сельди частными лицами (в специально отведенных местах).

Трехиглая колюшка. Подход на икрометание трехиглой колюшки к берегам Северного архипелага был поздний и очень слабый. Судя по поведению полярных крачек, колюшка подходила к берегам у Седловатой луды и у о. Горелого. У внутренних островов архипелага ее почти не наблюдали.

МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

КИТОБРАЗНЫЕ

Белуха. В Бабьем море отмечена дважды в сентябре (3 и 5) повидимому, один и тот же зверь. В октябре наблюдались здесь же два зверя 10/X и по одному 17/X и 23/X.

В Великой Салме против губы Нильма наблюдались три белухи 22 июля.

Морская свинья. В данном году в районе острова Великого не наблюдалась.

ЛАСТОНОГИЕ

Морской заяц. Встречается крайне редко, одна-две особи на 15-20 км маршрута. В Бабьем море держалось не более 3-5 зверей. Более двух зверей одновременно наблюдать не приходилось.

Нерпа. Численность нерпы, как и морского зайца, была очень низкой. Большей частью встречались одиночные звери и как исключение до 5 штук (о. В. Величалка). В октябре численность несколько возросла, в это время можно было встретить одновременно по 2-5 зверей в одном месте.

Приведенные данные свидетельствуют, что численность морских млекопитающих в районе о. Великого и Кемь-луд была в настоящем году самой низкой из всех 8 последних лет, нам известных. Все это обуславливалось, в первую очередь, тем, что в данном районе почти отсутствовали сельдь и треска, которые являются основным объектом питания этих животных.

ЗЕМНОВОДНЫЕ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, РЫБЫ, БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Специальных наблюдений за этими группами животных, как в предыдущие годы, не проводилось. Зоологические наблюдения за беспозвоночными сведены в таблицу (смотри календарь природы).

Остромордая лягушка. Лягушки на озерах начали кричать с 19 мая, но кладок икры еще нет. 27 мая отмечены первые кладки икры на озере в 42 квартале. 7 июня отмечено начало выклева головастиков из икры, которые к 15 июня достигли размера до 1 см.

Обыкновенная гадюка. Отмечена всего лишь один раз 23 июля возле бани Городецкого порога. Исходя из описания буровато-охристой окраски с хорошо выраженной темной полосой в виде елочки по спинной стороне. Длина тела 25 см.

Ливородящая ящерица. 14 мая возле старой лодки под ящиком с битым стеклом в гнилой трухе стружек обнаружены 2 ящерицы по видимому ♀ и ♂. Из-за низкой температуры движения очень вялые, и животные кажутся полуживыми. Внесенные в теплое помещение, они "ожили" и стали активными. Внесенные и выпущенные на снег через 1,5 минуты становились вновь неподвижными. 9 августа отмечена ящерица на влажной мочажине осокового болота. 15 августа в 73 квартале на берегу возле квартального столба молодая ящерица размером 3,5 см.

Корюшка. Перест в Белой губе проходил 19-21 мая. 27 мая в ручье удалось поймать только трех самцов. Корюшка шла исключительно только в Куляжий ручей. 18 мая отмечен массовый заход в ручей Неткенской губы.

Куляка. В Куляжий ручей осенью не заходила.

Колоска. Перестового похода к берегам не наблюдалось.

Треска. В течение всего года почти не ловилась и захода на обычные места нагула не отмечено.

Навага. В течение всего года ловилась нежная рыба размером 10-18 см. Перест наваги проходил с конца декабря до середины февраля. Улов был значительно лучше, чем в зиму 1963-64 года.

Сельдь. Подхода сельди в район острова не отмечалось.