## PHEH.

Сельдь. В 1984 году наблюдали массовый подход сельди к островам внутри архипелага. Ее здесь отмечали с середины июня и почти до середины сентября. В июле серебристые чайки ею кормили своих птенцов. На луде Головинке два птенца из трех при кольцевании отрыгнули сельдь: один – 3 шт. длиной по 10-12 см, второй – I шт. шириной в области грудных плавников 4-5 см.

В августе - октябре в большом количестве сельдь отмечали между г.Кандалакшей и о.Оленьим. В это время ее в массе ловили на удочку на акватории порта и у отводящего канала Нивских ГЭС.

Треска. У островов внутри Северного архипелага на удочку начала ловиться 2 июня (Возчиков В.И.). Как и в прошлом году, подход ее к островам был средний; ловилась на удочку до конца августа.

Навага. В 1984 году подход наваги был слабым. На удочку она начала ловиться у островов в районе Лувеньги — в июле, внутри Северного архипелага — в августе. И в обоих случаях кратковременно.

Трехиглая колюшка. В луже на литорали восточного берега о.Лодейного 22 мая Шутова Е.В. видела около 20 рыбок. В дальнейшем колюшку нигде не отмечали.

Песчанка. В 1984 году отмечен небольшой подход ее к островам. 21 июня на Песчаной луде (район Роговых луд) у гнезда полярной крачки лежала свежая рыбка; 25 июля небольшой косяк песчанок (рыбки выпрыгивали из воды близко у лодки) наблюдали в Восточной Ряжковской салме между Лодейным и Деменихой; 2 сентября Муляренко С.П. на песке у бонов в Южной губе о. Ряжкова нашел одну свежую рыбку.

## РЫБЫ

Корюшка. В 1984 году нерест корюшки в Кумяжьем ручье о.Велипроходил с 8 по II мая, что на 9 дней раньше обычных сроков. В дугих ручьях западного побережья о.Великого нерестящиеся корюне встречены.

## БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

## Насекомые

Осенняя пяденица. В последней пятидневке июля в 24 квартале великого начался лет осенней пяденицы. ЗІ июля эти бабочки в все встречались в березняках у побережья Лебяжьей губы. Лет пящи продолжался весь август и сентябрь. Во второй декаде сентря особенно много пяденицы встречали в лесу близ устья Кумяжьручья. 23 сентября массовый лет бабочек завершился, а одиночески встречались, практически, в течение всей первой декады встря.

Комар-долгоножка Бр. В 1984 году комары-долгоножки веречались в большом количестве. Первые небольшие скопления навережья каличьей губы во второй пятидневке сентября, а 15 сенбря их была масса. Обычно долгоножки сидели на травянистой расвельности и потревоженные проходящим человеком поднимались в
верхух, образуя своеобразное облако. К 23 сентября количество долвесжек значительно сократилось и в последней пятидневке месяца
исчезли.

Высокую численность долгоножек отмечали вдесь и осенью прош-