

11 Ecorregiones del Perú

Conceptos generales de las ecorregiones

«Ecorregión» = área geográfica con condiciones homogéneas

Explicación

Una ecorregión es un área geográfica donde determinadas condiciones naturales presentan características relativamente semejantes. Estas condiciones incluyen clima, flora, fauna, recursos hídricos y características del suelo. El concepto permite estudiar el territorio considerando sus relaciones ecológicas. Por ejemplo, el Mar Frío posee condiciones ambientales diferentes de las existentes en la Amazonía peruana.

«Antonio Brack Egg» propuso las ecorregiones peruanas

Explicación

Antonio Brack Egg fue un investigador peruano que desarrolló la clasificación de las once ecorregiones del Perú. Su propuesta buscó explicar la diversidad natural del territorio mediante características ecológicas. La clasificación es utilizada en la enseñanza de la geografía peruana. Por ejemplo, Brack identificó al Mar Tropical y al Mar Frío como ecorregiones distintas.

Las «ecorregiones» emplean criterios naturales

Explicación

La clasificación de las ecorregiones peruanas se fundamenta en criterios naturales, es decir, características propias del medio físico y biológico. Entre estos criterios destacan el clima, relieve, flora, fauna, hidrografía y suelo. Esto permite diferenciar espacios con funcionamiento ecológico particular. Por ejemplo, la presencia de especies y condiciones climáticas ayuda a distinguir la Puna del Bosque Tropical Amazónico.

«Ecotono» es una zona de transición ecológica

Explicación

Un ecotono es el espacio donde se produce la transición entre dos ecosistemas o comunidades ecológicas diferentes. Puede presentar características y especies provenientes de las zonas que conecta. Por ello, constituye una zona importante para estudiar cambios ambientales graduales. Por ejemplo, un espacio de transición entre un bosque y un área de pastizales puede funcionar como ecotono.

Las «11 ecorregiones» abarcan todo el Perú

Explicación

La propuesta de Antonio Brack Egg reconoce once ecorregiones distribuidas entre ambientes marinos, costeros, andinos y amazónicos. Esta clasificación evidencia la gran diversidad natural del territorio peruano. Cada ecorregión presenta combinaciones particulares de clima, relieve, flora y fauna. Por ejemplo, el Perú incluye ambientes tan diferentes como el Mar Tropical, la Puna y la Sabana de Palmeras.

Ecorregiones marítimas

«Mar Tropical» presenta temperaturas de 21°C a 24°C

Explicación

El Mar Tropical se caracteriza por presentar aguas cálidas, con temperaturas aproximadas de 21 °C a 24 °C. Se encuentra principalmente frente al extremo norte del litoral peruano y está relacionado con la influencia de aguas cálidas. Estas condiciones favorecen una fauna marina particular. Por ejemplo, las aguas tropicales de Tumbes permiten la presencia de especies asociadas a ambientes cálidos.

«Mar Tropical» presenta coloración azulada

Explicación

Las aguas del Mar Tropical presentan una coloración predominantemente azulada, característica asociada a sus condiciones oceanográficas. Esta ecorregión se extiende principalmente frente a Tumbes y Piura. Sus condiciones cálidas permiten una diversidad diferente de la observada en el mar peruano frío. Por ejemplo, la zona marina frente a Tumbes presenta características tropicales que favorecen especies como peces espada y pericos.

«Mar Tropical» alberga manglares

Explicación

Los manglares constituyen una formación vegetal característica de ambientes tropicales costeros y aparecen asociados al Mar Tropical peruano. Se desarrollan en zonas donde existe influencia marina y condiciones apropiadas de temperatura y humedad. Los manglares proporcionan refugio y alimento a diversas especies. Por ejemplo, los manglares de Tumbes forman un ecosistema donde interactúan plantas, aves, peces y otros organismos.

«Mar Tropical» incluye aves fragata

Explicación

El Mar Tropical presenta especies animales adaptadas a condiciones marinas cálidas, entre ellas el ave fragata. Esta ave marina posee gran capacidad para desplazarse sobre ambientes costeros y oceánicos. Su presencia forma parte de la fauna característica de esta ecorregión. Por ejemplo, una fragata puede observarse sobrevolando zonas costeras tropicales en busca de oportunidades para alimentarse.

«Mar Frío» presenta temperaturas de 17°C a 19°C

Explicación

El Mar Frío presenta aguas con temperaturas aproximadas de 17 °C a 19 °C y se relaciona con la corriente peruana o de Humboldt. Sus condiciones favorecen una elevada productividad biológica. Esta ecorregión se extiende ampliamente por el litoral peruano. Por ejemplo, las aguas frente a la costa central presentan características frías asociadas a la corriente de Humboldt.

«Corriente de Humboldt» caracteriza al Mar Frío

Explicación

La corriente de Humboldt es una corriente marina fría que influye decisivamente en las condiciones del litoral peruano. Transporta aguas frías y contribuye a mantener temperaturas relativamente bajas en el mar. Su influencia favorece la productividad marina. Por ejemplo, las aguas frías frente a la costa peruana permiten condiciones favorables para organismos que sostienen importantes cadenas alimentarias.

«Fitoplancton» contribuye a la productividad del Mar Frío

Explicación

El fitoplancton está formado por organismos microscópicos acuáticos capaces de realizar fotosíntesis y constituye una base fundamental de las cadenas alimentarias marinas. Su abundancia favorece la presencia de otros organismos. En el Mar Frío, las condiciones oceanográficas favorecen su desarrollo. Por ejemplo, una gran disponibilidad de fitoplancton puede sostener poblaciones abundantes de peces pequeños.

«Afloramiento» lleva nutrientes hacia la superficie marina

Explicación

El afloramiento es el ascenso de aguas profundas hacia la superficie del océano. Estas aguas pueden transportar nutrientes que favorecen el crecimiento del fitoplancton y aumentan la productividad marina. El fenómeno es especialmente importante en el mar peruano. Por ejemplo, cuando aguas profundas ricas en nutrientes ascienden, pueden favorecer una mayor disponibilidad de alimento para organismos marinos.

«Mar Frío» alberga anchoveta y bonito

Explicación

La fauna del Mar Frío incluye especies de importancia ecológica y económica, entre ellas la anchoveta y el bonito. Estas especies forman parte de las redes alimentarias marinas y se relacionan con la elevada productividad de este ambiente. Por ejemplo, la anchoveta constituye alimento para numerosos depredadores marinos y aves que habitan el litoral peruano.

Ecorregiones de la costa norte

«Bosque Seco Ecuatorial» presenta clima cálido muy seco

Explicación

El Bosque Seco Ecuatorial posee un clima cálido y muy seco, con una marcada estacionalidad de las precipitaciones. Su vegetación está adaptada a periodos prolongados de escasez de agua. Esta ecorregión se desarrolla principalmente en sectores del norte peruano. Por ejemplo, especies como el algarrobo pueden sobrevivir en ambientes donde las lluvias son estacionales.

«Bosque Seco Ecuatorial» recibe lluvias estivales

Explicación

Las precipitaciones del Bosque Seco Ecuatorial se concentran principalmente durante el verano, generando una marcada diferencia entre la estación lluviosa y la seca. Esta estacionalidad condiciona la vegetación y las actividades ecológicas de la zona. Por ejemplo, durante la temporada lluviosa algunas plantas incrementan rápidamente su crecimiento aprovechando la disponibilidad temporal de agua.

«Bosque Seco Ecuatorial» incluye el valle del Marañón

Explicación

El Bosque Seco Ecuatorial comprende sectores asociados al valle del Marañón, además de áreas del norte peruano. Su distribución está relacionada con determinadas condiciones climáticas y de relieve. Esta presencia demuestra que una ecorregión puede extenderse por espacios geográficos que no necesariamente forman una superficie uniforme. Por ejemplo, sectores secos del valle del Marañón presentan vegetación adaptada a la escasez de agua.

«Algarrobo» caracteriza al Bosque Seco Ecuatorial

Explicación

El algarrobo es una especie vegetal adaptada a las condiciones secas del norte peruano y constituye un elemento característico del Bosque Seco Ecuatorial. Su adaptación le permite desarrollarse en ambientes donde el agua disponible es limitada durante parte del año. Por ejemplo, los algarrobales del norte pueden mantenerse durante periodos secos y aprovechar las lluvias estacionales.

«Bosque Tropical del Pacífico» presenta clima tropical lluvioso

Explicación

El Bosque Tropical del Pacífico presenta un clima tropical lluvioso, con condiciones de humedad que favorecen el desarrollo de una vegetación abundante. Se localiza en el extremo norte del territorio peruano, especialmente en Tumbes. Por ejemplo, las precipitaciones y temperaturas de Tumbes permiten el crecimiento de árboles tropicales de gran tamaño.

«Bosque Tropical del Pacífico» posee árboles grandes

Explicación

La elevada humedad y las condiciones tropicales del Bosque Tropical del Pacífico favorecen el desarrollo de árboles de gran tamaño. Esta vegetación contribuye a formar una estructura forestal compleja que proporciona refugio y alimento a numerosas especies. Por ejemplo, árboles como el cedro y la caoba pueden formar parte de este ambiente forestal tropical.

«Bosque Tropical del Pacífico» se ubica en Tumbes

Explicación

El Bosque Tropical del Pacífico se encuentra en el extremo noroccidental del Perú, principalmente en el departamento de Tumbes. Su localización está vinculada a las condiciones tropicales y lluviosas de esta zona. Por ejemplo, el bosque de Tumbes presenta un ambiente diferente al desierto costero situado más al sur.

«Mono coto de Tumbes» habita el bosque tropical

Explicación

El mono coto de Tumbes forma parte de la fauna característica del Bosque Tropical del Pacífico. Esta especie se encuentra asociada a ambientes forestales tropicales y depende de la vegetación para obtener alimento y refugio. Su presencia permite reconocer la diversidad biológica de esta ecorregión. Por ejemplo, puede desplazarse entre los árboles del bosque en búsqueda de alimento.

Ecorregiones de la costa centro-sur y vertiente occidental

«Desierto del Pacífico» presenta clima semicálido seco

Explicación

El Desierto del Pacífico se caracteriza por un clima semicálido y seco, condicionado por la escasez de precipitaciones y las características del litoral peruano. Aunque es predominantemente árido, contiene ambientes particulares que permiten la vida. Por ejemplo, durante el invierno la humedad atmosférica puede favorecer la formación de garúas y el desarrollo temporal de vegetación en las lomas.

«Desierto del Pacífico» presenta garúas invernales

Explicación

Las garúas invernales son precipitaciones muy finas características de sectores de la costa peruana. A pesar de que el Desierto del Pacífico recibe poca lluvia, esta humedad atmosférica puede proporcionar agua suficiente para determinados organismos. Por ejemplo, las garúas contribuyen a mantener temporalmente la vegetación de las lomas costeras durante el invierno.

«Lomas» aprovechan la humedad invernal costera

Explicación

Las lomas son formaciones vegetales que aparecen en determinados sectores desérticos de la costa gracias a la humedad atmosférica, especialmente durante el invierno. Esta condición permite la presencia temporal de plantas y animales. Por ejemplo, las lomas pueden reverdecer durante la temporada húmeda y posteriormente perder gran parte de esa vegetación cuando disminuye la humedad.

«Suelos yermosólicos» caracterizan sectores desérticos

Explicación

Los suelos yermosólicos son asociados a ambientes áridos donde la disponibilidad de agua es reducida y el desarrollo del suelo presenta características propias de zonas desérticas. Se encuentran vinculados a sectores del Desierto del Pacífico. Por ejemplo, determinados espacios costeros presentan suelos poco desarrollados debido a las condiciones extremadamente secas del ambiente.

«Serranía Esteparia» comprende altitudes de 1000 a 3000 metros

Explicación

La Serranía Esteparia se desarrolla en sectores de la vertiente occidental andina aproximadamente entre los 1000 y 3000 metros de altitud. La elevación modifica progresivamente las condiciones climáticas y la vegetación. Por ejemplo, una localidad situada a 2500 metros puede presentar condiciones ambientales propias de esta ecorregión, diferentes de las existentes en la costa.

«Serranía Esteparia» presenta clima templado subhúmedo

Explicación

La Serranía Esteparia presenta un clima templado subhúmedo, con condiciones intermedias entre ambientes áridos y zonas más húmedas. Las precipitaciones se concentran principalmente durante el verano. Esta combinación climática permite el desarrollo de diversas especies vegetales. Por ejemplo, el molle puede desarrollarse en sectores de esta ecorregión donde existe mayor disponibilidad estacional de agua.

«Serranía Esteparia» recibe precipitaciones estivales

Explicación

Las precipitaciones de la Serranía Esteparia se concentran principalmente durante el verano. Esta distribución estacional del agua influye directamente en la vegetación y en las condiciones de vida de la fauna. Durante la temporada lluviosa aumenta la disponibilidad hídrica. Por ejemplo, algunas plantas aprovechan las lluvias de verano para desarrollar hojas y estructuras reproductivas.

«Serranía Esteparia» alberga venado, puma y oso andino

Explicación

La fauna de la Serranía Esteparia incluye especies como el venado, el puma y el oso andino. Estas especies ocupan distintos niveles y funciones dentro de las comunidades ecológicas de la vertiente occidental. Su presencia refleja la diversidad biológica asociada a los ambientes montañosos. Por ejemplo, el puma actúa como depredador dentro de las redes alimentarias de la región.

Ecorregiones altoandinas y de montaña

«Páramo» presenta clima frío muy húmedo

Explicación

El Páramo es una ecorregión caracterizada por condiciones frías y muy húmedas, localizada principalmente en sectores altos del norte peruano. Su elevada humedad permite el desarrollo de una vegetación adaptada a ambientes montañosos. Por ejemplo, sectores de Cajamarca presentan condiciones que permiten reconocer características propias del páramo.

«Páramo» incluye tapir andino y musaraña

Explicación

La fauna del Páramo incluye especies adaptadas a sus condiciones frías y húmedas, como el tapir andino y determinadas musarañas. Estas especies dependen de los ambientes de montaña para obtener alimento, refugio y condiciones adecuadas de supervivencia. Por ejemplo, el tapir andino utiliza áreas de vegetación natural del páramo para desplazarse y alimentarse.

«Páramo» presenta orquídeas y bromelias

Explicación

Entre la flora característica del Páramo se encuentran orquídeas y bromelias, grupos vegetales capaces de desarrollarse bajo condiciones de humedad elevada. Estas plantas contribuyen a la diversidad de los ecosistemas montañosos del norte peruano. Por ejemplo, una bromelia puede crecer sobre otras superficies vegetales y aprovechar la humedad ambiental característica de esta ecorregión.

Entre 3000m y 3800m predomina clima frío

Explicación

En el esquema de las ecorregiones altoandinas, el intervalo aproximado de 3000 a 3800 metros se relaciona con condiciones de clima frío. La altitud modifica la temperatura y las condiciones ecológicas de las montañas. Por ejemplo, una localidad situada alrededor de 3500 metros experimenta temperaturas más bajas que otra ubicada cerca del nivel del mar.

Entre 3800m y 5000m predomina clima frígido

Explicación

Entre aproximadamente 3800 y 5000 metros de altitud predominan condiciones de clima frígido, caracterizadas por temperaturas considerablemente bajas. El aumento de altitud genera ambientes cada vez más rigurosos para plantas y animales. Por ejemplo, una zona situada a 4500 metros presenta condiciones térmicas mucho más extremas que un valle ubicado a menor altitud.

Sobre 5000m predomina clima gélido

Explicación

Por encima de aproximadamente 5000 metros se presentan condiciones de clima gélido, asociadas a temperaturas extremadamente bajas y ambientes de alta montaña. La vida vegetal se vuelve progresivamente más limitada debido a estas condiciones. Por ejemplo, las zonas cercanas a las cumbres más elevadas presentan superficies con nieve o hielo durante determinados periodos.

«Puna y Altos Andes» presenta flora adaptada

Explicación

La Puna y los Altos Andes poseen una flora adaptada a las condiciones frías, secas y elevadas de la cordillera. Entre las especies y formas vegetales características se encuentran el queñual, la puya Raimondi, las plantas almohadillas, el ichu y los musgos. Por ejemplo, el ichu puede desarrollarse en extensas áreas altoandinas sometidas a bajas temperaturas.

«Puna y Altos Andes» alberga auquénidos

Explicación

Los auquénidos forman parte de la fauna característica de la Puna y los Altos Andes. Estos animales presentan adaptaciones que les permiten vivir en ambientes de gran altitud y temperaturas bajas. Por ejemplo, la vicuña, uno de los camélidos sudamericanos, puede desplazarse y alimentarse en los pastizales altoandinos.

«Puna y Altos Andes» incluye parihuanas y suri

Explicación

La fauna de la Puna y los Altos Andes incluye aves como la parihuana y el suri. Estas especies se encuentran adaptadas a ambientes altoandinos y participan en las comunidades ecológicas de la región. Por ejemplo, las parihuanas pueden encontrarse asociadas a cuerpos de agua ubicados en ambientes elevados de la cordillera.

Ecorregiones amazónicas

«Yungas» se extiende aproximadamente entre 1000 y 400m

Explicación

Las Yungas o Selva Alta ocupan sectores de la vertiente oriental de los Andes y, según el esquema estudiado, se encuentran aproximadamente entre los 1000 y 400 metros de altitud. Esta posición favorece ambientes húmedos y una vegetación abundante. Por ejemplo, una ladera oriental andina puede presentar bosques densos característicos de las Yungas.

«Yungas» presenta clima semicálido muy húmedo

Explicación

Las Yungas presentan un clima semicálido y muy húmedo debido a su ubicación en la vertiente oriental andina y a la abundante humedad disponible. Estas condiciones favorecen una gran diversidad vegetal. Por ejemplo, las orquídeas pueden desarrollarse en los bosques húmedos de la Selva Alta gracias a la elevada disponibilidad de humedad.

«Yungas» presenta valles longitudinales y pongos

Explicación

El relieve de las Yungas incluye valles longitudinales y pongos, formas relacionadas con la fuerte disección del relieve andino por los ríos. Un pongo es un paso estrecho y profundo por donde un río atraviesa una zona montañosa. Por ejemplo, los ríos de la vertiente oriental atraviesan sectores estrechos de montaña antes de ingresar hacia la Amazonía.

«Yungas» alberga orquídeas y tunquis

Explicación

Las Yungas poseen una elevada diversidad de flora y fauna, incluyendo orquídeas y el tunqui o gallito de las rocas. La humedad y el relieve favorecen numerosos hábitats dentro de esta ecorregión. Por ejemplo, el tunqui puede encontrarse en bosques húmedos de la vertiente oriental andina, donde utiliza sectores forestales para refugio y reproducción.

«Bosque Tropical Amazónico» se ubica entre 400m y 80m

Explicación

El Bosque Tropical Amazónico se desarrolla en sectores bajos de la vertiente oriental, aproximadamente entre los 400 y 80 metros de altitud según el esquema. Su baja elevación favorece condiciones cálidas y húmedas. Por ejemplo, las zonas bajas de la Amazonía peruana presentan extensos bosques tropicales asociados a una red de ríos.

«Bosque Tropical Amazónico» presenta clima cálido muy húmedo

Explicación

El Bosque Tropical Amazónico presenta un clima cálido y muy húmedo, con abundante disponibilidad de agua y condiciones favorables para el crecimiento vegetal. Estas características permiten el desarrollo de bosques extensos y biodiversos. Por ejemplo, las temperaturas cálidas y la humedad de la Amazonía favorecen una vegetación densa durante gran parte del año.

«Bosque Tropical Amazónico» posee gran extensión

Explicación

El Bosque Tropical Amazónico constituye una ecorregión extensa dentro del territorio peruano y ocupa gran parte de las tierras bajas orientales. Su amplitud permite la existencia de numerosos ambientes y comunidades biológicas. Por ejemplo, dentro de esta ecorregión pueden encontrarse diferentes tipos de bosques y ambientes asociados a ríos y quebradas.

«Bosque Tropical Amazónico» posee actividad petrolera

Explicación

El Bosque Tropical Amazónico contiene recursos naturales que han favorecido actividades económicas como la explotación petrolera. Estas actividades forman parte del aprovechamiento de recursos existentes en la región amazónica. Por ejemplo, determinadas zonas de la Amazonía peruana poseen yacimientos de hidrocarburos que han sido objeto de exploración y explotación.

«Bosque Tropical Amazónico» posee actividad maderera

Explicación

La actividad maderera constituye otro aprovechamiento económico relacionado con los recursos forestales del Bosque Tropical Amazónico. La gran cantidad de especies arbóreas hace que la madera sea un recurso de interés económico. Por ejemplo, determinadas especies forestales pueden ser aprovechadas para obtener madera destinada a diferentes usos productivos.

«Bosque Tropical Amazónico» presenta elevada biodiversidad

Explicación

La biodiversidad del Bosque Tropical Amazónico es muy elevada debido a la variedad de especies y ambientes presentes en esta ecorregión. La diversidad incluye numerosos grupos de plantas y animales. Por ejemplo, en los bosques amazónicos pueden encontrarse primates, felinos, serpientes, aves, anfibios y una gran variedad de especies vegetales.

«Sabana de Palmeras» se localiza en Madre de Dios

Explicación

La Sabana de Palmeras se localiza en el departamento de Madre de Dios, específicamente en el sector asociado a las pampas del río Heath. Esta ecorregión presenta características diferentes de las áreas de bosque amazónico continuo. Por ejemplo, las Pampas del Heath constituyen uno de los espacios más representativos de esta ecorregión en el Perú.

«Sabana de Palmeras» es una ecorregión pequeña

Explicación

La Sabana de Palmeras ocupa una extensión relativamente pequeña dentro de la selva peruana en comparación con el Bosque Tropical Amazónico. Su reducido tamaño no significa que tenga poca importancia ecológica, pues posee comunidades biológicas particulares. Por ejemplo, las Pampas del Heath contienen ambientes abiertos que contrastan con los bosques densos de otras zonas amazónicas.

«Sabana de Palmeras» presenta precipitaciones estacionales

Explicación

La Sabana de Palmeras presenta precipitaciones estacionales, es decir, las lluvias se concentran en determinados periodos del año. Esta variación en la disponibilidad de agua influye directamente en la vegetación y en la formación de pastizales. Por ejemplo, durante la temporada lluviosa los pastizales pueden desarrollarse con mayor intensidad debido al aumento temporal del agua disponible.

«Sabana de Palmeras» presenta pastizales

Explicación

Los pastizales constituyen una característica importante de la Sabana de Palmeras y se relacionan con su régimen estacional de lluvias. Estas áreas abiertas contrastan con los bosques amazónicos densos. Por ejemplo, durante la estación húmeda los pastizales pueden presentar una cobertura vegetal abundante que sirve de alimento para distintos animales.

«Sabana de Palmeras» alberga lobo de crin

Explicación

El lobo de crin forma parte de la fauna asociada a la Sabana de Palmeras, ambiente caracterizado por espacios abiertos y pastizales. Su presencia diferencia esta comunidad de otros ambientes amazónicos predominantemente boscosos. Por ejemplo, un animal adaptado a espacios abiertos puede desplazarse por los pastizales de la sabana en búsqueda de alimento.

«Sabana de Palmeras» alberga ciervo de los pantanos

Explicación

El ciervo de los pantanos es una especie asociada a ambientes húmedos y abiertos de la Sabana de Palmeras. Su presencia está relacionada con zonas donde existe vegetación y disponibilidad de agua. Por ejemplo, puede utilizar áreas cercanas a ambientes pantanosos y pastizales para alimentarse y desplazarse.

«Sabana de Palmeras» incluye Tucán gigante

Explicación

El Tucán gigante forma parte de la fauna señalada para la Sabana de Palmeras. Esta ave se integra en las comunidades biológicas de la ecorregión y depende de los recursos disponibles en su ambiente. Por ejemplo, puede utilizar árboles y sectores de vegetación para desplazarse, alimentarse y encontrar refugio.

Características de la vegetación

«Perennifolio» conserva sus hojas durante todo año

Explicación

Una planta perennifolia es aquella que conserva sus hojas durante todo el año, aunque puede reemplazarlas gradualmente. No significa que cada hoja individual viva indefinidamente, sino que el follaje permanece presente de manera continua. Por ejemplo, un árbol perennifolio mantiene una apariencia verde durante las distintas estaciones.

«Caducifolio» pierde sus hojas periódicamente

Explicación

Una planta caducifolia pierde sus hojas durante una etapa determinada de su ciclo anual, generalmente como respuesta a condiciones ambientales desfavorables. Posteriormente desarrolla nuevo follaje cuando las condiciones mejoran. Por ejemplo, un árbol caducifolio puede perder sus hojas durante una estación seca y recuperarlas cuando vuelve a disponer de agua.

Distribución y características comparativas

«Mar Tropical» se ubica al norte del litoral peruano

Explicación

El Mar Tropical se localiza en el extremo norte del litoral peruano, principalmente frente a Tumbes y Piura. Su posición geográfica explica parte de sus características cálidas y tropicales. Por ejemplo, el sector marino frente a Tumbes presenta condiciones ambientales distintas de las aguas frías predominantes en gran parte del litoral peruano.

«Mar Frío» se extiende ampliamente por el litoral peruano

Explicación

El Mar Frío ocupa una amplia extensión del litoral peruano y está asociado principalmente a la influencia de la corriente de Humboldt. Sus aguas frías y productivas sostienen una gran diversidad de organismos. Por ejemplo, la anchoveta encuentra condiciones favorables en este ambiente debido a la disponibilidad de alimento generada por su elevada productividad.

«Puna» corresponde a ambientes altoandinos

Explicación

La Puna corresponde a ambientes de gran altitud ubicados en los Andes, donde predominan condiciones climáticas frías y vegetación adaptada. Forma parte de las ecorregiones altoandinas propuestas para el territorio peruano. Por ejemplo, los extensos pajonales dominados por ichu son característicos de numerosos sectores de la Puna.

«Amazonía» concentra ecorregiones húmedas y cálidas

Explicación

Las ecorregiones amazónicas del Perú presentan, en términos generales, condiciones de elevada humedad y temperaturas cálidas o semicálidas. Estas características favorecen una gran diversidad de organismos. Por ejemplo, las Yungas presentan bosques húmedos en las laderas orientales, mientras que las tierras bajas amazónicas presentan extensos bosques tropicales.

«Costa» reúne ecorregiones áridas y tropicales

Explicación

La costa peruana no presenta un único ambiente ecológico, sino diversas ecorregiones que incluyen sectores tropicales y áreas predominantemente áridas. El contraste se explica por las diferencias climáticas y geográficas existentes a lo largo del litoral. Por ejemplo, el Bosque Tropical del Pacífico de Tumbes contrasta con el Desierto del Pacífico de la costa central.

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20