

انواع ترس در کودکان

به طور کلی ترس در کودکان را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد : ۱. ترس های طبیعی و لازمه دوران رشد و ۲. ترس های نابهنجار

ترس های رایج در دوران طفولیت، کودکی و نوجوانی

۶-۰ ماهگی: از دست دادن حمایت بدنی / صدای بلند

۱۲-۷ ماهگی: غریبه ها / چیزهای ناگهانی، غیر منتظره و ترسناک

۱ سالگی: جدایی از والدین / آسیب دیدگی والدین / توالت رفتن / غریبه ها

۲ سالگی: صداهای بلند / حیوانات / اتاق تاریک / جدایی از والدین / اشیاء یا ماشین های بزرگ / تغییر در محیط شخصی

۳ سالگی: ماسک ها / تاریکی / حیوانات / جدایی از والدین

۴ سالگی: جدایی از والدین / حیوانات / تاریکی / صداها

۵ سالگی: حیوانات / آدم های «بد» / تاریکی / جدایی از والدین / آسیب بدنی

۶ سالگی: موجودات فوق طبیعی (ارواح و جادوگران) / صدمات بدنی / رعد و برق / تنها خوابیدن و تنها ماندن در خانه / جدایی از والدین

۸-۷ سالگی: موجودات فوق طبیعی / تاریک / احضار روح / تنها ماندن در خانه / آسیب بدنی

۱۲-۹ سالگی: آزمون ها و امتحانات در مدرسه / عملکرد تحصیلی / آسیب بدنی / ظاهر جسمی / رعد و برق / مرگ

نوجوانی: روابط شخصی / ظاهر شخصی / مدرسه / پیامدهای سیاسی / آینده / حیوانات / پدیده های فوق طبیعی / بلایا طبیعی / ایمنی

چه ترس هایی در کودکان نابهنجار تلقی می شوند و باید بر آنها عنوان ترس مرضی (فوبی) گذاشت؟ روان شناسان و روان پزشکان خصوصاتی را برای ترس های نابهنجار کودکی به شرح زیر قایل می شوند:

۱. متناسب با شرایط و موقعیت نیست: به عنوان مثال ترس از اتاق تاریک، از جمله ترس های بهنجار و شایع کودکان در سنین ۲، ۳ و ۴ سالگی است. وضعیت نابهنجار ترس از تاریکی در کودکی که دچار فوبی است به این شکل ظاهر می شود که وقتی کودک در اتاق تاریک قرار گرفت از شدت ترس به خود می لرزد، واکنشی شبیه به هراس از خود نشان می دهد، فریاد می کشد و قادر نیست حتی برای چند لحظه در اتاق تاریک باقی بماند.
 ۲. دلیلی برای ترس نمی شود ارایه کرد و با استدلال از بین نمی رود: به عنوان مثال ترس شدید از رفتن به دستشویی در کودکی ممکن است بدون ارتباط با هیچ محرک ترسناک مشخصی حادث شده باشد و کودک دلایل ارایه شده از سوی والدین را مبنی بر بی خطر بودن محیط دستشویی نمی پذیرد.
 ۳. شدت ترس به میزانی است که منجر به اجتناب از موقعیت ترس آور می شود: مثلاً اگر کودک از محیط مدرسه یا حمام می ترسد این ترس به قدری شدید است که از رفتن به مدرسه یا حمام امتناع می ورزد.
 ۴. ترس به شکلی در آمده است که خارج از کنترل ارادی فرد درآمده است.
 ۵. و نهایتاً ترس به مدت طولانی استمرار پیدا می کند (منظور از مدت طولانی معمولاً وجود ترس بیش از ۲ سال است).
- کودکان مبتلا به ترس غالباً علاوه بر واکنش ترس علائم دیگری نیز از خود ظاهر می سازند. شایع ترین آن ها عبارتند از : اختلال در خواب (۴۵٪) / پرخاشگری (۳۵٪) / ناخن جویدن (۳٪) / شب ادراری (۳٪) و لکنت زبان (۶٪).