

Thalassaemia (Douglas 1992)

본 논문은 이러한 격차를 보완하기 위해 노력하고 있으며, 21세기에 들어서도 흑인 여성들이 건강 서비스의 수혜자이자 제공자로서 더 나은 공중보건 정책과 서비스를 위해 적극적으로 캠페인을 벌였다는 세 가지 사례 연구를 제시합니다.

Depo-Provera

생식 건강 측면에서, 흑인 및 소수민족 여성들은 백인 동료들보다 자궁 절제술을 제안 받는 경우가 더 많았던 것으로 보였습니다 (Bryan, Dadzie 및 Scafe 1986). 또한, 흑인 여성들은 주사형 피임약 Depo-Provera의 사용에서 차별적인 관행에 노출되었던 것으로 나타났습니다 (Brent Community Health Council 1981). 흑인 여성들은 주사형 피임약 Depo-Provera의 남용을 보고했습니다. Depo-Provera (DP)는 3개월 동안 지속되는 장기 주사형 피임약으로, UpJohn에서 제조되었습니다. 1963년 잠비아에서 시험되었으며, 이후 영국과 제3세계에서 더 널리 사용되었습니다. 미국의 식품의약국(FDA)은

미국에서의 사용을 권장하지 않았으며, 영국의 의약품 안전 위원회에서는 매우 제한적이고 특정한 경우에만 사용이 승인되었습니다. 배우자가 최근에 절정술을 받은 여성과 최근에 독일마비(루마) 백신을 접종받은 여성들. 그럼에도 불구하고, 런던의 병원과 영국 전역의 백인 노동 계급 및 흑인 및 소수민족 여성들을 대상으로 하는 병원 에서 흑인 여성들에게 DP가 그들의 지식이나 동의 없이 대규모로 처방되고 있는 것으로 보였습니다. 버밍엄의 병원에서도 흑인 및 소수민족 여성들에게 DP가 투여되고 있었습니다. 흑인과 백인 여성들은 1970년대 후반에 DP의 사용을 금지시키기 위해 캠페인을 시작했습니다. DP의 사용에 대해 공동으로 캠페인을 벌인 흑인 여성 단체 중 하나는 브릭스톤 흑인 여성 그룹(Brixton Black Women's Group)이었습니다. 브릭스톤 흑인 여성 그룹은 1973년에 흑인 여성들이 경험하는 인종차별과 성차별적 억압에 대해 논의하기 위해 설립되었습니다 (Bryan, Dadzie 및 Scafe 1985). 그들은 시위에 참여하고, 뉴스레터 '스피크아웃'(Speak Out)에서 DP의 영향을 다루는 글을 씌며, 지역 흑인 여성들에게 DP의 영향을 알리기 위해 노력했습니다.

Note: The text is provided in Korean and does not contain any images or tables that require HTML embedding. If you need further assistance or have additional content to add, please let me know!