

# 偏微分方程数值解法

## 椭圆型方程求解

刘 瑜

March 17, 2017

# Outline

椭圆型方程的差分离散格式

两点边值问题

Laplace 方程

Possion 方程

线性方程组的迭代解法

简单迭代算法

椭圆型方程描述的是平衡问题，属于纯粹的边值问题。  
在很多情形中，椭圆型方程是非定常问题的极限情形。  
比如描述的问题增加时间维度，即增加时间导数项  $\partial t$  或  $\partial^2/\partial t^2$ ，  
即可转化为时间演化问题。  
椭圆型方程的求解方法在抛物型和双曲型方程的求解中亦能用  
到。

# Outline

椭圆型方程的差分离散格式

两点边值问题

Laplace 方程

Possion 方程

线性方程组的迭代解法

简单迭代算法

考虑两点边值问题

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}K(x)\frac{dU}{dx} &= r(x), \quad 0 < x < L \\ U(0) &= U_0, U(L) = U_L\end{aligned}$$

其中  $K(x), r(x)$  是可微的, 因而上述方程等价于

$$K\frac{d^2 U}{dx^2} + \frac{dK}{dx}\frac{dU}{dx} = r$$




Figure: 一维网格节点

对于内点, 采用二阶中心差分离散二阶和一阶导数

$$K_i \frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} + (dK/dx)_i \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} = r_i$$

整理可得

$$\left( \frac{K_i}{h^2} + \frac{dK/dx}{2h} \right) U_{i+1} - 2\frac{K_i}{h^2} U_i + \left( \frac{K_i}{h^2} - \frac{dK/dx}{2h} \right) U_{i-1} = r_i$$

或者, 可以表示为

$$A_i U_{i-1} + B_i U_i + C_i U_{i+1} = D_i, \quad i = 1, 2, \dots, N$$

边界条件处理

*Dirichlet* 条件:  $U(0) = U_0, U(L) = U_L$

$$B_1 U_1 + C_1 U_2 = r_1 - A_1 U_0$$

$$A_N U_{N-1} + B_N U_N = r_N - C_N U_L$$

*Neumann* 条件:  $dU/dx(0) = a, dU/dx(L) = b$

采用一阶差分近似边界导数

$$\frac{U_1 - U_0}{h} = a, \text{ or } U_0 = U_1 - ah$$

$$\frac{U_{N+1} - U_N}{h} = b, \text{ or } U_{N+1} = U_N + hb$$

二阶近似, 分别采用前向、后向差分

$$\frac{-3U_0 + 4U_1 - U_2}{2h} = a$$

$$\frac{3U_{N+1} - 4U_N + U_{N-1}}{2h} = b$$

*Shadow node* 方法

(1) 节点  $N$  位于右边界  $x = L$ , 节点  $N+1$  向边界外延拓一个网格

二阶中心差分格式

$$\frac{U_{N+1} - U_{N-1}}{2h} = b$$

(2) 边界位于  $N$  和  $N+1$  节点中间

$$\frac{U_{N+1} - U_N}{h} = b$$



方程和边界条件离散后得到了三对角的线性方程组，对方程组的求解：

(1) 直接求逆

(2) 追赶法 (Thomas 算法)

# Outline

## 椭圆型方程的差分离散格式

两点边值问题

Laplace 方程

Possion 方程

## 线性方程组的迭代解法

简单迭代算法

考虑定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 < x, y < 1$$
$$u(x, 0) = u(0, y) = u(1, y) = 0, u(x, 1) = \sin \pi x.$$

## 五点格式

$$\frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2} = 0$$

其截断误差为

$$T_{i,j} = \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy})|_{i,j} + O(h^4).$$

因此, 差分方程的精度为 2 阶. 差分方程可以改写为

$$4u_{i,j} = u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}$$

## 九点格式

$$\frac{1}{6h^2} [4u_{i+1,j} + 4u_{i-1,j} + 4u_{i,j+1} + 4u_{i,j-1} \\ + u_{i-1,j-1} + u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j-1} + u_{i+1,j+1} - 20u_{i,j}] = 0$$

其截断误差为

$$T_{i,j} = \frac{h^2}{12} (u_{xxxx} + 2u_{xxyy} + u_{yyyy})|_{i,j} + O(h^4) = \frac{h^2}{12} \Delta^2 u|_{i,j} + O(h^4).$$

注意到, 对于 Laplace 方程

$$\Delta u = 0, \quad \Delta^2 u = 0,$$

因此差分方程的精度为 4 阶. 差分方程可以改写为

$$20u_{i,j} = 4u_{i+1,j} + 4u_{i-1,j} + 4u_{i,j+1} + 4u_{i,j-1} \\ + u_{i-1,j-1} + u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j-1} + u_{i+1,j+1}$$

取网格间距  $\Delta x = \Delta y = h = 1/3$ , 由五点格式可以得到如下方程组

$$u_{0,1} + u_{1,0} + u_{2,1} + u_{1,2} - 4u_{1,1} = 0$$

$$u_{1,1} + u_{2,0} + u_{3,1} + u_{2,2} - 4u_{2,1} = 0$$

$$u_{0,2} + u_{1,1} + u_{2,2} + u_{1,3} - 4u_{1,2} = 0$$

$$u_{1,2} + u_{2,1} + u_{3,2} + u_{2,3} - 4u_{2,2} = 0$$

其中边界上的值  $u_{0,1}, u_{1,0}, u_{2,0}, u_{3,1}, u_{0,2}, u_{1,3}, u_{3,2}, u_{2,3}$  已知.

内部网格点上的值, 按照自然排序, 记为

$\mathbf{x} = (u_{1,1}, u_{2,1}, u_{1,2}, u_{2,2})^T$ . 方程组表示为矩阵的形式  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  其

$$\text{中 } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} u_{0,1} + u_{1,0} \\ u_{2,0} + u_{3,1} \\ u_{0,2} + u_{1,3} \\ u_{2,3} + u_{3,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}.$$

由九点格式得到

$$20u_{1,1} - 4(u_{2,1} + u_{1,2}) - u_{2,2} = u_{0,2} + u_{0,0} + u_{2,0} + 4(u_{0,1} + u_{1,0})$$

$$20u_{2,1} - 4(u_{1,1} + u_{2,2}) - u_{1,2} = u_{1,0} + u_{3,0} + u_{3,2} + 4(u_{2,0} + u_{3,1})$$

$$20u_{1,2} - 4(u_{1,1} + u_{2,2}) - u_{2,1} = u_{0,3} + u_{0,1} + u_{2,3} + 4(u_{0,2} + u_{1,3})$$

$$20u_{2,2} - 4(u_{2,1} + u_{1,2}) - u_{1,1} = u_{1,3} + u_{3,1} + u_{3,3} + 4(u_{3,2} + u_{2,3})$$

表示为矩阵形式

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 20 & -4 & -4 & -1 \\ -4 & 20 & -1 & -4 \\ -4 & -1 & 20 & -4 \\ -1 & -4 & -4 & 20 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} u_{0,2} + u_{0,0} + u_{2,0} + 4(u_{0,1} + u_{1,0}) \\ u_{1,0} + u_{3,0} + u_{3,2} + 4(u_{2,0} + u_{3,1}) \\ u_{0,3} + u_{0,1} + u_{2,3} + 4(u_{0,2} + u_{1,3}) \\ u_{1,3} + u_{3,1} + u_{3,3} + 4(u_{3,2} + u_{2,3}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{5\sqrt{3}}{2} \\ \frac{5\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}.$$

计算线性方程组，得到

$$\text{五点格式的解为: } \mathbf{x} = \left( \frac{\sqrt{3}}{16}, \frac{\sqrt{3}}{16}, \frac{3\sqrt{3}}{16}, \frac{3\sqrt{3}}{16} \right)^T \approx \\ (0.108253, 0.108253, 0.32476, 0.32476)^T,$$

$$\text{九点格式的解为: } \mathbf{x} = \left( \frac{25}{154\sqrt{3}}, \frac{25}{154\sqrt{3}}, \frac{40}{77\sqrt{3}}, \frac{40}{77\sqrt{3}} \right)^T \approx \\ (0.0937257, 0.0937257, 0.299922, 0.299922)^T,$$

定解问题的精确解为

$$u(x, y) = \frac{\sin \pi x \sinh \pi y}{\sinh \pi}$$

从而  $\mathbf{x}$  的精确解为

$$\mathbf{x} = \left( \frac{\sqrt{3} \sinh \frac{\pi}{3}}{\sinh \pi}, \frac{\sqrt{3} \sinh \frac{\pi}{3}}{\sinh \pi}, \frac{\sqrt{3} \sinh \frac{2\pi}{3}}{\sinh \pi}, \frac{\sqrt{3} \sinh \frac{2\pi}{3}}{\sinh \pi} \right)^T \approx \\ (0.0936885, 0.0936885, 0.299857, 0.299857)^T.$$



如果  $h = 1/4$ , 由五点格式得到方程组

$$u_{0,1} + u_{1,0} + u_{2,1} + u_{1,2} - 4u_{1,1} = 0$$

$$u_{1,1} + u_{2,0} + u_{3,1} + u_{2,2} - 4u_{2,1} = 0$$

$$u_{2,1} + u_{3,0} + u_{4,1} + u_{3,2} - 4u_{3,1} = 0$$

$$u_{0,2} + u_{1,1} + u_{2,2} + u_{1,3} - 4u_{1,2} = 0$$

$$u_{1,2} + u_{2,1} + u_{3,2} + u_{2,3} - 4u_{2,2} = 0$$

$$u_{2,2} + u_{3,1} + u_{4,2} + u_{3,3} - 4u_{3,2} = 0$$

$$u_{0,3} + u_{1,2} + u_{2,3} + u_{1,4} - 4u_{1,3} = 0$$

$$u_{1,3} + u_{2,2} + u_{3,3} + u_{2,4} - 4u_{2,3} = 0$$

$$u_{2,3} + u_{3,2} + u_{4,3} + u_{3,4} - 4u_{3,3} = 0$$

写成矩阵形式

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} u_{0,1} + u_{1,0} \\ u_{2,0} \\ u_{3,0} + u_{4,1} \\ u_{0,2} \\ 0 \\ u_{4,2} \\ u_{0,3} + u_{1,4} \\ u_{2,4} \\ u_{4,3} + u_{3,4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1/224(6 + 5\sqrt{2}) \\ 1/112(5 + 3\sqrt{2}) \\ 1/224(6 + 5\sqrt{2}) \\ 1/16(1 + \sqrt{2}) \\ 1/16(2 + \sqrt{2}) \\ 1/16(1 + \sqrt{2}) \\ 1/224(22 + 37\sqrt{2}) \\ 1/112(37 + 11\sqrt{2}) \\ 1/224(22 + 37\sqrt{2}) \end{bmatrix}.$$

计算值  $u(1/2, 1/2) \approx 0.213388$ , 精确解  $u(1/2, 1/2) \approx 0.199268$ .

$u(1/4, 1/4) = 0.058353$ ,  $u(1/3, 1/3) \approx$

$2/3u(1/4, 1.4) + 1/3u(1/2, 1/2) = 0.110031$

由九点格式得到

$$4(u_{0,1} + u_{1,0} + u_{2,1} + u_{1,2}) + u_{0,2} + u_{0,0} + u_{2,0} + u_{2,2} - 20u_{1,1} = 0$$

$$4(u_{1,1} + u_{2,0} + u_{3,1} + u_{2,2}) + u_{1,2} + u_{1,0} + u_{3,0} + u_{3,2} - 20u_{2,1} = 0$$

$$4(u_{2,1} + u_{3,0} + u_{4,1} + u_{3,2}) + u_{2,2} + u_{2,0} + u_{4,0} + u_{4,2} - 20u_{3,1} = 0$$

$$4(u_{0,2} + u_{1,1} + u_{2,2} + u_{1,3}) + u_{0,3} + u_{0,1} + u_{2,1} + u_{2,3} - 20u_{1,2} = 0$$

$$4(u_{1,2} + u_{2,1} + u_{3,2} + u_{2,3}) + u_{1,3} + u_{1,1} + u_{3,1} + u_{3,3} - 20u_{2,2} = 0$$

$$4(u_{2,2} + u_{3,1} + u_{4,2} + u_{3,3}) + u_{2,3} + u_{2,1} + u_{4,1} + u_{4,3} - 20u_{3,2} = 0$$

$$4(u_{0,3} + u_{1,2} + u_{2,3} + u_{1,4}) + u_{0,4} + u_{0,2} + u_{2,2} + u_{2,4} - 20u_{1,3} = 0$$

$$4(u_{1,3} + u_{2,2} + u_{3,3} + u_{2,4}) + u_{1,4} + u_{1,2} + u_{3,2} + u_{3,4} - 20u_{2,3} = 0$$

$$4(u_{2,3} + u_{3,2} + u_{4,3} + u_{3,4}) + u_{2,4} + u_{2,2} + u_{4,2} + u_{4,4} - 20u_{3,3} = 0$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 20 & -4 & 0 & -4 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 20 & -4 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 20 & 0 & -1 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 20 & -4 & 0 & -4 & -1 & 0 \\ -1 & -4 & -1 & -4 & 20 & -4 & -1 & -4 & -1 \\ 0 & -1 & -4 & 0 & -4 & 20 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -1 & 0 & 20 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -4 & -1 & -4 & 20 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -4 & 0 & -4 & 20 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4(u_{0,1} + u_{1,0}) + u_{0,2} + u_{0,0} + u_{2,0} \\ 4u_{2,0} + u_{1,0} + u_{3,0} \\ 4(u_{3,0} + u_{4,1}) + u_{2,0} + u_{4,0} + u_{4,2} \\ 4u_{0,2} + u_{0,3} + u_{0,1} \\ 0 \\ 4u_{4,2} + u_{4,1} + u_{4,3} \\ 4(u_{0,3} + u_{1,4}) + u_{0,4} + u_{0,2} + u_{2,4} \\ 4u_{2,4} + u_{1,4} + u_{3,4} \\ 4(u_{3,4} + u_{4,3}) + u_{2,4} + u_{4,2} + u_{4,4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 + 2\sqrt{2} \\ 4 + \sqrt{2} \\ 1 + 2\sqrt{2} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} (2601 + 1891\sqrt{2})/99176 \\ (3782 + 2601\sqrt{2})/99176 \\ (2601 + 1891\sqrt{2})/99176 \\ (144 + 113\sqrt{2})/2156 \\ (113 + 72\sqrt{2})/1078 \\ (144 + 113\sqrt{2})/2156 \\ (3(4101 + 4583\sqrt{2}))/99176 \\ (3(9166 + 4101\sqrt{2}))/99176 \\ (3(4101 + 4583\sqrt{2}))/99176 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.0531911 \\ 0.0752235 \\ 0.0531911 \\ 0.140912 \\ 0.19928 \\ 0.140912 \\ 0.320108 \\ 0.452701 \\ 0.320108 \end{bmatrix}$$

Table: 五点格式和九点格式精度比较

	5-points scheme	9-points scheme	analytical solution
(0.25,0.25)	0.058353	0.053191	0.0531871
(0.50,0.25)	0.082523	0.075223	0.0752178
(0.25,0.50)	0.150888	0.140912	0.1409041
(0.50,0.50)	0.213388	0.199280	0.1992681
(0.25,0.75)	0.331812	0.320108	0.3200991
(0.50,0.75)	0.469253	0.452701	0.4526881



# Outline

## 椭圆型方程的差分离散格式

两点边值问题

Laplace 方程

Possion 方程

## 线性方程组的迭代解法

简单迭代算法

考虑定解问题

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= f(x, y), \quad 0 < x, y < 1 \\ u(x, 0) &= f_1(x), \quad u(x, 1) = f_2(x) \\ u(0, y) &= g_1(y), \quad u(1, y) = g_2(y).\end{aligned}$$

## 五点格式

$$\frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j}}{h^2} = f_{i,j}$$

其截断误差为

$$T_{i,j} = (u_{xx} + u_{yy})|_{i,j} - f_{i,j} + \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + u_{yyyy})|_{i,j} + O(h^4).$$

因此, 差分方程的精度为 2 阶. 差分方程可以改写为

$$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} = h^2 f_{i,j}$$

## 九点格式

$$\frac{1}{6h^2}[4u_{i+1,j} + 4u_{i-1,j} + 4u_{i,j+1} + 4u_{i,j-1} \\ + u_{i-1,j-1} + u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j-1} + u_{i+1,j+1} - 20u_{i,j}] = f_{i,j}$$

其截断误差为

$$T_{i,j} = (u_{xx} + u_{yy})|_{i,j} - f_{i,j} + \frac{h^2}{12}(u_{xxxx} + 2u_{xxyy} + u_{yyyy})|_{i,j} + O(h^4).$$

注意到, 若  $f$  是调谐函数, 即  $\Delta f = 0$ , 则

$$\Delta^2 u = \Delta f = 0,$$

因此差分方程的精度为 4 阶, 否则只有二阶精度. 差分方程可以改写为

$$4(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) + u_{i-1,j-1} + u_{i-1,j+1} \\ + u_{i+1,j-1} + u_{i+1,j+1} - 20u_{i,j} = 6h^2 f_{i,j}$$

构造如下的差分格式

$$\begin{aligned} & \frac{1}{6h^2} [4(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) \\ & \quad + u_{i-1,j-1} + u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j-1} + u_{i+1,j+1} - 20u_{i,j}] \\ & = f_{i,j} + \frac{h^2}{12} \Delta f(x_i, y_j) \end{aligned}$$

用五点差分格式离散  $\Delta f(x_i, y_j)$ , 则差分方程具有四阶精度.  
差分方程为

$$\begin{aligned} & 4(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) + u_{i-1,j-1} + u_{i-1,j+1} \\ & \quad + u_{i+1,j-1} + u_{i+1,j+1} - 20u_{i,j} \\ & = \frac{h^2}{2} (f_{i+1,j} + f_{i-1,j} + f_{i,j+1} + f_{i,j-1} + 8f_{i,j}) \end{aligned}$$

由五点差分格式离散具有 *Dirichlet* 边界条件的 *Possion* 方程得到的线性方程组为

$$\mathbf{A}_5 \mathbf{x} = \mathbf{b}_5$$

其中

$$\mathbf{A}_5 = \begin{bmatrix} T & -I & & & \\ -I & T & -I & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -I & T & -I \\ & & & -I & T \end{bmatrix}.$$

由九点差分格式离散具有 *Dirichlet* 边界条件的 *Possion* 方程得到的线性方程组为

$$\mathbf{A}_9 \mathbf{x} = \mathbf{b}_9$$

其中

$$\mathbf{A}_9 = \begin{bmatrix} T_1 & -T_2 & & & \\ -T_2 & T_1 & -T_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -T_2 & T_1 & -T_2 \\ & & & -T_2 & T_1 \end{bmatrix}.$$

# Outline

椭圆型方程的差分离散格式

两点边值问题

Laplace 方程

Possion 方程

线性方程组的迭代解法

简单迭代算法



# Jacobi 迭代

(1) 将线性方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

改写为

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left( \sum_{j=1, j \neq i}^n -a_{ij}x_j + b_i \right) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

(2) 任意选择一组初始近似值  $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$ , 作为方程的第 0 次近似解.

(3) 依次使  $k = 1, 2, 3, \dots$ , 用公式

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left( \sum_{j=1, j \neq i}^n -a_{ij}x_j^{(k-1)} + b_i \right) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

求出方程的第  $k$  次近似解, 直至满足

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| < \epsilon$$

其中  $\epsilon$  是预先给定的允许误差.

考虑 Poisson 方程的五点差分格式

$$u_{ii} = \frac{u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - h^2 f_{i,j}}{4}$$

Jacobi 迭代公式表示为

$$u_{ij}^{(k+1)} = \frac{u_{i+1,j}^{(k)} + u_{i-1,j}^{(k)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i,j-1}^{(k)} - h^2 f_{i,j}}{4}$$

对于前例中的 Laplace 方程, 用 Jacobi 迭代求解

$$u_{11}^{(k+1)} = \frac{u_{21}^{(k)} + u_{12}^{(k)} + u_{01} + u_{10}}{4}$$

$$u_{21}^{(k+1)} = \frac{u_{11}^{(k)} + u_{22}^{(k)} + u_{20} + u_{31}}{4}$$

$$u_{12}^{(k+1)} = \frac{u_{22}^{(k)} + u_{11}^{(k)} + u_{13} + u_{02}}{4}$$

$$u_{22}^{(k+1)} = \frac{u_{12}^{(k)} + u_{21}^{(k)} + u_{23} + u_{32}}{4}$$

取初始估计值  $(u_{11}^{(0)}, u_{21}^{(0)}, u_{12}^{(0)}, u_{22}^{(0)})^T = (0, 0, 0, 0)^T$ .

Table: Jacobi 迭代过程

k	$u_{11}$	$u_{22}$
0	0	0
1	0	0.216506
2	0.0541266	0.270633
3	0.0811899	0.297696
4	0.0947215	0.311228
5	0.101487	0.321377
6	0.106562	0.323068
7	0.107407	0.323914
8	0.10783	0.324337
9	0.108042	0.324548
10	0.108147	0.324654
11	0.1082	0.324707
12	0.108227	0.324746

# Gauss-Seidel 迭代

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left( - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k-1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} + b_i \right) \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Table: Gauss-Seidel 迭代过程

k	$u_{11}$	$u_{21}$	$u_{12}$	$u_{22}$
0	0	0	0	0
1	0	0	0.216506	0.270633
2	0.0541266	0.0811899	0.297696	0.311228
3	0.0947215	0.101487	0.317994	0.321377
4	0.10487	0.106562	0.323068	0.323914
5	0.107407	0.10783	0.324337	0.324548
6	0.108042	0.108147	0.324654	0.324707
7	0.1082	0.108227	0.324733	0.324746
8	0.10824	0.108247	0.324753	0.324756
9	0.10825	0.108252	0.324758	0.324759
10	0.108252	0.108253	0.324759	0.324759
11	0.108253	0.108253	0.324759	0.324759
12	0.108253	0.108253	0.32476	0.32476
13	0.108253	0.108253	0.32476	0.32476

# Successive Over Relaxation, SOR

$$x_i^{(k)} = \omega \frac{1}{a_{ii}} \left( - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k-1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} + b_i \right) + (1 - \omega) x_i^{k-1}$$

其中  $\omega$  为松弛因子，一般取 1.5~2.