

基礎気象学講義 復習問題


第2回

放射

1 問題

1 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

教科書 P.14 の図 2.6 におけるエネルギー配分の数値は現時点での代表的な見積もりの一例である。大気内や地表面における大気放射エネルギー配分は研究者により数 % の評価の差異がある。特に、雲や大気中の微粒子（一般に (A) と呼ばれる）が太陽放射量の吸収に及ぼす効果については不明な点が多い。一方で、このような放射エネルギー収支のバランスはあくまで全球について成り立つものであり、^(a)地域別あるいは季節別に見ると成り立たない。下図に人工衛星により観測された大気上端における放射収支とアルベドの緯度分布を示す。



図を見ると、南北とも概ね緯度 (B) までは吸収量が多く、それより高緯度側では逆になる。この緯度方向の放射収支の不均衡は、放射過程がつねに低緯度側と高緯度側の温度差を拡大するように作用していることを示す。この温度差を縮小するように、大気や海洋の大規模な運動による (C) の輸送が起こる。このように放射エネルギーの収支は、大気と海洋の循環運動の平均状態としての気候の形成と深く結びついており、放射エネルギー分布のわずかな変動が気候の変化をもたらさう。

(講義テキストを元に作成・図は浅野「大気放射学の基礎」より引用)

- (1) 文中の空欄 (A) ~ (C) に当てはまる語句や数値を答えなさい。
- (2) 下線部 (a) のように、地域別あるいは季節別に収支バランスが成り立たない理由を述べなさい。
- (3) アルベドの緯度分布は必ずしも南北対称とは言えない。対称でない理由を述べなさい。

- 2 地球に入射した太陽光は大気の粒子による吸収や散乱、また大気中あるいは地表の反射を経て地面に入射する。これについて、次の問いに答えなさい。
- (1) 反射率は地表面の状態により変わるが、この反射率のことを何と言うか答えなさい。
 - (2) 雪面は古びて土が混ざるとよく溶けるとされるが、この理由を説明しなさい。
 - (3) 大気中での散乱には、大きくレイリー散乱とミー散乱がある。前者は波長より十分小さい球形粒子の電気双極子による 2 次放射、後者は波長と同程度の球形粒子による電磁波の散乱である。これらについて教科書を元に、性質を対比して一覧表にまとめなさい。
 - (4) 図 1 はサハラ砂漠上空で、人工衛星搭載の分光放射計で測定された地球放射のスペクトルを示している。地球放射に対して吸収量が勝るのはどの波長帯の部分か、図上部に書いてある 帯 (4 つ) の中から全て




図 1: 地球放射スペクトル。破線は各温度での黒体放射スペクトル。(浅野「大気放射学の基礎」より引用)

選びなさい。

- (5) 図 1 上部にある「大気の窓」領域とはどのような領域か説明しなさい。
- (6) ある波長帯の赤外放射を吸収し、大気の昇温に寄与するような気体のことを何と言うか答え、その例を 5 例あげなさい。また、図 1 を元に、最もその寄与が大きい気体は何か答えなさい。
- (7) 人間活動により、前問で答えた気体 (寄与最大の気体を除く) が増加し、地表面温度が上昇する環境問題を何と言うか答えなさい。

- 3 黒体放射について、次の問いに答えなさい。

- (1) 黒体とは何か、その定義を答えなさい。
- (2) 黒体放射は等方的とされるが、等方的とはどういうことか説明しなさい。
- (3) 黒体の放射輝度は、絶対温度 T と波長 λ の関数として、次式のプランク関数により与えられる。

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5 \{ \exp(hc/k_B\lambda T) - 1 \}} \quad (1)$$

ここで、 c は光速、 h はプランク定数 $6.62607 \times 10^{-34} \text{ Js}$ 、 k_B はボルツマン定数 $1.38065 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ である。これを全波長帯にわたって積分することで、シュテファン・ボルツマンの法則を導きなさい。また、シュテファン・ボルツマン定数を求めなさい。

- (4) ある温度 T においてプランク関数 (1) の極大値を与える波長 λ_m を計算することにより、ウィーンの変位則を示しなさい。

2 答案

- 1
- 2
- 3