

16 - Plot a bar plot for any 2 variables in your dataset

Muhammed Aqib Arif Ahamed

2022-04-08

```
vg-sales <- read.csv("vg-sales.csv")
```

```
ggplot(data = vg-sales) + geom_bar(aes(x = Critic_Score, fill=as.factor(Total_Shipped)))
```

Warning: Removed 322 rows containing non-finite values (stat_count).

2.03	2.37	2.82	3.32	4.16	4.94	5.75	8	9.87	13.08
2.04	2.39	2.84	3.33	4.2	4.96	5.77	8.09	9.9	13.29
2.06	2.4	2.86	3.34	4.23	5	5.79	8.27	9.97	13.76
2.08	2.41	2.9	3.36	4.24	5.07	5.8	8.28	10	14.5
2.1	2.42	2.93	3.37	4.3	5.15	5.91	8.3	10.85	14.64
2.14	2.46	2.94	3.49	4.32	5.19	5.98	8.42	11	14.88
2.15	2.47	2.96	3.5	4.43	5.2	6	8.52	11.06	14.89
2.16	2.48	2.97	3.51	4.48	5.22	6.15	8.6	11.18	15
2.17	2.5	2.98	3.63	4.49	5.25	6.3	8.7	11.68	15.02
2.19	2.52	2.99	3.65	4.5	5.27	6.39	8.76	11.75	15.64
2.22	2.53	3	3.67	4.52	5.3	6.4	8.85	11.76	16.14
2.24	2.54	3.02	3.71	4.56	5.31	6.5	8.88	11.91	16.22
2.27	2.57	3.04	3.72	4.61	5.35	6.53	9	11.95	16.37
2.28	2.58	3.11	3.8	4.62	5.43	6.82	9.15	12	17.3
2.3	2.6	3.12	3.83	4.67	5.46	6.88	9.3	12.08	17.67
2.31	2.68	3.16	3.88	4.7	5.5	7.06	9.31	12.1	18.11
2.32	2.7	3.18	3.92	4.76	5.55	7.17	9.32	12.41	19.01
2.33	2.74	3.23	4	4.88	5.57	7.26	9.37	12.72	20.61
2.35	2.75	3.26	4.1	4.9	5.62	7.41	9.45	12.78	21.13