

Цель работы: изучение методов решения дифференциального уравнения.

1 Теоретическая часть

В данном разделе рассматриваются аналитический приближенный метод Пикара и численный метод Эйлера (явная и неявная схема).

1.1 Метод Пикара

$$y^{(\xi)}(x) = \eta + \int_0^x f(t, y^{\xi-1}(t)) dt,$$
$$y^{(\xi)} = \eta.$$

1.2 Явный метод Эйлера

$$x_i = x_{i-1} + h,$$
$$y_i = y_{i-1} + h \cdot f(x_{i-1}, y_{i-1}).$$

1.3 Неявный метод Эйлера

$$x_i = x_{i-1} + h,$$
$$y_i = y_{i-1} + h \cdot f(x_i, y_i).$$

2 Практическая часть

Задача: решить уравнение:

$$\begin{cases} u'(x) = x^2 + u^2, \\ u(0) = 0. \end{cases}$$

Произведем вычисления для метода Пикара:

$$y_1(x) = 0 + \int_0^x f(t, y_0(t)) dt, \quad y_0(x) = 0,$$

$$y_1(x) = 0 + \int_0^x f(t, 0) dt = \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3},$$

$$y_2(x) = 0 + \int_0^x f(t, \frac{x^3}{3}) dt = \int_0^x (t^2 + \frac{x^6}{9}) dt = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63},$$

$$\begin{aligned}
y_3(x) &= 0 + \int_0^x f(t, \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63}) dt = \int_0^x (t^2 + \frac{x^6}{9} + \frac{2x^{10}}{189} + \frac{x^{14}}{3969}) dt = \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535}, \\
y_4(x) &= 0 + \int_0^x f(t, \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535}) dt = \int_0^x (t^2 + (\frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535})^2) dt = \\
&= \int_0^x (t^2 + ((\frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63})^2 + 2 \cdot (\frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63})(\frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535}) + (\frac{2x^{11}}{2079} + \frac{x^{15}}{59535})^2)) dt \\
&= \int_0^x (t^2 + \frac{x^6}{9} + \frac{2x^{10}}{189} + \frac{13x^{14}}{14553} + \frac{82x^{18}}{1964655} + \frac{662x^{22}}{453835305} + \frac{4x^{26}}{123773265} + \frac{x^{30}}{3544416225}) dt \\
&= \frac{x^3}{3} + \frac{x^7}{63} + \frac{2x^{11}}{2079} + \frac{13x^{15}}{218295} + \frac{82x^{19}}{37328445} + \frac{662x^{23}}{10438212015} + \frac{4x^{27}}{3341878155} + \frac{x^{31}}{10987690975}.
\end{aligned}$$

Произведем вычисления для неявного метода Эйлера:

$$\begin{aligned}
y_{i+1} &= y_i + h \cdot f(x_{i+1}, y_{i+1}), \\
f(x_i, y_i) &= x_i^2 + y_i^2, \\
y_{i+1} &= y_i + h(x_{i+1}^2 + y_{i+1}^2), \\
hy_{i+1}^2 - y_{i+1} + (y_i + hx_{i+1}^2) &= 0, \\
D = b^2 - 4ac &= 1 - 4h(y_i + h(x_i + h)^2), \\
y_{i+1} &= \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{1 \pm \sqrt{D}}{2h}.
\end{aligned}$$

В листинге 1 представлена реализация рассмотренных методов.

Листинг 1: Реализации трех методов решения дифференциального уравнения

```

1 def func(x, u):
2     return x ** 2 + u ** 2
3
4
5 def picard_1(x):
6     return x ** 3 / 3
7
8
9 def picard_2(x):
10    return x ** 3 / 3 * (1 + x ** 4 / 21)
11
12

```

```

13 def picard_3(x):
14     return x ** 3 / 3 * (1 + (x ** 4 / 21) + (2 / 693 * x **
      8) + (1 / 19845 * x ** 12))
15
16
17 def picard_4(x):
18     return x ** 3 / 3 + (x ** 7 / 63) + (2 / 2079 * x ** 11) +
      (13 / 218295 * x ** 15) + (82 / 37328445 * x ** 19) +
      \
19         (662 / 10438212015 * x ** 23) + (4 / 3341878155 * x
      ** 27) + (x ** 31 / 10987690975)
20
21
22 def explicit_scheme(x, y, h):
23     return y + h * func(x, y)
24
25
26 def implicit_scheme(x, y, h):
27     D = 1 - 4 * h * (y + h * (x + h) ** 2)
28     if D < 0:
29         return float("NaN")
30     else:
31         return (1 - sqrt(D)) / (2 * h)
32
33
34 def calculate_picard(x_values, func):
35     y_values = []
36     for x_cur in x_values:
37         result = func(x_cur)
38         if result <= 10e+300:
39             y_values.append(round(result, 8))
40         else:
41             y_values.append(float('inf'))
42
43     return y_values
44
45
46 def calculate_euler(step, x_end, func):
47     y_values = []
48     y_values.append(0.0)
49     for x_cur in arange(step, x_end + step, step):
50         result = func(x_cur - step, y_values[-1], step)
51         if result <= 10e+300:
52             y_values.append(result)
53         else:
54             y_values.append(float('inf'))
55
56     return y_values

```

На рис. 1 представлен результат работы программы при шаге 0.001:

| X | Пикар (1 приближение) | Пикар (2 приближение) | Пикар (3 приближение) | Пикар (4 приближение) | Эйлер (явная схема) | Эйлер (неявная схема) |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000333894311098e-09 |
| 0.002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1e-09 | 5.000055924853086e-09 |
| 0.003 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-08 | 1e-08 | 5.000000000001e-09 | 1.4000078873976918e-08 |
| 0.004 | 2e-08 | 2e-08 | 2e-08 | 2e-08 | 1.4000000000026e-08 | 3.000011350451359e-08 |
| 0.005 | 4e-08 | 4e-08 | 4e-08 | 4e-08 | 3.0000000000222e-08 | 5.500011557302287e-08 |
| 0.006 | 7e-08 | 7e-08 | 7e-08 | 7e-08 | 5.5000000001122004e-08 | 9.100015185836696e-08 |
| 0.007 | 1.1e-07 | 1.1e-07 | 1.1e-07 | 1.1e-07 | 9.1000000004147e-08 | 1.4000017811710563e-07 |
| 0.008 | 1.7e-07 | 1.7e-07 | 1.7e-07 | 1.7e-07 | 1.4000000001242802e-07 | 2.0400020561694987e-07 |
| 0.009 | 2.4e-07 | 2.4e-07 | 2.4e-07 | 2.4e-07 | 2.0400000003202804e-07 | 2.8500024562561066e-07 |
| 0.01 | 3.3e-07 | 3.3e-07 | 3.3e-07 | 3.3e-07 | 2.8500000007364403e-07 | 3.8500025389964776e-07 |
| 0.011 | 4.4e-07 | 4.4e-07 | 4.4e-07 | 4.4e-07 | 3.850000000154869e-07 | 5.060002417067722e-07 |
| 0.012 | 5.8e-07 | 5.8e-07 | 5.8e-07 | 5.8e-07 | 5.060000000303094e-07 | 6.500002758258461e-07 |
| 0.013 | 7.3e-07 | 7.3e-07 | 7.3e-07 | 7.3e-07 | 6.50000000055913e-07 | 8.190003120134293e-07 |
| 0.014 | 9.1e-07 | 9.1e-07 | 9.1e-07 | 9.1e-07 | 8.19000000098163e-07 | 1.0150003060260815e-06 |
| 0.015 | 1.12e-06 | 1.12e-06 | 1.12e-06 | 1.12e-06 | 1.0150000001652391e-06 | 1.240000324642665e-06 |
| 0.016 | 1.37e-06 | 1.37e-06 | 1.37e-06 | 1.37e-06 | 1.240000000268261e-06 | 1.4960003236197394e-06 |
| 0.017 | 1.64e-06 | 1.64e-06 | 1.64e-06 | 1.64e-06 | 1.496000000422021e-06 | 1.785000314225016e-06 |
| 0.018 | 1.94e-06 | 1.94e-06 | 1.94e-06 | 1.94e-06 | 1.7850000006458232e-06 | 2.1090003077262054e-06 |
| 0.019 | 2.29e-06 | 2.29e-06 | 2.29e-06 | 2.29e-06 | 2.1090000009644457e-06 | 2.470000315391019e-06 |
| 0.02 | 2.67e-06 | 2.67e-06 | 2.67e-06 | 2.67e-06 | 2.470000000140923384e-06 | 2.8700003484871672e-06 |
| 0.021 | 3.09e-06 | 3.09e-06 | 3.09e-06 | 3.09e-06 | 2.87000000021932384e-06 | 3.3110003627712103e-06 |
| 0.022 | 3.55e-06 | 3.55e-06 | 3.55e-06 | 3.55e-06 | 3.3110000284301384e-06 | 3.795000369510859e-06 |
| 0.023 | 4.06e-06 | 4.06e-06 | 4.06e-06 | 4.06e-06 | 3.7950000393928597e-06 | 4.324000379973825e-06 |
| 0.024 | 4.61e-06 | 4.61e-06 | 4.61e-06 | 4.61e-06 | 4.3240000053794885e-06 | 4.900000405427818e-06 |
| 0.025 | 5.21e-06 | 5.21e-06 | 5.21e-06 | 5.21e-06 | 4.900000072491862e-06 | 5.52500045714055e-06 |
| 0.026 | 5.86e-06 | 5.86e-06 | 5.86e-06 | 5.86e-06 | 5.525000096501863e-06 | 6.20100049086858e-06 |
| 0.027 | 6.56e-06 | 6.56e-06 | 6.56e-06 | 6.56e-06 | 6.201000127027489e-06 | 6.93000051787962e-06 |
| 0.028 | 7.32e-06 | 7.32e-06 | 7.32e-06 | 7.32e-06 | 6.930000165479892e-06 | 7.714000604952531e-06 |
| 0.029 | 8.13e-06 | 8.13e-06 | 8.13e-06 | 8.13e-06 | 7.714000213504794e-06 | 8.555000652332723e-06 |
| 0.03 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 9e-06 | 8.555000273010593e-06 | 9.455000726799057e-06 |
| 0.031 | 9.93e-06 | 9.93e-06 | 9.93e-06 | 9.93e-06 | 9.455000346198622e-06 | 1.0416000839619244e-05 |
| 0.032 | 1.092e-05 | 1.092e-05 | 1.092e-05 | 1.092e-05 | 1.0416000435595653e-05 | 1.1440000946549844e-05 |
| 0.033 | 1.198e-05 | 1.198e-05 | 1.198e-05 | 1.198e-05 | 1.1440000544088717e-05 | 1.252900111436972e-05 |

Рис. 1: Результат работы программы

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы аналитический приближенный метод Пикара и численный метод Эйлера.