<u>แบบฝึกหัด</u>

1. จงบอกจุดศูนย์กลาง และรัศมีของวงกลมต่อไปนี้

   1. $(x-2)^2+(y+1)^2 = 4$

   2. $(x+2)^2+y^2 = 2$

   3. $x^2+y^2-4x+6y+5 = 0$

   4. $x^2+y^2 = 2y+3$

   5. $x^2+y^2+2x+y-1 = 0$

   6. $4x^2+4y^2+4x-4y+1 = 0$

2. จงหาสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลาง $(1,-1)$ และมีรัศมียาว 3

3. จงหาสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลาง $(0,2)$ และผ่านจุด $(1,1)$

4. จงหาสมการวงกลม ที่มีจุดศูนย์กลาง $(0,2)$ และมีเส้นตรง $x+y = 6$ เป็นเส้นสัมผัส

8. กำหนดให้วงกลมรูปหนึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(2, 1)$ ถ้าเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด $x = 1$ เส้นหนึ่งมีความชันเท่ากับ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ แล้ว จุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนวงกลมที่กำหนด [PAT 1 (มี.ค. 52)/16]

1. $(0, 1)$ 2. $(0, 2)$ 3. $(1, 0)$ 4. $(3, 0)$

9. กำหนดให้เส้นตรง ℓ_1 และ ℓ_2 สัมผัสวงกลม $(x-5)^2 + y^2 = 20$ ที่จุด P และ Q ตามลำดับ และจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่บนเส้นตรงที่ผ่านจุด P และ Q ถ้า ℓ_1 มีสมการเป็น $x - 2y + 5 = 0$ แล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนเส้นตรง ℓ_2 [PAT 1 (ก.ค. 52)/14]

1. $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 2. $(8, -1)$ 3. $(1, -8)$ 4. $(15, 0)$

12. ให้ P เป็นจุดบนวงกลม $x^2+y^2+2x-4y-15=0$ ที่อยู่ใกล้จุด $A(1,3)$ มากที่สุด จงหาระยะระหว่างจุด P กับเส้นตรง $3y-4x=15$ [PAT 1 (ธ.ค. 54)/6]

13. กำหนดให้ L เป็นเส้นตรงมีสมการเป็น $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ เมื่อ $a,b>0$ และให้ C_1 และ C_2 เป็นวงกลมสองวงที่ต่างกัน โดยที่มีรัศมีเท่ากันและวงกลมทั้งสองวงต่างสัมผัสกับเส้นตรง L ที่จุดเดียวกัน ถ้าวงกลม C_1 มีจุดศูนย์กลางที่จุด $(0,0)$ แล้วสมการของวงกลม C_2 คือข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 57)/8]

1. $(a^2+b^2)^2(x^2+y^2)-4ab(a^2+b^2)(bx+ay)+3a^2b^2=0$
2. $(a^2+b^2)(x^2+y^2)-4ab(bx+ay)+3a^2b^2=0$
3. $(a^2+b^2)^2(x^2+y^2)-4ab(a^2+b^2)(bx+ay)+5a^2b^2=0$
4. $(a^2+b^2)(x^2+y^2)-4ab(bx+ay)+5a^2b^2=0$

สมการกราฟของพาราโบลา จะมี 4 รูป ได้แก่

หงาย $\rightarrow (x-h)^2 = 4c(y-k)$
คว่ำ $\rightarrow (x-h)^2 = -4c(y-k)$
} กำลังสองอยู่ที่ x

ตะแคงขวา $\rightarrow (y-k)^2 = 4c(x-h)$
ตะแคงซ้าย $\rightarrow (y-k)^2 = -4c(x-h)$
} กำลังสองอยู่ที่ y

สังเกตว่า พาราโบลา จะมีกำลังสองที่ x หรือ y ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวเท่านั้น

สูตรที่ต้องท่อง จะน้อยกว่ากราฟรูปอื่น

จุดยอด อยู่ที่ (h,k)


ระยะจากจุดโฟกัสถึงจุดยอด $= c =$ ระยะจากจุดยอดถึงเส้นไดเรกตริกซ์

ความยาวลาตัสเรคตัม $= 4c$


เวลาตอบแกนสมมาตร กับเส้นไดเรกตริกซ์ เราจะตอบเป็นสมการเส้นตรง ในรูป $x = ?$ → เส้นแนวตั้ง

หรือ $y = ?$ → เส้นแนวนอน

เช่น



แกนสมมาตร: $x = 3$
เส้นไดเรกตริกซ์: $y = -2$



แกนสมมาตร: $y = 1$
เส้นไดเรกตริกซ์: $x = -3$

ตัวอย่าง จงหาจุดยอด จุดโฟกัส แกนสมมาตร เส้นไดเรกตริกซ์ ความยาวลาตัสเรคตัม พร้อมทั้งวาดรูปพาราโบลาซึ่งมีสมการกราฟ คือ $(y-1)^2 = -12(x+2)$

วิธีทำ สมการกราฟ อยู่ในรูปแบบ $(y-k)^2 = -4c(x-h)$ ดังนั้น เป็นพาราโบลาแบบตะแคงซ้าย


จะได้ $k = 1$, $c = 3$, และ $h = -2$ ดังนั้น จุดยอด คือ $V(-2,1)$

ระยะจาก V ถึง F คือ $c = 3$ ดังนั้น จุดโฟกัส คือ $F(-5,1)$

ระยะจาก V ถึง ไดเรกตริกซ์ คือ 3 ด้วย ดังนั้น ไดเรกตริกซ์ คือ $x = 1$

แกนสมมาตร คือ เส้นแนวนอนที่ผ่าน V ดังนั้น แกนสมมาตร คือ $y = 1$

และสุดท้าย ความยาวลาตัสเรคตัม $= 4c = 12$ หน่วย



#

ตัวอย่าง จงหาสมการของพาราโบลา ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $(0,2)$ และจุดโฟกัสอยู่ที่ $(0,-3)$


วิธีทำ จะเห็นว่าจุดโฟกัส อยู่ใต้จุดยอด ดังนั้น เป็นพาราโบลาคว่ำ ใช้รูปสมการ $(x-h)^2 = -4c(y-k)$

จุดยอด $= (h,k) = (0,2)$ ดังนั้น $h = 0$ และ $k = 2$

จุดยอด ห่างจากจุดโฟกัส $= 2-(-3) = 5$ ดังนั้น $c = 5$

ดังนั้น สมการคือ $(x-0)^2 = -4(5)(y-2)$

$x^2 = -20(y-2)$



#

2. เอากลุ่มตัวแปรกำลังสองทางฝั่งซ้าย เข้าสูตร $น^2 \pm 2นล + ล^2 = (น \pm ล)^2$
โดยเติม $ล^2$ ที่ขาดไป ทั้งสองข้างของสมการ

$$\begin{aligned} x^2 - 4x &= -8y - 12 \\ x^2 - 2(x)(2) + 2^2 &= -8y - 12 + 2^2 \\ (x-2)^2 &= -8y - 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2(y^2 + 6y) &= 3x - 24 \\ 2(y^2 + 2(y)(3) + 3^2) &= 3x - 24 + 2(3^2) \\ 2(y+3)^2 &= 3x - 6 \end{aligned}$$

3. ดึงตัวเลขที่คูณตัวแปรทางขวาออก ย้ายข้างและจัดรูปให้เป็นแบบที่ต้องการ

$$\begin{aligned} (x-2)^2 &= -8y - 8 \\ (x-2)^2 &= -8(y+1) \\ (x-2)^2 &= -4(2)(y+1) \end{aligned}$$

กราฟคว่ำ, $V(2,-1)$, $c = 2$

$$\begin{aligned} 2(y+3)^2 &= 3x - 6 \\ 2(y+3)^2 &= 3(x-2) \\ (y+3)^2 &= \tfrac{3}{2}(x-2) \\ (y+3)^2 &= 4\left(\tfrac{3}{8}\right)(x-2) \end{aligned}$$


กราฟตะแคงขวา, $V(2,-3)$, $c = \frac{3}{8}$

<u>ตัวอย่าง</u> จงหาจุดยอด จุดโฟกัส แกนสมมาตร เส้นไดเรกตริกซ์ ความยาวลาตัสเรคตัม พร้อมทั้งวาดรูปพาราโบลาซึ่งมีสมการกราฟ คือ $x^2 + 2x - 4y - 7 = 0$

<u>วิธีทำ</u> จัดรูปก่อน จะได้

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 4y - 7 &= 0 \\ x^2 + 2x &= 4y + 7 \\ x^2 + 2(x) + 1 &= 4y + 7 + 1 \\ (x+1)^2 &= 4y + 8 \\ (x+1)^2 &= 4(y+2) \\ (x+1)^2 &= 4(1)(y+2) \end{aligned}$$

สมการอยู่ในรูป $(x-h)^2 = 4c(y-k)$ ดังนั้น เป็นกราฟหงาย
จะได้ $h = -1$, $c = 1$, $k = -2$ ดังนั้น จุดยอด คือ $V(-1,-2)$
ระยะจาก V ถึง F คือ $c = 1$ ดังนั้น จุดโฟกัส คือ $F(-1,-1)$
ระยะจาก V ถึง ไดเรกตริกซ์ คือ 1 ด้วย ดังนั้น ไดเรกตริกซ์ คือ $y = -3$
แกนสมมาตร คือ เส้นแนวตั้งที่ผ่าน V ดังนั้น แกนสมมาตร คือ $x = -1$
และสุดท้าย ความยาวลาตัสเรคตัม $= 4c = 4$ หน่วย #



<u>แบบฝึกหัด</u>

2. จงบอกลักษณะกราฟ (คว่ำ หงาย ตะแคงซ้าย ขวา) จุดยอด จุดโฟกัส แกนสมมาตร เส้นไดเรคตริกซ์ และความยาวลาตัสเรคตัม ของพาราโบลาต่อไปนี้

1. $x^2 + 4x + 8y - 4 = 0$

6. จงหาสมการพาราโบลา ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $(2, 3)$ แกนสมมาตรขนานกับแกน Y และผ่านจุด $(4, 4)$

7. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง [PAT 1 (ต.ค. 53)/8]
   1. $x^2 + y^2 + 6x - 4y = 23$ เป็นสมการวงกลมที่สัมผัสกับเส้นตรงซึ่ง
      มีสมการเป็น $21x + 20y + 168 = 0$
   2. $y^2 + 16x - 6y = 71$ เป็นสมการของพาราโบลาที่มีจุดยอดที่ $(-5, 3)$ และจุดโฟกัสที่ $(-1. 3)$

8. ระยะทางจากโฟกัสของพาราโบลา $y^2 = -8x$ ไปยังเส้นตรง $2x + y = 6$ เท่ากับเท่าไร
   [PAT 1 (ก.ค. 52)/16]

9. ถ้าเส้นตรงหนึ่งผ่านจุดกำเนิดและจุดยอดของพาราโบลา $y^2 - 4y + 4x = 0$ และตัดเส้นไดเรกตริกซ์ที่จุด (a, b)
   แล้ว $a + b$ เท่ากับเท่าไร [PAT 1 (มี.ค. 52)/15]

10. พาราโบลามีจุดยอดที่ $(-1, 0)$ และมีจุดกำเนิดเป็นโฟกัส ถ้าเส้นตรง $y = x$ ตัดพาราโบลาที่จุด P และจุด Q แล้วระยะทางระหว่างจุด P กับจุด Q เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (ต.ค. 52)/2-8]

11. วงกลม C มีจุดศูนย์กลางที่จุดกำเนิด และผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีสมการเป็น $(x-2)^2 = 8y$ โดยเส้นไดเรกตริกซ์ของพาราโบลาตัดวงกลม C ที่จุด P และจุด Q ถ้าจุด R อยู่บนพาราโบลาและอยู่ห่างจากจุดโฟกัสเป็นระยะทาง 4 หน่วย แล้ว สามเหลี่ยม PQR มีพื้นที่เท่ากับเท่าไร [A-NET 50/1-8]

12. ให้พาราโบลา P มีสมการเป็น $y^2 - 2y + 6x + 4 = 0$ ถ้าวงกลมวงหนึ่งผ่านจุดโฟกัสของพาราโบลา P และสัมผัสกับเส้นตรง $3x - 2y - 6 = 0$ ณ จุด $(4, 3)$ แล้วสมการของวงกลมตรงกับข้อใดต่อไปนี้
[PAT 1 (มี.ค. 56)/8]


1. $7x^2 + 7y^2 - 4x - 82y - 55 = 0$
2. $7x^2 + 7y^2 + 4x + 82y + 55 = 0$
3. $7x^2 + 7y^2 - 4x + 82y - 55 = 0$
4. $7x^2 + 7y^2 + 4x - 82y + 55 = 0$


15. พาราโบลารูปหนึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ $\mathrm{A}(-3,2)$ มีแกนสมมาตรขนานแกน x และโฟกัส F อยู่บนเส้นตรง L ซึ่งมีสมการเป็น $4x-3y+14=0$ ถ้าพาราโบลานี้ตัดกับเส้นตรง L ที่จุด $\mathrm{B}(a,b)$ โดยที่ $a>0$ แล้ว จงหาพิกัดของจุด B [PAT 1 (ต.ค. 55)/32*]

16. ให้เส้นตรง $x-y+2=0$ ตัดกับวงกลม $x^2+y^2+6x-4y+4=0$ ที่จุด A และจุด B ถ้า (a,b) เป็นจุดโฟกัสของพาราโบลาซึ่งมีเส้นตรง $y=2$ เป็นแกนของพาราโบลาและพาราโบลานี้ผ่านจุด A และจุด B แล้ว จงหาค่าของ $a+b$ [PAT 1 (มี.ค. 54)/8]


วงรี

กราฟวงรี จะมี 2 แบบ คือ รีแนวนอน กับรีแนวตั้ง
โดยคำศัพท์ สำหรับเรียกส่วนต่างๆของวงรี จะมีดังนี้






- จุดศูนย์กลาง คือ จุดที่อยู่ตรงกลางของวงรี
- แกนเอก คือ แกนที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง ตามแนวยาวของวงรี
- แกนโท คือ แกนที่ลากผ่านจุดศูนย์กลาง ในแนวตั้งฉากกับแกนเอก
- จุดยอด คือ จุดปลายแกนเอกทั้งสองจุด นิยมแทนด้วยสัญลักษณ์ V_1 และ V_2
- จุดโฟกัส คือ จุดพิเศษ 2 จุด บนแกนเอก ที่มีสมบัติว่า ระยะจาก โฟกัส$_1$ ไป จุดไหนก็ได้บนวงรี ชิ่งกลับไป โฟกัส$_2$ จะมีความยาวเท่ากับแกนเอก เสมอ โดยเรานิยมแทนจุดโฟกัส ด้วยสัญลักษณ์ F_1 และ F_2
  เช่น



จะได้ $F_1AF_2 = F_1BF_2 = F_1CF_2 = F_1DF_2 = F_1EF_2$
$=$ ความยาวแกนเอก



ในกรณีที่จุดบนวงรีคือจุดปลายแกนโท จะได้ $F_1A = AF_2$
ดังนั้น จะได้ $F_1A =$ ครึ่งความยาวแกนเอก
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจำว่า $F_1A = V_1C$

- ลาตัสเรคตัม คือ แกนที่ลากผ่านจุดโฟกัส ในแนวตั้งฉากกับแกนเอก

สมการกราฟของวงรี จะอยู่ในรูป $\frac{(x-h)^2}{?^2}+\frac{(y-k)^2}{?^2}=1$
จะรีแนวนอนหรือรีแนวตั้ง ขึ้นกับ ตัวหาร x และ ตัวหาร y ว่าตัวไหนมีค่ามากกว่ากัน
ถ้าตัวหาร x มากกว่า จะรีแนวนอน แต่ถ้าตัวหาร y มากกว่า จะรีแนวตั้ง

เช่น $\frac{(x-1)^2}{3^2}+\frac{(y-2)^2}{2^2}=1$ → รีแนวนอน 

$\frac{(x+1)^2}{1^2}+\frac{(y-1)^2}{\sqrt{2}^2}=1$ → รีแนวตั้ง 

ดังนั้น จะได้สมการกราฟ คือ $\frac{(x+1)^2}{3^2}+\frac{y^2}{5^2}=1$

จุดยอด $\rightarrow$ เขียบ $(-1,0)$ ขึ้นลง 5 หน่วย $=(-1,5)$ และ $(-1,-5)$

จุดโฟกัส $\rightarrow$ เขียบ $(-1,0)$ ขึ้นลง 4 หน่วย $=(-1,4)$ และ $(-1,-4)$ #

ตัวอย่าง วงรีวงหนึ่ง มีจุดโฟกัสคือ $(2\sqrt{3},1)$ และ $(-2\sqrt{3},1)$ ถ้าวงรีนี้ ผ่านจุด $(2\sqrt{3},2)$ จงหาสมการวงรี


วิธีทำ จุดโฟกัสทั้งสอง วางเรียงในแนวนอน ดังนั้น สรุปได้ว่าเป็นวงรีแนวนอน

เนื่องจาก จุดศูนย์กลางวงรี จะต้องอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างจุดโฟกัส $(2\sqrt{3},1)$ และ $(-2\sqrt{3},1)$

ดังนั้น จุดศูนย์กลาง $=\left(\frac{2\sqrt{3}+(-2\sqrt{3})}{2},\frac{1+1}{2}\right)=(0,1)$ จะได้ $h=0$ และ $k=1$

และ จากสมบัติของวงรี ระยะจาก โฟกัส$_1$ ไปยังจุดบนวงรี แล้วชิ่งกลับมา โฟกัส$_2$ จะเท่ากับความยาวแกนเอก

$$\sqrt{\left(2\sqrt{3}-(-2\sqrt{3})\right)^2+(2-1)^2}=\sqrt{48+1}$$
$$=7$$



ดังนั้น ความยาวแกนเอก $=7+1=8=2a$ ดังนั้นจะได้ $a=4$

และ จากรูปจะเห็นว่า จุดศูนย์กลาง $(0,1)$ อยู่ห่างจากโฟกัสทั้งสอง $=2\sqrt{3}=\sqrt{a^2-b^2}$

แทนค่า $a=4$ แล้วแก้สมการหา b จะได้

$$2\sqrt{3}=\sqrt{4^2-b^2}$$
$$12=16-b^2$$
$$b^2=4$$
$$b=2,\cancel{-2}$$

เป็น -2 ไม่ได้ เพราะจะทำให้ความยาวแกนโทติดลบ

แทนค่า $a=4$, $b=2$, $h=0$, $k=1$ ในสมการ $\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$

จะได้สมการวงรี คือ $\frac{x^2}{4^2}+\frac{(y-1)^2}{2^2}=1$ #

แบบฝึกหัด

1. จงบอกลักษณะกราฟ (แนวนอน แนวตั้ง) จุดศูนย์กลาง จุดยอด จุดโฟกัส ความยาวแกนเอก ความยาวแกนโท ความยาวลาตัสเรคตัม และค่าความเยื้องศูนย์กลาง ของวงรีต่อไปนี้

   1. $\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{2^2}=1$

2. เอากลุ่ม x และกลุ่ม y เข้าสูตร $น^2 \pm 2นล + ล^2 = (น \pm ล)^2$

โดยเติม $ล^2$ ที่ขาดไปให้กับแต่ละกลุ่ม ทั้งสองข้างของสมการ

เช่น $x^2 - 2x$ จัดให้เข้าสูตร $น^2 - 2นล + ล^2$ ได้เป็น $x^2 - 2(x)(1) + 1^2$ (เติมเอง เพื่อให้เข้าสูตรได้ โดยเติมทั้งสองข้างของสมการ)

$y^2 + 4y$ จัดให้เข้าสูตร $น^2 - 2นล + ล^2$ ได้เป็น $y^2 + 2(y)(2) + 2^2$

สิ่งที่ต้องระวัง คือ คราวนี้ตัวที่เติมเข้าไปมี "ตัวคูณ" อยู่หน้าวงเล็บ

ดังนั้น ต้องเติม "ตัวคูณที่อยู่หน้าวงเล็บ" เข้าไปให้เหมือนๆกันทางฝั่งขวาด้วย ดังนี้

(1^2 ที่เติม มี 5 คูณอยู่, เติม; 2^2 ที่เติม มี 4 คูณอยู่, เติม; เติม 1^2 ที่มี 5 คูณอยู่ กับ 2^2 ที่มี 4 คูณอยู่)

$$\begin{aligned} 5(x^2 - 2x) &+ 4(y^2 + 4y) &&= -1 \\ 5(x^2 - 2(x)(1) + 1^2) &+ 4(y^2 + 2(y)(2) + 2^2) &&= -1 + 5(1^2) + 4(2^2) \\ 5(x-1)^2 &+ 4(y+2)^2 &&= 20 \end{aligned}$$

3. สุดท้าย จัดสมการเป็นรูป $\frac{(x-h)^2}{?^2} + \frac{(y-k)^2}{?^2} = 1$

โดยเอาตัวเลขฝั่งขวา หารตลอด เพื่อทำให้ฝั่งขวากลายเป็น 1

และทางฝั่งซ้าย ให้เหยียบตัวเลขที่คูณอยู่หน้า $(\quad)^2$ มุดลงไปเป็น "ตัวหารของส่วน" ดังนี้

$$\begin{aligned} 5(x-1)^2 + 4(y+2)^2 &= 20 && \text{หารตลอดด้วย } 20 \\ \frac{5(x-1)^2}{20} + \frac{4(y+2)^2}{20} &= 1 && \text{เอา } 5 \text{ กับ } 4 \text{ ที่คูณอยู่ มุดลงไปเป็นตัวหารของส่วน} \\ \frac{(x-1)^2}{\frac{20}{5}} + \frac{(y+2)^2}{\frac{20}{4}} &= 1 \\ \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+2)^2}{5} &= 1 && \text{จัดให้เป็นรูป } \frac{(x-h)^2}{?^2} + \frac{(y-k)^2}{?^2} = 1 \\ \frac{(x-1)^2}{2^2} + \frac{(y+2)^2}{\sqrt{5}^2} &= 1 \end{aligned}$$

ดังนั้น $5x^2 + 4y^2 - 10x + 16y + 1 = 0$ เป็นวงรีแนวตั้ง ที่มีจุดศูนย์กลาง $= (1, -2)$

แกนเอกยาว $2\sqrt{5}$ และ แกนโทยาว 4 เป็นต้น

<u>ตัวอย่าง</u> จงหาจุดโฟกัสของวงรี $28x^2 + 12y^2 + 28x - 72y + 31 = 0$

<u>วิธีทำ</u> จับกลุ่ม x กับกลุ่ม y แล้วย้ายตัวเลขไปทางขวา จะได้ $(28x^2 + 28x) + (12y^2 - 72y) = -31$

จากนั้น ดึงตัวเลขที่คูณ x^2 กับ y^2 ออก $28(x^2 + x) + 12(y^2 - 6y) = -31$

เติม $ล^2$ แล้วเข้าสูตร $น^2 - 2นล + ล^2$ จะได้

$$\begin{aligned} 28(x^2 + x) &+ 12(y^2 - 6y) &&= -31 \\ 28\left(x^2 + 2(x)\left(\tfrac{1}{2}\right) + \left(\tfrac{1}{2}\right)^2\right) &+ 12(y^2 - 2(y)(3) + 3^2) &&= -31 + 28\left(\tfrac{1}{2}\right)^2 + 12(3)^2 \\ 28\left(x + \tfrac{1}{2}\right)^2 &+ 12(y-3)^2 &&= 84 \end{aligned}$$

จากนั้น หารตลอดด้วย 84 แล้ว จัดรูปให้เป็น $\frac{(x-h)^2}{?^2} + \frac{(y-k)^2}{?^2} = 1$

6. วงกลมวงหนึ่งมีจุดศูนย์กลาง อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงรีที่มีสมการเป็น

$$9x^2 + 4y^2 - 36x - 24y + 36 = 0$$

ถ้าวงกลมนี้สัมผัสกับเส้นตรงที่ผ่านจุด $(1, 3)$ และ $(5, 0)$ แล้ว รัศมีของวงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไร [A-NET 49/1-5]

7. กำหนดให้ วงรีรูปหนึ่งมีโฟกัสอยู่ที่จุด $(\pm 3, 0)$ และผ่านจุด $\left(2, \frac{\sqrt{21}}{2}\right)$ จุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนวงรีที่กำหนด [PAT 1 (มี.ค. 52)/17]

1. $(-4, 0)$
2. $\left(0, \frac{5\sqrt{2}}{2}\right)$
3. $(6, 0)$
4. $\left(0, -3\sqrt{2}\right)$

8. ให้พาราโบลารูปหนึ่ง มีสมการเป็น $y^2 - 4y + 40x - 236 = 0$ โดยมี V และ F เป็นจุดยอด และโฟกัสของพาราโบลาตามลำดับ ถ้าวงรีรูปหนึ่ง ผ่านจุด $(4, 6)$ และมีโฟกัสอยู่ที่ V และ F แล้วสมการของวงรีรูปนี้ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (ต.ค. 58)/11]

1. $4x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 140 = 0$
2. $4x^2 + 9y^2 + 8x + 36y - 140 = 0$
3. $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y - 140 = 0$
4. $9x^2 + 4y^2 - 36x - 8y - 180 = 0$
5. $9x^2 + 4y^2 + 36x - 8y + 180 = 0$

12. วงรีที่มีแกนเอกอยู่บนแกน x แกนโทอยู่บนแกน y ระยะระหว่างจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับ 12 หน่วย ถ้าความยาวของคอร์ดที่ผ่านจุดโฟกัสหนึ่งและตั้งฉากกับแกนเอกของวงรี เท่ากับ 10 หน่วย แล้วสมการของวงรี คือข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 55)/7]

1. $5x^2 + 9y^2 = 405$
2. $9x^2 + 5y^2 = 81$
3. $5x^2 + 9y^2 = 225$
4. $9x^2 + 5y^2 = 20$

13. ถ้า k, l และ m เป็นจำนวนจริงที่ทำให้วงรี $kx^2 + ly^2 - 72x - 24y + m = 0$ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด $(4, 3)$ และสัมผัสแกน Y แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ผิด [A-NET 50/1-7]

1. ความยาวแกนเอกเท่ากับ 12 หน่วย
2. ความยาวแกนโทเท่ากับ 8 หน่วย
3. ระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสทั้งสองเท่ากับ $4\sqrt{5}$ หน่วย
4. จุด $(2, 6)$ อยู่บนวงรี

16. กำหนดให้วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น $x^2 + Ay^2 + Bx + Cy - 92 = 0$ เมื่อ $A > 1$ โดยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(2, 1)$ และแกนเอกยาวเป็น 2 เท่าของแกนโท ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง [PAT 1 (เม.ย. 57)/9*]
    1. $A + B + C = 0$
    2. ความเยื้องศูนย์กลางของวงรีเท่ากับ $\frac{\sqrt{3}}{5}$
    3. วงรีมีจุดศูนย์กลางร่วมกับจุดศูนย์กลางของวงกลม $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$ และแกนเอกยาวเท่ากับรัศมีของวงกลม
    4. ผลบวกของระยะทางจากจุด $(2, 6)$ ไปยังโฟกัสทั้งสองของวงรีเท่ากับ 20 หน่วย

17. กำหนดให้วงรีมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ $(0, 0)$ และมีโฟกัส F_1 และ F_2 อยู่บนแกน x จุด $A(4, 1)$ เป็นจุดบนวงรีโดยที่ผลบวกระยะทางจากจุด $A(4, 1)$ ไปยังจุดโฟกัสทั้งสองมีค่าเท่ากับ $6\sqrt{2}$ ให้เส้นตรง L ตัดแกน x ที่จุด $(4.5, 0)$ และสัมผัสกับวงรีที่จุด $A(4, 1)$ ถ้า d เป็นระยะห่างระหว่างจุด $(0, 0)$ กับเส้นตรง L แล้ว ค่าของ $d^2|AF_1||AF_2|$ เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 56)/31]

ปกติ เราจะให้ “a แทนตัวตั้ง” และ “b แทนตัวลบ” ดังนั้น แนวนอน $\rightarrow \frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$

แนวตั้ง $\rightarrow \frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2}=1$

สูตรที่ต้องท่องคือ จุดศูนย์กลาง อยู่ที่ (h,k)

ความยาวแกนตามขวาง $=2a$ ความยาวแกนสังยุค $=2b$ ความยาวลาตัสเรคตัม $=\frac{2b^2}{a}$

ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางถึงจุดโฟกัส $c=\sqrt{a^2+b^2}$

ถ้าจะหาพิกัดของจุดอื่นๆ ก็ให้เริ่มจากจุดศูนย์กลาง แล้วดูว่าต้องขยับไปทางไหนเท่าไหร่

จะเห็นว่าสมการและสูตรของไฮเพอร์โบลา คล้ายๆกับวงรี

ถ้าจะเทียบความคล้ายระหว่าง วงรี กับไฮเพอร์โบลา จะสรุปได้ดังนี้

วงรี	แกนเอก	แกนโท	$a=$ ตัวมาก	$b=$ ตัวน้อย	$c=\sqrt{a^2-b^2}$
ไฮเพอร์โบลา	แกนตามขวาง	แกนสังยุค	$a=$ ตัวตั้ง	$b=$ ตัวลบ	$c=\sqrt{a^2+b^2}$

หมายเหตุ: ในวงรี แกนเอกจะยาวกว่าแกนโทเสมอ

แต่ในไฮเพอร์โบลา แกนตามขวาง จะยาวหรือจะสั้นกว่า แกนสังยุคก็ได้

“เส้นกำกับ” จะเป็นเส้นตรง 2 เส้น ไขว้กันเป็นกากบาท

วิธีตอบเส้นกำกับ ให้ตอบเป็นสมการเส้นตรง 2 สมการ

- $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ จะมีเส้นกำกับคือ $\frac{x-h}{a}=\frac{y-k}{b}$ และ $\frac{x-h}{a}=-\frac{y-k}{b}$
- $\frac{(y-k)^2}{a^2}-\frac{(x-h)^2}{b^2}=1$ จะมีเส้นกำกับคือ $\frac{y-k}{a}=\frac{x-h}{b}$ และ $\frac{y-k}{a}=-\frac{x-h}{b}$

หรือจะรวมเป็นสมการเดียวโดยใช้เครื่องหมาย $\pm$ ก็ได้ (เช่น $\frac{x-h}{a}=\pm\frac{y-k}{b}$)

หรือถ้าไม่ชอบเครื่องหมาย $\pm$ จะยกกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อกำจัด $\pm$ เป็น $\frac{(x-h)^2}{a^2}=\frac{(y-k)^2}{b^2}$ ก็ได้

สังเกตว่า ถ้าย้ายข้าง จะกลายเป็น $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=0$ เหมือนกับสมการไฮเพอร์โบลา ที่เปลี่ยน 1 เป็น 0 เลย

บางคนจึงนิยมจำว่า สมการเส้นกำกับ ได้จากการ “นำสมการไฮเพอร์โบลามาเปลี่ยน 1 ทางขวา เป็น 0”

ไฮเพอร์โบลาที่มีเส้นกำกับทั้งสองตั้งฉากกัน จะมีชื่อเรียกพิเศษว่า “ไฮเพอร์โบลามุมฉาก”

โดยเส้นกำกับทั้งสองจะตั้งฉากกันเมื่อ แกนตามขวางกับแกนสังยุคยาวเท่ากัน (นั่นคือ เมื่อ $a=b$)

<u>ตัวอย่าง</u> จงวาดรูป และหาส่วนประกอบต่างๆของไฮเพอร์โบลา ซึ่งมีสมการกราฟ คือ $\frac{(x+4)^2}{4}-\frac{(y-1)^2}{9}=1$

<u>วิธีทำ</u> สมการกราฟเป็นแบบ x ตั้ง ลบด้วย y ดังนั้น เป็นไฮเพอร์โบลาแนวนอน

ใช้รูป $\frac{(x-h)^2}{a^2}-\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$ จะได้ $a=2$, $b=3$, $h=-4$, $k=1$


ดังนั้น จุดศูนย์กลาง $=(h,k)=(-4,1)$

ความยาวแกนตามขวาง $=2a=2(2)=4$

ความยาวแกนสังยุค $=2b=2(3)=6$

ความยาวลาตัสเรคตัม $=\frac{2b^2}{a}=\frac{2(3)^2}{2}=9$

ระยะจากศูนย์กลางถึงโฟกัส $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$



2. $\frac{(y+2)^2}{4}-\frac{(x-1)^2}{5}=1$

3. $y^2-x^2=1$

ในกรณีที่โจทย์ให้สมการในรูป $Ax^2+By^2+Cx+Dy+C=0$ มาให้ เราจะใช้วิธีจัดรูปแบบเดียวกับวงรี แต่คราวนี้ ระหว่าง A กับ B จะมีตัวหนึ่งเป็นลบ และตัวหนึ่งเป็นบวก

1. จับกลุ่ม x ไว้ด้วยกัน จับกลุ่ม y ไว้ด้วยกัน กลุ่มที่เป็นตัวเลขแบบไม่มี x หรือ y ให้ย้ายไปอีกฝั่ง จากนั้น ดึงตัวตัวเลขที่คูณกับ x^2 กับ y^2 ออกมานอกวงเล็บ
   เช่น ถ้าโจทย์ให้สมการกราฟมาในรูป $3x^2-4y^2-12x-8y+20=0$
   เราจะจับกลุ่มใหม่ได้เป็น $(3x^2-12x)+(-4y^2-8y)=-20$
   ดึงตัวเลขที่คูณ x^2 กับ y^2 ออก $3(x^2-4x)-4(y^2+2y)=-20$

2. เอากลุ่ม x และกลุ่ม y เข้าสูตร $น^2\pm2นล+ล^2=(น\pm ล)^2$
   โดยเติม $ล^2$ ที่ขาดไปให้กับแต่ละกลุ่ม ทั้งสองข้างของสมการ
   สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นจากตอนทำวงรี คือ คราวนี้ตัวที่เติมเข้าไป อาจจะมี “เลขติดลบ” คูณอยู่หน้าวงเล็บด้วย ดังนั้น ต้องเติม เครื่องหมาย บวก หรือ ลบ ที่คูณอยู่หน้าวงเล็บ เข้าไปให้เหมือนๆกันทางฝั่งขวาด้วย ดังนี้

เติม 2^2 ที่มี 3 คูณอยู่ กับ 1^2 ที่มี -4 คูณอยู่

	เติม ↓		เติม ↓	
$3(x^2-4x)$		$-\ 4(y^2+2y)$	$=-20$	
$3(x^2-2(x)(2)+2^2)$		$-\ 4(y^2+2(y)(1)+1^2)$	$=-20+3(2^2)-4(1^2)$	
$3(x-2)^2$		$-\ 4(y+1)^2$	$=-12$	

3. สุดท้าย เอาตัวเลขฝั่งขวา หารตลอด เพื่อทำให้ฝั่งขวากลายเป็น 1 แล้วจัดสมการให้เข้ารูปไฮเพอร์โบลา ดังนี้

หารตลอดด้วย -12

$$3(x-2)^2-4(y+1)^2=-12$$
$$\frac{3(x-2)^2}{-12}-\frac{4(y+1)^2}{-12}=1$$

สลับตัวลบไว้ข้างหลัง

$$-\frac{3(x-2)^2}{12}+\frac{4(y+1)^2}{12}=1$$
$$\frac{4(y+1)^2}{12}-\frac{3(x-2)^2}{12}=1$$

$$\frac{(y+1)^2}{\frac{12}{4}}-\frac{(x-2)^2}{\frac{12}{3}}=1$$
$$\frac{(y+1)^2}{3}-\frac{(x-2)^2}{4}=1$$
$$\frac{(y+1)^2}{\sqrt{3}^2}-\frac{(x-2)^2}{2^2}=1$$

3. $9x^2 - 16y^2 + 18x - 64y + 89 = 0$

3. จงหาสมการของไฮเพอร์โบลา ที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(2, 0)$ และ $(-2, 0)$ และมีแกนสังยุคยาว 6

4. จงหาสมการของไฮเพอร์โบลา ที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(1, 5)$ และ $(1, -1)$ และมีจุดโฟกัสจุดหนึ่งอยู่ที่ $(1, -3)$

5. จงหาสมการของไฮเพอร์โบลา ที่มีจุดยอดอยู่ที่ $(1, 1)$ และ $(1, -3)$ และผ่านจุด $(4, 3)$

9. กำหนดวงกลมรูปหนึ่งมีจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่บนจุดศูนย์กลางและจุดโฟกัสด้านหนึ่งของไฮเพอร์โบลา $9x^2 - 16y^2 - 90x + 64y + 17 = 0$ แล้ววงกลมดังกล่าวมีพื้นที่เท่ากับเท่าไร [PAT 1 (ก.ค. 53)/8]

10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง [PAT 1 (มี.ค. 54)/9]
    1. ไฮเพอร์โบลา $4x^2 - 25y^2 + 24x - 100y - 164 = 0$ มีจุดยอดอยู่ที่จุดยอดของวงรี $4x^2 + 25y^2 + 24x + 100y + 36 = 0$ และมีแกนสังยุคยาวเท่ากับแกนโทของวงรี
    2. วงรี $4x^2 + 25y^2 + 24x + 100y + 36 = 0$ มีจุดยอดจุดหนึ่งอยู่บนพาราโบลา $y^2 + 4y - 4x + 12 = 0$

11. กำหนดให้ $9x^2 - 16y^2 - 18x + 64y - 199 = 0$ เป็นสมการของไฮเพอร์โบลา ถ้าพาราโบลารูปหนึ่งมีแกนสมมาตรขนานแกน y ตัดแกน x ที่จุด $(1, 0)$ และผ่านจุดยอดทั้งสองของไฮเพอร์โบลาที่กำหนดให้ แล้ว จุดในข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่บนพาราโบลา [PAT 1 (มี.ค. 56)/17]

1. $(2, \frac{1}{8})$
2. $(-1, \frac{1}{2})$
3. $(3, \frac{1}{2})$
4. $(4, \frac{1}{4})$

12. กำหนดให้พาราโบลามีจุดยอดที่ $(-3, -2)$ ผ่านจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา $5x^2 - 4y^2 - 16y + 4 = 0$ จงหาสมการไดเรคตริกซ์ของพาราโบลา [PAT 1 (ธ.ค. 54)/9]

1. $4y + 15 = 0$
2. $4y + 9 = 0$
3. $4x + 9 = 0$
4. $4x + 15 = 0$

13. ให้ A และ B เป็นจุดยอดของไฮเพอร์โบลา $4x^2 - y^2 - 24x + 6y + 11 = 0$ สมการของพาราโบลาที่มี $\overline{AB}$ เป็นเลตัสเรกตัม และมีกราฟอยู่เหนือแกน X คือสมการในข้อใดต่อไปนี้ [A-NET 51/1-11]

1. $(x-3)^2 = 4(y-2)$
2. $(x-3)^2 = 8(y-1)$
3. $(x-2)^2 = 4(y-2)$
4. $(x-2)^2 = 8(y-1)$

16. กำหนดให้วงรีรูปหนึ่งมีสมการเป็น $25x^2+21y^2+100x-42y-404=0$ แล้วไฮเพอร์โบลาที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดโฟกัสทั้งสองของวงรีและผ่านจุด $\left(-3\,,1+\sqrt{8}\right)$ มีสมการตรงกับข้อใดต่อไปนี้ [PAT 1 (มี.ค. 53)/8]

1. $5y^2-4x^2-10\sqrt{8}y-32x-25=0$
2. $3y^2-2x^2-6\sqrt{8}y-8x+15=0$
3. $y^2-4x^2-2y-16x-19=0$
4. $y^2-7x^2-2y-28x-28=0$

17. ให้ F เป็นโฟกัสของพาราโบลา $4y=x^2-6x+13$ ถ้าไฮเพอร์โบลารูปหนึ่งมีสมบัติดังนี้

(ก) แกนตามขวางขนานแกน y

(ข) จุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาอยู่ที่ F


(ค) โฟกัสหนึ่งของไฮเพอร์โบลาคือ $(3,2+2\sqrt{13})$


(ง) แกนสังยุคยาว 12 หน่วย

แล้ว จงหาสมการไฮเพอร์โบลาในรูป $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ [PAT 1 (เม.ย. 57)/8]

ไฮเพอร์โบลาแบบเอียง


นอกจากนี้ เรายังต้องรู้ว่า สมการในรูป $xy = \pm m$ (เมื่อ m เป็นตัวเลขอะไรก็ได้) ก็เป็นไฮเพอร์โบลาด้วย ในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เราได้เห็นกราฟของสมการ $xy = \pm m$ ไปแล้ว ดังนี้






ซึ่งถ้าสังเกตให้ดี กราฟเหล่านี้จะเป็นไฮเพอร์โบลาแบบเอียงๆ
โดยมีแกน X กับ แกน Y เป็นเส้นกำกับ นั่นเอง
โดยไฮเพอร์โบลาในรูป $xy = k$ จะเป็นไฮเพอร์โบลามุมฉากเสมอ

$xy = m$ จะมีจุดยอดอยู่ที่ $(\sqrt{m}, \sqrt{m})$ และ $(-\sqrt{m}, -\sqrt{m})$




$xy = -m$ จะมีจุดยอดอยู่ที่ $(-\sqrt{m}, \sqrt{m})$ และ $(\sqrt{m}, -\sqrt{m})$



นอกจากนี้ เรายังสามารถ "เลื่อน" ไฮเพอร์โบลาได้ด้วย โดย $(x-h)(y-k) = \pm m$ จะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (h, k) และมีเส้นกำกับ คือ $x = h$ และ $y = k$ โดยทุกจุดบนกราฟ จะมี พิกัด x = พิกัด x เดิม $+ h$
พิกัด y = พิกัด y เดิม $+ k$


เช่น

$(x-2)(y-1) = 1$




จุดศูนย์กลาง $(2, 1)$
จุดยอด $(3, 2)$, $(1, 0)$
เส้นกำกับ $x = 2$ และ $y = 1$

$(x-1)(y+2) = 2$



จุดศูนย์กลาง $(1, -2)$
จุดยอด $(1+\sqrt{2}, -2+\sqrt{2})$
$(1-\sqrt{2}, -2-\sqrt{2})$
เส้นกำกับ $x = 1$ และ $y = -2$

$(x+1)(y) = -2$



จุดศูนย์กลาง $(-1, 0)$
จุดยอด $(-1-\sqrt{2}, \sqrt{2})$
$(-1+\sqrt{2}, -\sqrt{2})$
เส้นกำกับ $x = -1$ และ $y = 0$

รูปทั่วไปของภาคตัดกรวย

จากที่เรียนมาทั้งหมด จะเห็นว่า วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา ต่างก็มีสมการรูปทั่วไปแบบเดียวกัน คือ $Ax^2+By^2+Cx+Dy+E=0$ ซึ่งจะมีวิธีดูในเบื้องต้น ว่าสมการดังกล่าว เป็นกราฟอะไรดังนี้

$A=0$ และ $B=0$ → เส้นตรง

$A=0$ หรือ $B=0$ อย่างใดอย่างหนึ่ง → พาราโบลา

$A=0$ แต่ $B\neq 0$ → ตะแคงซ้าย ขวา

$A\neq 0$ แต่ $B=0$ → คว่ำ หงาย

$A=B\neq 0$ → วงกลม

$A\neq B$ แต่ A กับ B มีเครื่องหมายเหมือนกัน → วงรี

$A\neq B$ และ A กับ B มีเครื่องหมายต่างกัน → ไฮเพอร์โบลา

เช่น	$x^2+y^2+2x-4y-5=0$	$\rightarrow A=B=1$	→ วงกลม
	$x^2-y^2+2=0$	$\rightarrow A=1,\ B=-1$	→ ไฮเพอร์โบลา
	$-2x^2-2y^2+4x+8y+2=0$	$\rightarrow A=B=-2$	→ วงกลม
	$-2x^2-3y^2+5x+y+2=0$	$\rightarrow A=-2,\ B=-3$	→ วงรี
	$3x^2-4x+4y+2=0$	$\rightarrow B=0$	→ พาราโบลาคว่ำหงาย
	$-x^2+2y^2+2=0$	$\rightarrow A=-1, B=2$	→ ไฮเพอร์โบลา
	$2y^2+2x-5=0$	$\rightarrow A=1, B=2$	→ พาราโบลาตะแคง
	$x^2+2y^2+2=0$	$\rightarrow A=1, B=2$	→ วงรี

<u>แบบฝึกหัด</u>

1. จงระบุว่าสมการต่อไปนี้ เป็นกราฟอะไร

1. $x^2+y^2=1$
2. $x^2-y^2=1$
3. $x^2-y=1$
4. $x^2+y^2=2$
5. $3x^2+2y^2=1$
6. $3x^2-2x+2y^2=1$
7. $y^2+2x-1=0$
8. $(x-2)^2=2y^2+1$
9. $x^2-2y+2x+5=0$
10. $3x^2-x=3y^2+2$

วงกลม

1. 1. $(2,-1),\ 2$ 2. $(-2,0),\ \sqrt{2}$ 3. $(2,-3), 2\sqrt{2}$ 4. $(0,1), 2$
   5. $(-1,-\frac{1}{2}),\ \frac{3}{2}$ 6. $(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}),\frac{1}{2}$
2. $(x-1)^2+(y+1)^2=9$
3. $x^2+(y-2)^2=2$
4. $x^2+(y-2)^2=8$
5. $(x-3)^2+y^2=1$, $\left(x+\frac{1}{3}\right)^2+y^2=1$
6. $(x-1)^2+(y+1)^2=5$

ให้จุดสัมผัส คือจุด $(2,k)$

เนื่องจาก รัศมี จะตั้งฉากกับเส้นสัมผัส ที่จุดสัมผัส ดังนั้น ความชันรัศมี $\times$ ความชันเส้นสัมผัส $=-1$

รัศมี จาก $(1,-1)$ ไปจุดสัมผัส $(2,k)$ จะมีความชัน $=\frac{k-(-1)}{2-1}=k+1$ จะได้สมการ $(k+1)\times-\frac{1}{2}=-1$

$$\begin{aligned} k+1 &= 2 \\ k &= 1 \end{aligned}$$

จะได้จุดสัมผัสคือ $(2,1)$ ดังนั้น รัศมียาว $\sqrt{(2-1)^2+\left(1-(-1)\right)^2}=\sqrt{5}$

แทนใน $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$ จะได้สมการวงกลม คือ $(x-1)^2+(y+1)^2=5$

7. 5.5
8. 1
9. 4
10. 1
11. 2
12. 3
13. 2


พาราโบลา


1. 1. ตะแคงขวา ; $V(0,0)$; $F(3,0)$; $y=0$; $x=-3$; 12
   2. คว่ำ ; $V(1,0)$; $F(1,-1)$; $x=1$; $y=1$; 4
   3. ตะแคงซ้าย ; $V(-1,-2)$; $F(-3,-2)$; $y=-2$; $x=1$; 8
2. 1. คว่ำ ; $V(-2,1)$; $F(-2,-1)$; $x=-2$; $y=3$; 8
   2. ตะแคงขวา ; $V(1,1)$; $F(\frac{9}{8},1)$; $y=1$; $x=\frac{7}{8}$; $\frac{1}{2}$
   3. หงาย ; $V(0,1)$; $F(0,\frac{5}{4})$; $x=0$; $y=\frac{3}{4}$; 1
3. $(y+2)^2=8(x-1)$
4. $x^2=-4(y-1)$
5. $(y+1)^2=-12(x+1)$
6. $(x-2)^2=4(y-3)$
7. -
8. $2\sqrt{5}$
9. 6
10. 8
11. 8
12. 4
13. 18
14. 5
15. $(1,6)$
16. $\frac{5}{4}$
17. $1,2$

วงรี


1. 1. แนวนอน ; $C(0,0)$; $V(\pm3,0)$; $F(\pm\sqrt{5},0)$; 6 ; 4 ; $\frac{8}{3}$; $\frac{\sqrt{5}}{3}$
   2. แนวตั้ง ; $C(0,0)$; $V(0,\pm5)$; $F(0,\pm4)$; 10 ; 6 ; $\frac{18}{5}$; $\frac{4}{5}$

ไฮเพอร์โบลาแบบเอียง


1. 1. 
จุดศูนย์กลาง $(0, 0)$
จุดยอด $(2, 2)$, $(-2, -2)$
เส้นกำกับ $x = 0$ และ $y = 0$

2. 

จุดศูนย์กลาง $(1, 2)$
จุดยอด $(0, 3)$, $(2, 1)$
เส้นกำกับ $x = 1$ และ $y = 2$

3. 

จุดศูนย์กลาง $(-2, 1)$
จุดยอด $(-2 + \sqrt{2}\,, 1 + \sqrt{2})$
$(-2 - \sqrt{2}\,, 1 - \sqrt{2})$
เส้นกำกับ $x = -2$ และ $y = 1$

4. 

จุดศูนย์กลาง $(0, -1)$
จุดยอด $(-2, 1)$, $(2, -3)$
เส้นกำกับ $x = 0$ และ $y = -1$

รูปทั่วไปของภาคตัดกรวย

1. 1. วงกลม 2. ไฮเพอร์โบลา 3. พาราโบลาคว่ำหงาย 4. วงกลม
5. วงรี 6. วงรี 7. พาราโบลาตะแคง 8. ไฮเพอร์โบลา
9. พาราโบลาคว่ำหงาย 10. ไฮเพอร์โบลา
2. $\frac{y-1}{x+2} \cdot \frac{y-5}{x-4} = 3$; ไฮเพอร์โบลาแนวนอน 3. 4 4. 4
5. $3\sqrt{2} - 4$ 6. 3

เครดิต

ขอบคุณ คุณ Wasitthirawat Krailoet
และ คุณ Sirichai Wiriyajaree
และ คุณ Wabut Thongbor ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารครับ