

Key Observations

- $\max_i \mathbf{e}_i^{-1} \lambda_i \equiv \mathbf{e}^{-1} (\sum_i \lambda_i)$

- Define $\lambda_i = x_i^p = (\sum_{j \in [s]} x_i(j))^p$

- Can we compute $i^* = \operatorname{argmax}_i \mathbf{e}_i^{-1} \cdot x_i^p$ in one round?
 - Can then compute $\max_i \mathbf{e}_i^{-1} x_i^p$ using an additional round

- Useful property:

- $\sum_i \mathbf{e}_i^{-1} \lambda_i \leq O(\log^2 n) \max_i \mathbf{e}_i^{-1} \lambda_i$ -- the largest value is significant

2

0

Global

\mathbf{e}_1^{-1}

x_1^p

\mathbf{e}_n^{-1}

x_n^p

Local

$$\mathbf{e}_1^{-1}$$

$$x_1(1)^p$$

$$\mathbf{e}_1^{-1}$$

$$x_1(s)^p$$

$$\mathbf{e}_n^{-1}$$

$$x_n(1)^p$$

$$\mathbf{e}_n^{-1}$$

$$x_n(s)^p$$

Key Observations

- $\max_i \mathbf{e}_i^{-1} \lambda_i \equiv \mathbf{e}^{-1}(\sum_i \lambda_i)$


- Define $\lambda_i = x_i^p = (\sum_{j \in [s]} x_i(j))^p$

- Can we compute $i^* = \operatorname{argmax}_i \mathbf{e}_i^{-1} \cdot x_i^p$ in one round?

- Can then compute $\max_i \mathbf{e}_i^{-1} x_i^p$ using an additional round

- Useful property:

- $\sum_i \mathbf{e}_i^{-1} \lambda_i \leq O(\log^2 n) \max_i \mathbf{e}_i^{-1} \lambda_i$ -- the largest value is significant



High Level Ideas