Festa Junina

A escola de Luísa está se preparando para a festa junina deste ano. Para este grande evento, a cozinha da escola precisa de ingredientes para preparar pratos típicos como canjica e pamonha. Além disso, os alunos participarão de uma dança de quadrilha, para a qual eles precisam de roupas tradicionais como camisas xadrez e chapéus de palha.

A professora de Luísa pediu ajuda a ela para comprar ingredientes e roupas para a festa. Luísa irá comprar as roupas na lojinha do bairro e os ingredientes no supermercado. A escola, o supermercado e a lojinha estão localizados na mesma rua reta. A posição de cada um destes três prédios pode ser representada por um inteiro indicando a distância (em metros) do prédio ao início da rua. A distância percorrida para ir de um prédio a outro é dada pela diferença entre as posições deles.

Luísa atualmente está na escola e precisa visitar o supermercado e a lojinha, em qualquer ordem. Em seguida, ela deve voltar com as compras para a escola. Ajude Luísa a descobrir qual a distância que ela precisa percorrer, no mínimo, para fazer todas as compras e voltar para a escola.

Por exemplo, se as posições da escola, supermercado e lojinha são 10, 5 e 13, respectivamente, Luísa pode ir primeiro ao supermercado, percorrendo $10 - 5 = 5$ metros, então ir do supermercado à lojinha, percorrendo $13 - 5 = 8$ metros, e então voltar para a escola, percorrendo $13 - 10 = 3$ metros. No total, a distância que ela vai percorrer será $5 + 8 + 3 = 16$ metros. É possível verificar que, caso ela escolha visitar primeiro a lojinha e depois o supermercado, ela também percorrerá 16 metros no total.

Entrada

A entrada possui três linhas, cada uma contendo um único inteiro:

- a primeira linha contém o inteiro E, a posição da escola;
- a segunda linha contém o inteiro S, a posição do supermercado;
- a terceira linha contém o inteiro L, a posição da lojinha.

Saída

Seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único inteiro, a distância total em metros que Luísa precisa percorrer.

Restrições

É garantido que todo caso de teste satisfaz as restrições abaixo.

- $0 \leq E, S, L \leq 1\,000$
- As posições dos três locais são distintas.

Informações sobre a pontuação

A tarefa vale 100 pontos.

Exemplos

Entrada

Copiar

```
10
5
13
```

Saída

Copiar

```
16
```

Entrada

Copiar

```
4
25
17
```

Saída

Copiar

```
42
```

Entrada

Copiar

```
1000
0
500
```

Saída

Copiar

```
2000
```