КАК УЗНАТЬ,

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЗАБОЛЕВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ?

(3ΠA)

НЕДОЛЕЧЕННОЕ ЗПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АМПУТАЦИИ. НО МНОГИЕ ЛЮДИ ДАЖЕ НЕ РАСПОЗНАЮТ У СЕБЯ ЭТОЙ БОЛЕЗНИ!

Они могут предполагать, что боль в ногах и проблемы при хождении являются всего лишь признаками старения. На самом же деле они могут страдать ЗПА, серьезным заболеванием, сопровождающимся значительным снижением кровотока к ногам и ступням.

1 из 20 АМЕРИКАНЦЕВ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 50 ЛЕТ СТРАДАЕТ ОТ ЗПА¹

1 из 3 человек с сахарным диабетом в возрасте старше 50 лет может иметь зпа¹

Другие факторы риска: высокий уровень холестерина¹; высокое кровяное давление¹; случаи ЗПА в семье¹.

Лечение ЗПА зависит от многих факторов, в том числе Ваших симптомов, состояния здоровья, а также степени тяжести закупорок в артериях. Какова цель лечения? **УМЕНЬШИТЬ БОЛЬ, УЛУЧШИТЬ СПОСОБНОСТЬ ХОДИТЬ, СНИЗИТЬ РИСК СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА И ИНСУЛЬТА, А ТАКЖЕ УБЕРЕЧЬ КОНЕЧНОСТИ ОТ АМПУТАЦИИ.**

ПРИМИТЕ МЕРЫ — **ЛЕЧИТЕ ЗПА СЕГОДНЯ**

Если Вы действительно обнаружили у себя ЗПА, существует множество мер, которые Вы и Ваш врач можете предпринять.

МОЖЕТЕ НАЧАТЬ С ИЗМЕНЕНИЙ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ²



КОНТРОЛИРУЙТЕ СВОЙ ДИАБЕТ



РЕГУЛЯРНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

ЕШЬТЕ ЗДОРОВУЮ ПИЩУ

БРОСЬТЕ КУРИТЬ

ВАМ МОЖЕТ ТАКЖЕ ПОНАДОБИТЬСЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ



- СНИЗЬТЕ высокий уровень холестерина и/или высокое кровяное давление
- РАЗЖИЖАЙТЕ свою кровь, чтобы предотвратить образование сгустков
- УЛУЧШАЙТЕ свою способность ходить и уменьшайте боль в ногах

Если Вы обнаружили симптомы или факторы риска ЗПА, **ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ**.



Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.StandAgainstAmputation.com