
1800万 美国人患有 PAD²。



每年实施的截肢术 超过 160,000 例3。

- Schiavetta A, et al. Stem Cells Translational Medicine.
 2012; 1:572-578. And Sage Report 2010.
 Allie et al, 24-Carat Gold, 14-Carat Gold, or Platinum Standards in the Treatment of Critical Limb Ischemia: Bypass Surgery or Endovascular Intervention? J. Endovasc Ther, 2009; 16 (Suppl 1): 134-146.



AMPUTATION

要了解详细信息,请访问 www.StandAgainstAmputation.com

脚部疼痛? 腿部酸痛? 腿脚刺痛、沉重或发冷? 可能是 PAD。

(周围血管病)





什么是 PAD?



将血液从心脏输送到腿和脚的动脉**内壁** 积聚斑块。

动脉硬化并变窄(动脉粥样硬化),流向 腿和脚的血液大幅减少。

通往心脏和大脑的动脉也可能硬化并变窄, 导致心脏病发作或中风的风险升高。

采取行动:

尽早了解 PAD 非常重要。

PAD 患者因冠心病

死亡的风险

是无 PAD 人士的

6倍。



您有 PAD 吗? 您有 PAD 风险吗?

回答这些问题有助于医生确定您是否有必要接受 PAD 筛选,从而更好地评估您的血管健康。

一些增加 PAD 患病几率的风险因素。

三有加「八口心内八十二八八四大		
您是否为 50 岁或以上?	□是	□否
您目前或过去是否吸烟?	□是	□否
您是否被确诊患有以下病症:		
糖尿病?	□是	□否
慢性肾病?	□是	□否
高血压?	□是	□否
高胆固醇?	□是	□否
PAD 的警示症状。您是否		
感觉腿部肌肉疲劳、沉重或痉挛?	□是	□否
脚趾或脚部看起来苍白、变色或发紫?	□是	□否
出现影响睡眠的腿部或脚部疼痛?	□是	□否
脚趾、脚或腿上的疮口或伤口愈合缓慢 或无法愈合?	□是	□否
一只腿或一只脚感觉比另一只冷?	□是	□否
脚趾甲增厚、发黄,且不生长?	□是	□否

回答"是"的问题越多, PAD 风险就越高。

在具有最严重 PAD

(严重肢体缺血, CLI) 的患者中,

截肢率

估计约为 25%*

不要延误治疗,现在就与您的医生讨论症状吧。

 Henry AJ, et al. Socioeconomic and hospital-related predictors of amputation for critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2011;53:330-9.e1.

采取行动:咨询医生。

如果您发现自己确实有 PAD,那么您和医生可以 采取多种措施。

您可以先着手改变生活方式: 5



□ 戒烟



□ 控制糖尿病



□ 健康饮食



□ 经常锻炼

您可能也需要药物:



- 降低高胆固醇和/或高血压
- 稀释血液, 防止形成血块
- 改善您的行走能力并减轻 服部疼痛

您的医生

可能会建议您接受以下治疗:



血管成形术 ── 一种微创手术, 在闭塞的血管内扩张球囊,使血 流恢复

支架植入术 ── 将一根很小的管子置入动脉内,保持动脉开放

粥样硬化斑块旋切术 — 一种微创手术,使用医疗器 械来打开闭塞的动脉

搭桥术 ── 一种外科手术,用血管或人造管来绕过动脉的闭塞段

1. Mohler ER.Peripheral Arterial Disease:Identification and Implications.Arch Intern Med.2003;163:2306-2314.

^{5.} Olin and Sealove, Peripheral Artery Disease:Current Insight Into the Disease and Its Diagnosis and Management.Mayo Clin Proc.2010 Jul; 85(7):678-692.