## 美国人患有

周围血管病¹(通常称为 PAD)



## 什么是周围血管病(PAD)?

- 将血液从心脏输送到腿和手臂的动脉内壁积聚斑块
- 动脉硬化并变窄,流向腿和脚的血液大幅减少
- 通往心脏和大脑的动脉也可能硬化并变窄,导致心脏病 发作或中风的风险升高

## 如果不予治疗, PAD 可能

ww.StandAgainstAmputation.com

## 关于 PAD 的事实:

- 三分之一 50 岁以上的糖尿病患者可能有 PAD<sup>2</sup>
- 在美国, 每年有超过 160,000 例截肢术是 PAD 导致的3
- 如果及早发现并主动治疗,很多截肢术是可以避免的
- 在具有最严重 PAD(严重肢体缺血, CLI)的患者中, 截肢率估计约为 25%4

您有 PAD 风险吗? 请完成下面的小问卷,了解自己是否有风险。		
增加 PAD 患病几率的风险因素:		
您是否为 50 岁或以上?	□是	□否
您目前或过去是否吸烟?	□是	□否
您是否被确诊患有以下病症:		
糖尿病?	□是	□否
慢性肾病?	□是	□否
高血压?	□是	□否
高胆固醇?	□是	□否
PAD 的警示症状:您是否		
感觉腿部肌肉疲劳、沉重或痉挛?	□是	□否
脚趾或脚部看起来苍白、变色或发紫?	□是	□否
出现影响睡眠的腿部或脚部疼痛?	□是	□否
脚趾、脚或腿上的疮口或伤口愈合缓慢或无法愈合?	□是	□否
一只腿或一只脚感觉比另一只冷?	□是	□否
脚趾甲增厚、发黄,且不生长?	□是	□否

将这些答案提供给您的医生,让医生来确定您是否需要接受 PAD 筛选。

Schiavetta A, et al. Stem Cells Translational Medicine. 2012; 1:572-578. And Sage Report 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peripheral Arterial Disease (PAD) Fact Sheet; American Diabetes Association website;

 $http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/complications/heart-disease/peripheral-arterial-disease.html.\ Accessed\ Sept\ 2,\ 2015.$ 

Allie et al, 24-Carat Gold, 14-Carat Gold, or Platinum Standards in the Treatment of Critical Limb Ischemia: Bypass Surgery or Endovascular Intervention? J. Endovasc Ther, 2009; 16 (Suppl 1): 134-146. <sup>4</sup>Henry AJ, et al. Socioeconomic and hospital-related predictors of amputation for critical limb ischemia. J Vasc Surg. 2011;53-330-e1. © 2015 Cardiovascular Systems, Inc. ZH-2749 1015