

Notas de Cálculo Diferencial Vectorial.

Carlos Francisco Flores Galicia.

Capítulo 1

Funciones de \mathbb{R} a \mathbb{R}^n .

1.0.1. Funciones vectoriales y algunas de sus propiedades.

Llamaremos función vectorial de variable real o simplemente función vectorial, a aquellas con dominio en un subconjunto de \mathbb{R} y codominio en un espacio vectorial \mathbb{R}^n .

$$f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

Puesto que $f(x)$ es elemento de \mathbb{R}^n , éste tiene n coordenadas, las cuales son en general, funciones de la variable x . Así podemos escribir

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$$

Por otra parte, el dominio de una función vectorial es la intersección de los dominios de cada componente $f_i(x)$.

$$Dom(f(x)) = \bigcap_{i=1}^n Dom(f_i(x))$$

Definición 1.0.1. Sean $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g : V \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $u : W \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones, entonces

- a) $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- b) $(uf)(x) = u(x)f(x)$
- c) $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
- d) $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$ si $f, g \in \mathbb{R}^3$

1.0.2. Límites

Definición 1.0.2. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial. El límite de f cuando x tiende a x_o es L , y se expresa como $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L$, si y solo si para

todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - x_o| < \delta$ entonces $\|f(x) - L\| < \epsilon$.

Teorema 1.0.1. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial, donde se tiene que $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$. Entonces $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L = (l_1, l_2, \dots, l_n)$ existe si y solo si existe cada limite $\lim_{x \rightarrow x_o} f_i(x) = l_i$.

Demostración. Supongamos que $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L = (l_1, l_2, \dots, l_n)$ existe. Entonces para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - x_o| < \delta$ entonces $\|f(x) - L\| < \epsilon$. Pero como

$$\begin{aligned} \|f(x) - L\| &= \|f_1(x) - l_1, f_2(x) - l_2, \dots, f_n(x) - l_n\| \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (f_i(x) - l_i)^2} < \epsilon \end{aligned}$$

Se tiene que

$$|f_i(x) - l_i| = \sqrt{(f_i(x) - l_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (f_i(x) - l_i)^2} < \epsilon$$

Por tanto, como cada $|f_i(x) - l_i| < \epsilon$ para todo $0 < i \leq n$ y existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - x_o| < \delta$, entonces $\lim_{x \rightarrow x_o} f_i(x) = l_i$ existe.

Por otra parte, supongamos que cada limite $\lim_{x \rightarrow x_o} f_i(x) = l_i$ existe. Entonces para los $\epsilon_i > 0$ existen $\delta_i > 0$ con $0 < i \leq n$, tales que si $0 < |x - x_o| < \delta_i$ entonces $|f_i(x) - l_i| < \epsilon_i$. Sea $\epsilon > 0$, luego definamos $\epsilon_i = \frac{\epsilon}{\sqrt{n}}$ y $\delta = \min(\delta_1, \dots, \delta_n)$. Para este δ se tiene que si $0 < |x - x_o| < \delta$ entonces $|f_i(x) - l_i| < \frac{\epsilon}{\sqrt{n}}$. Luego

$$\|f(x) - L\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (f_i(x) - l_i)^2} < \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\epsilon}{\sqrt{n}}\right)^2} = \epsilon$$

Por lo tanto $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L$. □

Teorema 1.0.2. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial. Si $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L_2$ entonces $L_1 = L_2$.

Demostración. Probémoslo por contradicción, es decir, supongamos que $L_1 \neq L_2$. Por hipótesis tenemos que para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta_1 > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - x_o| < \delta_1$ entonces $\|f(x) - L_1\| < \epsilon$. Por otra parte, también por hipótesis se tiene que para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta_2 > 0$ tal que, para todo x , si $0 < |x - x_o| < \delta_2$ entonces $\|f(x) - L_2\| < \epsilon$. Sea $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Para completar la demostración, tomemos un $\epsilon > 0$ para el cual no puedan verificarse

simultáneamente las condiciones de que $\|f(x) - L_1\| < \epsilon$ y $\|f(x) - L_2\| < \epsilon$. Como $L_1 \neq L_2$, entonces $\|L_1 - L_2\| > 0$, así que tomemos $\epsilon = \frac{\|L_1 - L_2\|}{2}$. En consecuencia se cumple que

$$\|f(x) - L_1\| < \frac{\|L_1 - L_2\|}{2} \text{ y } \|f(x) - L_2\| < \frac{\|L_1 - L_2\|}{2}$$

Esto implica que para $0 < |x - x_o| < \delta$ se verifica

$$\begin{aligned} \|L_1 - L_2\| &= \|L_1 - f(x) + f(x) - L_2\| \\ &\leq \|L_1 - f(x)\| + \|L_2 - f(x)\| \\ &< \frac{\|L_1 - L_2\|}{2} + \frac{\|L_1 - L_2\|}{2} = \|L_1 - L_2\| \end{aligned}$$

Esto es una contradicción, por lo tanto $L_1 = L_2$. \square

1.0.3. Continuidad

Definición 1.0.3. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial. Se dice que f es continua en $x_o \in U$ si y solo si

$$\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = f(x_o)$$

Teorema 1.0.3. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial tal que $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$. Entonces f es continua en $x_o \in U$ si y solo si f_1, \dots, f_n son continuas en x_o .

Demostración. Supongamos que f es continua en x_o , entonces se cumple que $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = f(x_o)$. Por otra parte, $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = (\lim_{x \rightarrow x_o} f_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow x_o} f_n(x))$ y también $f(x_o) = (f_1(x_o), \dots, f_n(x_o))$, pero por hipótesis estas dos expresiones son iguales, entonces $(\lim_{x \rightarrow x_o} f_1(x), \dots, \lim_{x \rightarrow x_o} f_n(x)) = (f(x_o) = (f_1(x_o), \dots, f_n(x_o)))$. Así que por definición de igualdad de vectores, se cumple entonces que $\lim_{x \rightarrow x_o} f_1(x) = f_1(x_o), \dots, \lim_{x \rightarrow x_o} f_n(x) = f_n(x_o)$. Por lo tanto f_1, \dots, f_n son continuas en x_o .

La demostración de la segunda implicación se sigue de los pasos de la primera implicación vistos de regreso. \square

1.0.4. Derivadas

Definición 1.0.4. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial siendo U un intervalo abierto y $x_o \in \mathbb{R}$. La derivada de f en x_o , denotada por $f'(x_o)$ es

$$f'(x_o) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_o + h) - f(x_o)}{h}$$

Cuando este límite existe.

Teorema 1.0.4. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial siendo U un intervalo abierto y $x_o \in \mathbb{R}$. La derivada $f'(x_o)$ existe si y solo si cada derivada $f'_1(x_o), \dots, f'_n(x_o)$ existe.

Demostración. Supongamos que $f'(x_o)$ existe, entonces

$$\begin{aligned} f'(x_o) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_o + h) - f(x_o)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(f_1(x_o + h), f_2(x_o + h), \dots, f_n(x_o + h)) - (f_1(x_o), f_2(x_o), \dots, f_n(x_o)))}{h} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f_1(x_o + h) - f_1(x_o)}{h}, \frac{f_2(x_o + h) - f_2(x_o)}{h}, \dots, \frac{f_n(x_o + h) - f_n(x_o)}{h} \right) = \\ &\left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(x_o + h) - f_1(x_o)}{h}, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_2(x_o + h) - f_2(x_o)}{h}, \dots, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_n(x_o + h) - f_n(x_o)}{h} \right) \end{aligned}$$

Por el teorema 1.0.1, cada límite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_i(x_o + h) - f_i(x_o)}{h}$ existe, por lo tanto cada derivada $f'_1(x_o), \dots, f'_n(x_o)$ existe.

La demostración de la segunda implicación se sigue de los pasos de la primera implicación vistos de regreso. \square

Definición 1.0.5. La derivada $f'(x_o)$ de una función vectorial f puede ser asociada a una matriz $n \times 1$, la cual es conocida como la matriz Jacobiana de f en el punto x_o , y se denota por

$$Jf(x_o) = \begin{bmatrix} f'_1(x_o) \\ \vdots \\ f'_n(x_o) \end{bmatrix}$$

Teorema 1.0.5. Sean f, g funciones vectoriales y u una función real, todas diferenciables, entonces

- a) $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$
- b) $(uf)'(x) = u'(x)f(x) + u(x)f'(x)$
- c) $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- d) $(f \times g)'(x) = f'(x) \times g(x) + f(x) \times g'(x)$ si $f, g \in \mathbb{R}^3$

Demostración. a)

$$\begin{aligned} (f + g)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f + g)(x_o + h) - (f + g)(x_o)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_o + h) + g(x_o + h) - [f(x_o) + g(x_o)]}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_o + h) + g(x_o + h) - f(x_o) - g(x_o)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_o + h) - f(x_o) + g(x_o + h) - g(x_o)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x_o + h) - f(x_o)}{h} + \frac{g(x_o + h) - g(x_o)}{h} \right) \\
&= f'(x) + g'(x)
\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
(uf)'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(uf)(x_o + h) - (uf)(x_o)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x_o + h)f(x_o + h) - u(x_o)f(x_o)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x_o + h)[f(x_o + h) - f(x_o)] + [u(x_o + h) - u(x_o)]f(x_o)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(x_o + h)[f(x_o + h) - f(x_o)]}{h} + \frac{[u(x_o + h) - u(x_o)]f(x_o)}{h} \right) \\
&= u(x)f'(x) + u'(x)f(x) \\
&= u'(x)f(x) + u(x)f'(x)
\end{aligned}$$

Las demostraciones de los incisos c) y d) son análogas a los del inciso b), usando las correspondientes operaciones. \square

Capítulo 2

Curvas.

Definición 2.0.1. Una relación $\sigma : (a, b) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua en (a, b) se llama *trayectoria*. A la imagen de σ se le llama *curva*.

Definición 2.0.2. Decimos que $\sigma : (a, b) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una *trayectoria simple* si σ es inyectiva, esto es, que si $\sigma(x_1) = \sigma(x_2)$ entonces $x_1 = x_2$. Geométricamente significa que la curva no se cruza a sí misma.

Definición 2.0.3. Si $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una trayectoria, el vector unitario tangente T es otra función vectorial asociada a la curva, y se define por

$$T(x) = \frac{f'(x)}{\|f'(x)\|} \text{ si } \|f'(x)\| \neq 0$$

Proposición 2.0.1. Si $n : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función vectorial diferenciable cuya imagen $n(x)$ es un vector unitario, entonces $n(t) \cdot n'(t) = 0$.

Demostración. Tenemos que $n(t) \cdot n(t) = 1$, si derivamos esta expresión nos queda $n'(t) \cdot n(t) + n(t) \cdot n'(t) = 0$, por tanto $2n'(t) \cdot n(t) = 0$, y así obtenemos $n(t) \cdot n'(t) = 0$. \square

Lo que nos dice la proposición anterior es que si tenemos una función vectorial n cuyas imágenes son vectores unitarios, entonces las imágenes de la derivada n' son vectores perpendiculares a los de las imágenes de n , o bien, la derivada n' es directamente igual a cero. Este hecho motiva la siguiente definición.

Definición 2.0.4. Si $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una trayectoria y $f'(x) \neq 0$, el vector normal unitario N es otra función vectorial asociada a la curva, y se define por

$$N(x) = \frac{f''(x)}{\|f''(x)\|}$$

Cuando los dos vectores unitarios T y N están trazados en el punto de la curva $f(x_o)$, determinan un plano llamado plano osculador de la curva. El plano osculador es el plano que pasa por $f(x_o)$ que mejor se adapta a la curva en cada uno de sus puntos. Si la curva es plana, el plano osculador coincide con el plano

de la curva. En el espacio, la ecuación del plano osculador de una curva en un punto (x_o, y_o, z_o) es

$$(x, y, z) = (x_o, y_o, z_o) + \lambda N(x_o, y_o, z_o) + \beta T(x_o, y_o, z_o), \lambda, \beta \in \mathbb{R}$$

Definición 2.0.5. Si $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una trayectoria y $f'(x) \neq 0$, el vector binormal unitario B es otra función vectorial asociada a la curva, y se define por

$$B(x) = \frac{T(x) \times N(x)}{\|T(x) \times N(x)\|}$$

Definición 2.0.6. Si $f : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una trayectoria y $f'(x_o) \neq 0$, la recta tangente al punto $f(x_o)$ tiene la ecuación

$$L(t) = f(x_o) + (t - x_o)T(x_o), \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

Capítulo 3

Funciones de \mathbb{R}^n a \mathbb{R} .

3.0.1. Definiciones básicas.

Definición 3.0.1. Una función $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función que asocia a cada vector (x_1, x_2, \dots, x_n) un número real $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Definición 3.0.2. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$. Definimos el conjunto de nivel de valor c de la función f como

$$C = \{x \in U \mid f(x) = c\}$$

3.0.2. Límites

Definición 3.0.3. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, donde U es un conjunto abierto. El límite de f cuando x tiende a x_o es L , y se expresa como $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L$, si y solo si para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta > 0$ tal que, para todo x , si $0 < \|x - x_o\| < \delta$ entonces $|f(x) - L| < \epsilon$.

Note que la definición de límite para funciones de \mathbb{R}^n a \mathbb{R} no es la misma que para funciones de \mathbb{R} a \mathbb{R}^n .

Teorema 3.0.1. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial. Si $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = L_2$ entonces $L_1 = L_2$.

Demostración. Probémoslo por contradicción, es decir, supongamos que $L_1 \neq L_2$. Por hipótesis tenemos que para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta_1 > 0$ tal que, para todo x , si $0 < \|x - x_o\| < \delta_1$ entonces $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Por otra parte, también por hipótesis se tiene que para todo $\epsilon > 0$ existe algún $\delta_2 > 0$ tal que, para todo x , si $0 < \|x - x_o\| < \delta_2$ entonces $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Sea $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Para completar la demostración, tomemos un $\epsilon > 0$ para el cual no puedan verificarse simultáneamente las condiciones de que $|f(x) - L_1| < \epsilon$ y $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Como $L_1 \neq L_2$, entonces $|L_1 - L_2| > 0$, así que tomemos $\epsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{2}$. En consecuencia se cumple que

$$|f(x) - L_1| < \frac{|L_1 - L_2|}{2} \text{ y } |f(x) - L_2| < \frac{|L_1 - L_2|}{2}$$

Esto implica que para $0 < \|x - x_o\| < \delta$ se verifica

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |L_1 - f(x) + f(x) - L_2| \\ &\leq |L_1 - f(x)| + |L_2 - f(x)| \\ &< \frac{|L_1 - L_2|}{2} + \frac{|L_1 - L_2|}{2} = |L_1 - L_2| \end{aligned}$$

Esto es una contradicción, por lo tanto $L_1 = L_2$. \square

La demostración anterior es muy similar a la del caso de funciones vectoriales, sin embargo, no es la misma.

3.0.3. Continuidad.

Definición 3.0.4. Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Se dice que f es continua en $x_o \in U$ si y solo si

$$\lim_{x \rightarrow x_o} f(x) = f(x_o)$$

3.0.4. Derivadas.

Definición 3.0.5. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto tal que $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función y $\bar{v} \in \mathbb{R}^n$ es un vector unitario. Entonces la derivada parcial de f en dirección \bar{v} se definen como

$$D_v f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h\bar{v}) - f(x)}{h}$$

Si los vectores unitarios son los de la base canónica, para el caso particular en \mathbb{R}^3 , se suele usar la notación $\frac{\partial f}{\partial x}$ cuando la dirección es $(1, 0, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ cuando la dirección es $(0, 1, 0)$ y $\frac{\partial f}{\partial z}$ cuando la dirección es $(0, 0, 1)$. En general, usaremos la notación $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ para indicar la derivada parcial de f en dirección \bar{e}_j , donde \bar{e}_j es el vector j -ésimo de la base canónica definido por $\bar{e}_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ con el 1 en la posición j -ésima.

Definición 3.0.6. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que existen $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ para todo $1 \leq j \leq n$. Entonces la matriz Jacobiana de f en el punto x_o es

$$Jf(x_o) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_o), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_o), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_o) \right)$$

En el caso cuando la función va de \mathbb{R}^n a \mathbb{R} , a la matriz Jacobiana también se le llama gradiente de f , y se denota por ∇f . Por tanto $\nabla f = Jf$.

Para funciones que van de \mathbb{R} a \mathbb{R}^n se tiene que la función es diferenciable si cumple la existencia de cierto límite (el que indica la propia definición de derivada). Sin embargo, para las funciones de \mathbb{R}^n a \mathbb{R} esto no es suficiente. La existencia de las derivadas parciales en un punto no garantiza que la función sea diferenciable en ese punto. Un ejemplo de esto es la función $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$. En efecto, las derivadas parciales respecto a x y a y existen en el punto $(0, 0)$, pues

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0,$$

De forma análoga, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ (note que ambas derivadas parciales no son continuas en $(0, 0)$, por eso se utilizó el límite de la definición de derivada parcial). Sin embargo, la gráfica de dicha función no es “suave” en el punto $(0, 0)$, por lo que no es diferenciable ahí. Necesitamos entonces una rigurosa definición de diferenciabilidad para funciones de \mathbb{R} a \mathbb{R}^n . Dicha definición es la siguiente.

Definición 3.0.7. Sea $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Decimos que f es diferenciable en $x_o \in U$ si existen $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ para todo $1 \leq j \leq n$ y además

$$\lim_{x \rightarrow x_o} \frac{|f(x) - f(x_o) - Jf(x_o)(x - x_o)|}{\|\bar{x} - \bar{x}_o\|} = 0$$

Siendo $(x - x_o)$ el vector columna $(x - x_o) = \begin{bmatrix} x_1 - x_{o1} \\ \vdots \\ x_n - x_{on} \end{bmatrix}$

Definición 3.0.8. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en x_o . El hiperplano tangente a la gráfica de f en el punto x_o es

$$P = f(x_o) + Jf(x_o)(x - x_o)$$

Siendo $(x - x_o)$ el vector columna $(x - x_o) = \begin{bmatrix} x_1 - x_{o1} \\ \vdots \\ x_n - x_{on} \end{bmatrix}$

3.0.5. Regla de la cadena.

Al igual que como ocurre en funciones de una variable, a veces se precisa derivar composición de funciones, y para ello se usa la llamada regla de la cadena. Supongamos que $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función diferenciable y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $h = f \circ g$, esto es, $h(t) = f(g(t)) = f(f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$, donde $g(t) = (f_1(t), f_2(t), \dots, f_n(t))$. Entonces la derivada de h respecto a t es

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\partial f}{\partial f_1} \frac{df_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial f_2} \frac{df_2}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial f_n} \frac{df_n}{dt}$$

O bien

$$\frac{dh}{dt} = \nabla f(g(t)) \cdot g'(t)$$

La demostración de lo anterior no es complicado, pero es laborioso y algo extenso, así que no se expondrá en el presente texto.