

VOCABULAIRE RELATIF AUX  
APPLICATIONS

Les applications (et les fonctions, ce qui n'est guère différent) forment une classe d'objets qui est une des plus étudiées en mathématiques, parfois sous d'autres noms : suites, familles, transformations, opérateurs, lois, opérations...

10.1 DÉFINITION ENSEMBLISTE D'UNE  
APPLICATION

## §1 Notion d'application

## Définition 1

Étant donné deux ensembles  $A$  et  $B$ , une **application** de  $A$  dans  $B$  est un triplet  $f = (A, B, G)$  où  $G$  est une partie de  $A \times B$  telle que

$$\forall x \in A, \exists ! y \in B, (x, y) \in G.$$

- $A$  est appelé l'**ensemble de départ** ou **ensemble de définition** de  $f$ ,
- $B$  est l'**ensemble d'arrivée** de  $f$ . On dit que la fonction  $f$  **prend ses valeurs dans**  $B$  ou est **à image dans**  $B$ .
- Pour  $x \in A$ , l'unique  $y \in B$  tel que  $(x, y) \in G$  s'appelle l'**image** de  $x$  par  $f$ , et se désigne par  $f(x)$  ou  $f_x$ . On dit encore que  $f(x)$  est la **valeur** de  $f$  pour l'élément  $x$  de  $A$ .
- Pour  $y \in B$ , en cas d'existence, tout  $x \in A$  tel que  $y = f(x)$  est appelé **un antécédent** de  $y$  par  $f$ .

- $G$  est le **graphe** de  $f$ . On a

$$G = \{ (x, y) \in A \times B \mid y = f(x) \} = \{ (x, f(x)) \mid x \in A \}.$$

### Notation

L'ensemble des applications de  $A$  vers  $B$  se note  $\mathcal{F}(A, B)$  ou  $B^A$ .

Une application  $f \in \mathcal{F}(A, B)$  se note

$$A \xrightarrow{f} B \quad \text{ou} \quad f : A \rightarrow B$$

### Exemple 2

- L'application dont l'ensemble de définition ainsi que celui d'arrivée est  $\mathbb{N}$  ; qui à chaque naturel  $n$  fait correspondre  $n^2 + 1$  se note

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \rightarrow & \mathbb{N} \\ n & \mapsto & n^2 + 1 \end{array}.$$

Par exemple, on a  $f(4) = 4^2 + 1 = 17$ .

- Pour  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ , la relation  $y = \frac{1}{x^2 - 1}$  définit une application de  $] -\infty, -1[ \cup ] -1, 1[ \cup ] 1, +\infty[$  dans  $\mathbb{R}$ .

### Remarques

- La fonction  $f$  n'est pas l'expression  $f(x)$  elle-même, mais l'association du  $x$  et du  $f(x)$ , que l'on note  $x \mapsto f(x)$ . Notez bien que la lettre  $x$  peut être remplacée par n'importe quel symbole. On peut donc aussi écrire  $z \mapsto f(z)$  ou encore  $\heartsuit \mapsto f(\heartsuit)$ .
- Les applications  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  ne sont pas les mêmes car  $x \mapsto \sin x$  et  $x \mapsto \sin x$  leurs ensembles de départ sont différents. Autrement dit, on ne confondra pas une fonction et la donnée d'une formule.
- Notez bien que la flèche, en haut, qui relie l'ensemble de départ à l'ensemble d'arrivée est  $\rightarrow$  et non  $\mapsto$ . Allez savoir pourquoi.
- Dire que l'ensemble d'arrivée d'une fonction  $f$  est  $Y$  ne signifie pas que  $f$  prend toutes les valeurs contenues dans  $Y$ . Cela signifie simplement qu'elle est à *valeurs dans*  $Y$ . Par exemple, les fonctions suivantes sont correctement définies

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sin x \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} g : \mathbb{R} & \rightarrow & [-1, 1] \\ x & \mapsto & \sin x \end{array}.$$

### Notation

- Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles et  $b$  un élément de  $B$ . L'application  $f : A \rightarrow B$  définie par

$$\forall x \in A, f(x) = b$$

est une **application constante**. On la note parfois  $\tilde{b}$  ou simplement  $b$  lorsqu'aucune confusion n'est possible.

- Soit  $A$  un ensemble. L'application  $\text{Id}_A : A \rightarrow A$  définie par

$$\forall x \in A, \text{Id}_A(x) = x$$

est l'**application identique** de  $A$ , ou **identité** de  $A$ .

**Proposition 3**

Deux applications  $f : A \rightarrow B$  et  $g : A' \rightarrow B'$  sont **égales** si et seulement si

- elles ont même ensemble de départ :  $A = A'$ ,
- elles ont même ensemble d'arrivée :  $B = B'$ ,
- et si pour tout  $x \in A$ , on a  $f(x) = g(x)$ .

On écrit alors  $f = g$ .

## §2 À propos des fonctions de «définies par morceaux»

Voici des exemple de fonctions définies **par morceaux**. Elle sont définies par différentes formules sur différentes partie de leur domaine de définition. Néanmoins, elle ne constitue qu'une seule fonction.

**Exemple 4**

Une fonction  $f$  est définie par

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Évaluer  $f(0)$ ,  $f(1)$ ,  $f(2)$  et représenter le graphe de  $f$ .

**Exemple 5**

Voici un extrait des tarifs courrier pour la France métropolitaine.

Lettre verte	
Poids jusqu'à	Tarifs nets
20g	0.58€
50g	0.97€
100g	1.45€
250g	2.35€
500g	3.15€
1kg	4.15€
2kg	5.40€
3kg	6.25€

Définir la fonction coût  $C$  en fonction du poids. Représenter le graphe de  $C$ .

### §3 Fonctions indicatrices

Voici une notion qui permet de créer un lien entre les parties d'un ensemble  $E$  et des fonctions.

#### Définition 6

Soit  $E$  un ensemble et  $A \subset E$ . On appelle **fonction indicatrice** de  $A$  (dans  $E$ ), et on note  $\mathbb{1}_A$  la fonction

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\rightarrow \{0, 1\} \\ x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

### §4 À propos des fonctions de «plusieurs variables»

On appelle **fonction de deux variables** toute fonction dont l'ensemble de départ est un produit de deux ensembles, ou contenu dans un tel produit. Si  $f$  est une fonction de deux variables, définie sur une partie  $A$  d'un produit  $X \times Y$ , la valeur de  $f$  en un point  $(x, y)$  de  $A$ , que l'on devrait noter  $f((x, y))$ , se désigne pratiquement par la notation

$$f(x, y).$$

On définirait de façon analogue les fonctions de trois, quatre,... variables, pour lesquelles on emploie les notations  $f(x, y, z)$ ,  $f(x, y, z, t)$ , etc...

Mathématiquement parlant, il n'existe aucune différence, sinon dans les notations utilisées, entre fonctions d'une variable et fonctions de plusieurs variables — comme en effet nous n'avons fait aucune espèce d'hypothèse sur les ensembles de départ des fonctions, tout ce qu'on a dit s'applique sans aucun changement aux fonctions de «plusieurs» variables. La distinction entre «une» et «plusieurs» variables provient du fait que, jadis, le mot «variable» désignait ce qu'on appelle aujourd'hui «variable réelle». C'est entre autres pour éviter d'avoir à tenir compte de ces distinctions qu'on a été amené à donner la définition générale, laquelle englobe *toutes* les notions de fonctions actuellement connues, sans aucune exception.

## 10.2 IMAGE DIRECTE ET IMAGE RÉCIPROQUE

### §1 Image directe d'une partie par une application

#### Définition 7

Soient  $f : A \rightarrow B$  une application, et  $X$  une partie de  $A$ .

- L'ensemble des éléments de  $B$  qui possèdent un antécédent dans  $X$  s'appelle l'**image** de  $X$  par  $f$  et se désigne par  $f(X)$  ou  $f_*(X)$ .

$$f(X) = \{ y \in B \mid \exists x \in X, y = f(x) \} = \{ f(x) \mid x \in X \}.$$

Autrement dit,  $f(X)$  est décrit par  $f(x)$  quand  $x$  décrit  $X$ .

- En particulier,  $f(A)$  est appelée l'**image** de  $f$ , on la note

$$\text{Im}(f) = \{ y \in B \mid \exists x \in A, y = f(x) \} = \{ f(x) \mid x \in A \}$$

c'est un abus de langage pour «image de l'ensemble de départ de  $f$  par  $f$ ».

L'image de  $f$  est toujours incluse dans l'ensemble d'arrivée de  $f$ , c'est-à-dire  $\text{Im } f \subset Y$ .

La notation  $f(X)$  est «incorrecte» (mais commode !), puisque  $f$  ne devrait agir que sur des éléments de l'ensemble  $A$ , et que la partie  $X$  de  $A$  est un élément de l'ensemble des parties de  $A$ , mais pas de  $A$ .

Étant donnés  $f : A \rightarrow B$  et  $X \subset A$ ,

$$y \in f(X) \iff \exists x \in X, y = f(x).$$

$$y \in \text{Im } f \iff \exists x \in A, y = f(x).$$

La notion d'image d'un ensemble par une application apparaît en Géométrie élémentaire lorsqu'on parle par exemple de «la transformée d'une droite par une rotation» : une droite est un ensemble (de points), une rotation est une certaine application (de l'ensemble des points de l'espace dans lui-même), et la transformée en question n'est autre que l'image de l'ensemble considéré par cette application.

### Remarque

Nous avons déjà croisé une notion très proche de la notion d'image directe. C'est la notation d'ensemble en extension. Par exemple, l'ensemble des multiples de  $2\pi$ ,

$$\{ 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

est l'image directe de  $\mathbb{Z}$  par l'application  $x \mapsto 2\pi x$ .

### Test 8

Notons  $f$  l'application définie de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . Calculer

1.  $f(4)$

4.  $f(\{-1, 1\})$

7.  $f(\mathbb{R})$

2.  $f(\{4\})$

5.  $f([0, 2])$

5.  $f([0, 2])$

3.  $f(\{1, 3, 5\})$

6.  $f([-3, 1])$

8.  $\text{Im } f$



Il faut bien remarquer les différents sens du mot «image» ;

- l'image d'un élément de l'ensemble de départ est un élément du but,
- l'image d'une partie de l'ensemble de départ est une partie du but.

Aussi faut-il être attentif à la nature de ce qui est à la place de  $\square$  dans l'écriture  $f(\square)$ .

Lorsque  $A \subset B$ , certaines circonstances peuvent se produire.

### Définition 9

Soient  $f : A \rightarrow B$  une application avec  $A \subset B$  et  $X$  une partie de  $A$ .

- Si  $f(X) \subset X$ , on dira que  $X$  est une **partie stable** par  $f$ .
- Si  $f(X) = X$ , on dira que  $X$  est une **partie invariante** par  $f$ .
- Un élément  $x \in A$  tel que  $f(x) = x$  est dit **invariant** par  $f$ . On dit aussi que  $x$  est un **point fixe** de  $f$ .

## §2 Image réciproque d'une partie par une application

### Définition 10

Soit  $f : A \rightarrow B$  une application, et  $Y$  une partie de  $B$ . L'ensemble des éléments de  $A$  dont l'image est dans  $Y$  s'appelle l'**image réciproque** de  $Y$  par  $f$  et se désigne par  $f^{-1}(Y)$  ou  $f^*(Y)$ .

$$f^{-1}(Y) = \{ x \in A \mid f(x) \in Y \}.$$



Étant donnés  $f : A \rightarrow B$  et  $Y \subset B$ ,

$$x \in f^{-1}(Y) \iff x \in A \text{ et } f(x) \in Y.$$

### Remarque

- On a toujours  $f^{-1}(B) = A$ .
- Pour  $y \in B$ ,  $f^{-1}(\{y\})$  est l'ensemble des antécédents de  $y$  par  $f$ . Il peut-être vide, ou contenir plusieurs éléments.

### Test 11

Notons  $f$  l'application définie de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ . Déterminer

- |                             |                         |                                |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. $f^{-1}(\{4\})$ .        | 4. $f^{-1}([0, 4])$ .   | 7. $f^{-1}(f([0, 2]))$ .       |
| 2. $f^{-1}(\{1, 9, 25\})$ . | 5. $f^{-1}([-5, -3])$ . | 8. $f(f^{-1}([-4, 4]))$ .      |
| 3. $f^{-1}(\{-2\})$ .       | 6. $f^{-1}([-4, 4])$ .  | 9. $f(f^{-1}(\mathbb{R}_-))$ . |

## 10.3 OPÉRATIONS SUR LES APPLICATIONS

### §1 Restriction, prolongement

#### Définition 12

On dit que deux fonctions  $f$  et  $g$  **coïncident dans un ensemble**  $E$  si  $E$  est contenu dans les ensembles de définition de  $f$  et de  $g$ , et si

$$\forall x \in E, f(x) = g(x).$$

Dire que  $f = g$  revient à dire que  $f$  et  $g$  ont même ensemble de définition  $A$ , même ensemble d'arrivée  $B$ , et coïncident dans  $A$ .

#### Définition 13

Soient  $A, B, A', B'$  des ensembles,  $f : A \rightarrow B$  et  $g : A' \rightarrow B'$  deux applications. On dit que  $g$  est un **prolongement** de  $f$  à  $A'$  si l'ensemble de définition  $A$  de  $f$  est contenu dans l'ensemble de définition  $A'$  de  $g$ , si l'ensemble d'arrivée  $B$  de  $f$  est contenu dans l'ensemble d'arrivée  $B'$  de  $g$  et si  $g$  coïncide avec  $f$  dans  $A$ .

$g : A' \rightarrow B'$  est un prolongement de  $f : A \rightarrow B$  si et seulement si

$$A \subset A' \text{ et } B \subset B' \text{ et } (\forall x \in A, f(x) = g(x)).$$

**Définition 14**

Soient  $f : A \rightarrow B$  une application et  $X$  une partie de l'ensemble de définition  $A$  de  $f$ . L'application dont l'ensemble de définition est  $X$ , qui a le même ensemble d'arrivée que  $f$  est la **restriction** de  $f$  à  $X$ , et on la note  $f_X$

$$\begin{aligned} f_X : X &\rightarrow B \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned} .$$

**Remarque**

- Une fonction est un prolongement d'une quelconque de ses restrictions.
- Si la restriction d'une fonction  $f$  est bien déterminée par la connaissance de  $f$  et  $X$ , il n'en est pas de même des prolongements :  $g$  étant connu, un prolongement de  $g$  a ses valeurs bien déterminées dans  $X$ , par contre dans  $A \setminus X$ , ses valeurs sont arbitraires.
- Si  $f : A \rightarrow B$  est une application, et  $Y$  une partie de  $B$  telle que  $f(A) \subset Y$ , l'application

$$\begin{aligned} h : A &\rightarrow Y \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

est appelée **application à valeurs dans  $Y$  induite par  $f$** . On dit encore **co-restriction** de  $f$  à  $Y$ .

**§2 Composée de deux applications****Définition 15**

Soit  $A, B$  et  $C$  trois ensembles,  $f \in \mathcal{F}(A, B)$  et  $g \in \mathcal{F}(B, C)$ . L'application définie sur  $A$  et à valeurs dans  $C$  qui à  $x$  associe  $g(f(x))$  est appelée **composée** des applications  $g$  et  $f$  ; on la note

$$\begin{aligned} g \circ f : A &\rightarrow C \\ x &\mapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

On peut représenter la situation précédente ainsi

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{g} & C \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & g \circ f & & \end{array}$$

**Remarque**

En fait, il est possible de définir la composée de  $g : B' \rightarrow C$  et  $f : A \rightarrow B$  dès que  $f(A) \subset B'$ , c'est-à-dire

$$\forall x \in A, f(x) \in B'.$$

C'est le cas, par exemple, lorsque  $B \subset B'$ .

**Proposition 16**

Soient quatre ensembles  $A, B, C, D$  et trois applications définies par le diagramme

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D .$$

On a

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \in \mathcal{F}(A, D).$$

On dit que l'opération  $\circ$  est associative.

## 10.4 INJECTION, SURJECTION, BIJECTION

### §1 Injection

#### Définition 17

Soit  $f$  une application de  $A$  dans  $B$ . On dit que  $f$  est une **injection**, ou que  $f$  est une application **injective**, si

$$\forall (x, x') \in A^2, f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

Ou de manière équivalente,  $f$  est injective si, et seulement si

$$\forall (x, x') \in A^2, x \neq x' \implies f(x) \neq f(x');$$

autrement dit, si deux éléments distincts de  $A$  ont des images distinctes par  $f$ .

#### Caractérisation 18 Les assertions suivantes sont équivalentes

- (i)  $f$  est injective.
- (ii) Pour tout  $y \in B$ , l'équation  $f(x) = y$ , d'inconnue  $x \in A$ , admet au plus une solution.
- (iii) Tout élément de  $B$  a au plus un antécédent par  $f$ .

#### Exemple 19

Montrer que l'application  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  est injective.  
 $n \mapsto n^2 + 1$

#### Exemple 20

Montrer que l'application  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  est injective.  
 $(x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2, x_1 + 3x_2)$

#### Remarque

Toute application de  $D \subset \mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  strictement monotone est injective. Mais la réciproque est fautive :  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $x \in [0, 1[ \mapsto x$  et  $x \in [1, 2] \mapsto 3 - x$  est injective mais pas monotone sur  $[0, 2]$ .

#### Théorème 21

*La composée de deux injections est une injection.*

*Démonstration.* <sup>1</sup> Soit  $f : A \rightarrow B$  et  $g : B \rightarrow C$  deux applications injectives. Nous allons montrer que  $g \circ f : A \rightarrow C$  est injective, c'est-à-dire

$$\forall (x, x') \in A^2, (g \circ f)(x) = (g \circ f)(x') \implies x = x'.$$

Considérons donc deux éléments  $x, x' \in A$  tels que  $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$ , c'est-à-dire  $g(f(x)) = g(f(x'))$ . Puisque par hypothèse  $g$  est injective, nous pouvons affirmer que  $f(x) = f(x')$ . Puis,  $f$  étant également injective, nous avons  $x = x'$ .

Ceci étant vrai pour tous éléments  $x, x' \in A$  tels que  $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$ , l'application  $g \circ f$  est injective. ■

<sup>1</sup>21: Pour démontrer un énoncé aussi général, il faut commencer par se donner des objets sur lesquels on peut travailler. Ici nous avons besoin de deux injections que l'on peut composer ; notons les  $f : A \rightarrow B$  et  $g : B \rightarrow C$ .



## §2 Surjection

### Définition 22

Soit  $f$  une application de  $A$  dans  $B$ . On dit que  $f$  est une **surjection**, ou que  $f$  est une application **surjective** si

$$\forall y \in B, \exists x \in A, y = f(x).$$

### Caractérisation 23 Les assertions suivantes sont équivalentes

- (i)  $f$  est surjective.
- (ii)  $f(A) = B$  (ou encore  $\text{Im } f = B$ ).
- (iii) Pour tout  $y \in B$ , l'équation  $f(x) = y$ , d'inconnue  $x \in A$ , admet au moins une solution.
- (iv) Tout élément de  $B$  a au moins un antécédent par  $f$ .

### Exemple 24

Montrer que l'application  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  est surjective.  
 $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_2 + x_3, 2x_1 - x_3)$

### Théorème 25

*La composée de deux surjections est une surjection.*

*Démonstration.* Soit  $f : A \rightarrow B$  et  $g : B \rightarrow C$  deux applications surjectives. Nous allons montrer que  $g \circ f : A \rightarrow C$  est surjective, c'est-à-dire

$$\forall z \in C, \exists x \in A, g \circ f(x) = z.$$

<sup>2</sup> Soit  $z \in C$ . On cherche  $x \in A$  tel que  $g \circ f(x) = z$ .

Puisque par hypothèse  $g$  est surjective,  $z$  a un antécédent au moins par  $g$  ; c'est-à-dire qu'il existe  $y \in B$  tel que  $z = g(y)$ . Puisque  $B$  est aussi l'espace d'arrivée de  $f$  et que  $f$  est surjective,  $y$  a au moins un antécédent dans  $A$  : il existe  $x \in A$  tel que  $y = f(x)$ .

On constate que

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z,$$

ce qui montre que  $z$  a au moins un antécédent par  $g \circ f$ .

Ceci étant vrai pour tout élément de  $C$ , l'application  $g \circ f$  est surjective. ■

<sup>2</sup>25: Rappelons que dans les assertions quantifiées, les «variables» sont muettes. Il sera ici un peu plus pratique d'utiliser  $z$  plutôt que  $y$ .

### §3 Bijection

#### Définition 26

Soit  $f$  une application de  $A$  dans  $B$ . On dit que  $f$  est une **bijection**, ou que  $f$  est une application **bijective**, si

$$\forall y \in B, \exists ! x \in A, y = f(x).$$

#### Exemple 27

Montrer à l'aide de la définition que que l'application  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  est bijective.  
 $(x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$

#### Caractérisation 28 Les assertions suivantes sont équivalentes

(i)  $f$  est bijective.




(ii)  $f$  est à la fois injective et surjective.

(iii) Pour tout  $y \in B$ , l'équation  $f(x) = y$ , d'inconnue  $x \in A$ , admet une et une seule solution.

### §4 En résumé

#### Exemples 29



#### Exemples 30

1.  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  n'est ni injective, ni surjective.  
 $x \mapsto x^2$
2.  $[0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  est injective mais n'est pas surjective.  
 $x \mapsto x^2$
3.  $\mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$  est surjective mais n'est pas injective.  
 $x \mapsto x^2$
4.  $[0, +\infty[ \rightarrow [0, +\infty[$  est bijective.  
 $x \mapsto x^2$

## §5 Bijection réciproque d'une bijection

### Théorème 31

#### et définition

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles. Soit  $f$  une bijection de  $A$  vers  $B$ .

Il existe une application unique  $g$  de  $B$  vers  $A$  qui est une bijection telle que

$$g \circ f = \text{Id}_A \quad \text{et} \quad f \circ g = \text{Id}_B.$$

L'application  $g$  est appelée **application réciproque** de l'application  $f$  et on la note  $f^{-1}$ .

*Démonstration.* Soit  $y \in B$ . Puisque  $f$  est bijective, l'équation  $f(x) = y$  a une solution unique ; désignons-la par  $x = g(y)$ . Nous avons donc  $y = f(x) = f(g(y))$ . Nous définissons ainsi une application  $g$  de  $B$  dans  $A$ . Nous avons donc  $f \circ g \in \mathcal{F}(B, B)$  et

$$\forall y \in B, f \circ g(y) = y,$$

c'est-à-dire  $f \circ g = \text{Id}_B$ .

De plus, étant donné  $x \in A$ , on a  $f(x) \in B$  d'où

$$f(g(f(x))) = f(x).$$

Or  $f$  est injective, donc  $g(f(x)) = x$ . On a donc  $g \circ f \in \mathcal{F}(A, A)$  et

$$\forall x \in A, g \circ f(x) = x,$$

c'est-à-dire  $g \circ f = \text{Id}_A$ .

L'application  $g$  est visiblement bijective car

$$\forall y \in B, \forall x \in A, g(y) = x \iff y = f(x).$$

Montrons maintenant l'unicité : soit  $g$  et  $h$  des bijections de  $B$  dans  $A$  telles que  $g \circ f = h \circ f = \text{Id}_A$  et  $f \circ g = f \circ h = \text{Id}_B$ . Calculons  $g \circ f \circ h$  de deux manières différentes :

$$g \circ (f \circ h) = g \circ \text{Id}_B = g \quad \text{et} \quad (g \circ f) \circ h = \text{Id}_A \circ h = h.$$

On a donc  $g = h$ . ■

### Corollaire 32

Soit  $f : A \rightarrow B$  une application bijective.

$$1. \forall x \in A, f^{-1}(f(x)) = x.$$

$$2. \forall y \in B, f(f^{-1}(y)) = y.$$

### Corollaire 33

Soit  $f : A \rightarrow B$  une application bijective.

$$\forall x \in A, \forall y \in B, (y = f(x) \iff x = f^{-1}(y))$$

### Exemple 34

Montrer que l'application  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  est bijective et expliciter sa bijection réciproque.

$$(x_1, x_2) \mapsto (x_1 + x_2, x_1 + 2x_2)$$

**Proposition 35**

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles,  $f$  une application de  $A$  dans  $B$ ,  $g$  une application de  $B$  dans  $A$ . Si

$$g \circ f = \text{Id}_A \quad \text{et} \quad f \circ g = \text{Id}_B,$$

alors  $f$  et  $g$  sont bijectives et on a  $g = f^{-1}$ .

*Démonstration.* Nous allons montrer que  $f$  et  $g$  sont bijectives. La relation  $g = f^{-1}$  découle alors de l'unicité de la bijection réciproque.

— Soit  $(x, x') \in A$ , tels que  $f(x) = f(x')$ . En composant par  $g$ , on obtient

$$g(f(x)) = g(f(x')).$$

Or  $g \circ f = \text{Id}_A$  donc  $x = x'$ .

L'application  $f$  est donc injective. De même, la relation  $f \circ g = \text{Id}_B$  permet de conclure à l'injectivité de  $g$ .

— Soit  $y \in B$ . On pose  $x = g(y)$ , alors

$$x \in A \text{ et } f(x) = f \circ g(y) = y.$$

L'application  $f$  est donc surjective. De même, la relation  $g \circ f = \text{Id}_A$  permet de conclure à la surjectivité de  $g$ . ■

**Théorème 36**

Soit trois ensembles  $A, B, C$  et deux applications bijectives définies par

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C.$$



Alors  $g \circ f$  est bijective et

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

*Démonstration.*

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ (g^{-1} \circ g) \circ f = f^{-1} \circ \text{Id}_B \circ f = f^{-1} \circ (\text{Id}_B \circ f) = f^{-1} \circ f = \text{Id}_A$$

et

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ (f \circ f^{-1}) \circ g^{-1} = g \circ \text{Id}_B \circ g^{-1} = (g \circ \text{Id}_B) \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = \text{Id}_C.$$

■



Bien remarquer que  $f^{-1}$  ne définit une application que si  $f$  est une bijection. Se rappeler également que  $f^{-1}(Y)$  désigne un ensemble si  $Y$  est une partie de l'ensemble d'arrivée de  $f$ , et ce même si  $f$  n'est pas bijective.

Si  $f : A \rightarrow B$  est bijective et  $Y$  est une partie de  $B$ , on peut vérifier que l'image directe de  $Y$  par  $f^{-1}$  est égale à l'image réciproque de  $Y$  par  $f$ . Autrement dit,  $f^{-1}(Y) = f^{-1}(Y) \dots$

**Remarque**

Au lieu d'application réciproque, on dit souvent «application inverse». Cette terminologie peut entraîner de graves confusions ; par exemple (pour  $A = B = \mathbb{R}$ ), tout le monde pensera que la fonction «inverse» de la fonction  $x \mapsto x$  est la fonction  $x \mapsto 1/x$ , alors que la fonction «réciproque» de  $x \mapsto x$  est elle-même (d'une manière générale, une application identique est égale à son application réciproque).

Nous ne saurions trop mettre en garde le débutant contre la tentation de croire que le langage est un détail sans importance ; connaître avec précision les définitions de tous les termes techniques, et employer ceux-ci dans leur sens propre, toujours le même, est strictement indispensable à la compréhension des Mathématiques — c'est même parfois suffisant...

## 10.5 FAMILLES

### §1 Familles d'éléments d'un ensemble

Si  $u$  est une suite et si  $n$  est un naturel, au lieu de noter  $u(n)$  l'image de  $n$  par  $u$ , on la note souvent  $u_n$ . Cette notation indicielle est également utilisée dans les cas où, pour des raisons diverses, on a l'habitude d'appeler les applications familles.

**Définition 37**

Soit  $A$  un ensemble. On appelle **famille** d'éléments de  $A$  **indexée** par l'ensemble  $I$  toute application de  $I$  dans  $A$  notée

$$\begin{aligned} I &\rightarrow A \\ i &\mapsto x_i \end{aligned}$$

L'ensemble  $I$  qui est appelé **ensemble des indices**. On utilise généralement la notation  $(x_i)_{i \in I}$  pour désigner une telle famille.

**Exemple 38**

- Une suite est une famille dont l'ensemble des indices est  $\mathbb{N}$  (ou  $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0\}$ ).
- Si  $I = \{1, 2, 3\}$ , alors l'ensemble des familles d'éléments de  $A$  indexées par  $I$  est l'ensemble des triplets  $(x_1, x_2, x_3)$  où  $x, y, z$  sont trois éléments quelconques de  $A$ .

**Remarque**

Bien que cela soit moins correct, on note souvent une famille  $(x_i)$  quand l'ensemble des indices est clair. C'est notamment le cas pour les suites.

### §2 Famille d'ensembles

**Définition 39**

Considérons une famille d'ensemble  $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$ .

- On appelle **intersection de la famille**  $\mathcal{A}$  l'ensemble  $\bigcap_{i \in I} A_i$  dont chacun de ses éléments appartienne à tous les ensembles de  $\mathcal{A}$ .

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i.$$

- On appelle **réunion de la famille**  $\mathcal{A}$  l'ensemble  $\bigcup_{i \in I} A_i$  dont chacun de ses éléments appartienne à au moins un des ensembles de  $\mathcal{A}$ .

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i.$$

**Exemple 40**

Montrer les égalités suivantes.

$$1. \bigcup_{k \in \mathbb{N}} [-k, k] = \mathbb{R}.$$

$$2. \bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} \left[0, \frac{1}{k}\right] = \{0\}.$$

### §3 Partitions d'un ensemble

**Définition 41**

Une **partition** d'un ensemble  $E$  est une famille  $(E_i)_{i \in I}$  de parties de  $E$  telle que

- $\bigcup_{i \in I} E_i = E,$
- $\forall i \in I, E_i \neq \emptyset,$
- $\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \implies E_i \cap E_j = \emptyset.$