

Chapter 24 Espaces vectoriels

Exercice 1 (24.1)

On considère dans \mathbb{K}^3 les vecteurs

$$u = (1, 0, 0); \quad v = (1, 1, 0); \quad w = (1, 1, 1); \quad g = (\alpha, \beta, \gamma).$$

où α, β, γ sont des scalaires quelconques.

1. g est-il combinaison linéaire de u, v, w ?
2. g est-il combinaison linéaire de v et de w ?

Exercice 2 (24.1)

Déterminer $\alpha \in \mathbb{R}$ pour que le vecteur $x = (7, \alpha, -6) \in \mathbb{R}^3$ soit une combinaison linéaire des vecteurs $a = (2, -1, 3)$ et $b = (1, 3, 7)$.

Exercice 3 (24.1)

Montrer que le polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$, défini par $Q(X) = 7X^3 - 5X^2 + 11$ est combinaison linéaire des polynômes P_1, P_2, P_3, P_4 définis par

$$P_1(X) = X^3 + X^2 + X + 1 \quad P_2(X) = X^2 + X + 1 \quad P_3(X) = X + 1 \quad P_4(X) = 1$$

Exercice 4 (24.2)

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-espace vectoriels de $E = \mathbb{R}^3$.

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z = y = 3x \right\}, \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z + y = 3x \right\},$$
$$S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid zy = 3x \right\}, \quad S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid xyz = 0 \right\}.$$

Donner une démonstration ou un contre-exemple pour justifier votre réponse.

Exercice 5 (24.2)

On considère les sous-ensembles de \mathbb{R}^5 suivants

$$F = \{ (x, y, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 \mid x + y = z + t + w \}$$
$$\text{et } G = \{ (x, y, z, t, w) \in \mathbb{R}^5 \mid x = y \text{ et } z = t = w \}.$$

Vérifier que F et G sont des sous-espaces vectoriels de E , puis déterminer $F \cap G$.

Exercice 6 (24.2)

Dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$, on considère les sous-ensembles

$$F = \{ (\lambda - 3\mu, 2\lambda + 3\mu, \lambda) \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \} \quad \text{et} \quad G = \{ (x, y, z) \in E \mid x + 2y = 0 \}.$$

1. Prouver que les ensembles F et G sont des sous-espaces vectoriels de E .
2. Déterminer le sous-espace vectoriel $F \cap G$.

Exercice 7 (24.2)

Soit A une matrice (n, n) et $\lambda \in \mathbb{R}$ un scalaire fixé. Montrer que l'ensemble

$$S = \{ x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = \lambda x \}$$

est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^n .

Exercice 8 (24.2)

On se place dans le \mathbb{R} -espace vectoriel $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

1. On dit qu'une matrice A de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est *symétrique* lorsque $A^T = A$.
Montrer que l'ensemble $\mathcal{S}_3(\mathbb{K})$ des matrices symétriques est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.
2. On dit qu'une matrice A de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est *antisymétrique* lorsque $A^T = -A$.
Montrer que l'ensemble $\mathcal{A}_3(\mathbb{K})$ des matrices antisymétriques est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

Exercice 9 (24.2)

Démontrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{K}[X]$.

1. $A = \{ P \in \mathbb{K}[X] \mid P(0) = P(1) \}$.
2. $B = \{ P \in \mathbb{K}[X] \mid (X^2 + 1) \text{ divise } P \}$.
3. $C = \{ a(X^3 - 3) + b(X^2 - 2) \mid (a, b) \in \mathbb{K}^2 \}$.

Exercice 10 (24.2)

Soit $F = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ muni de l'addition et la multiplication externe usuelle (point par point).

1. Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-espaces vectoriels de F ?

$$S_1 = \{ f \in F \mid f(0) = 1 \}, \quad S_2 = \{ f \in F \mid f(1) = 0 \}.$$

2. Montrer que l'ensemble

$$S_3 = \{ f \in F \mid f \text{ est dérivable et } f' - f = 0 \}$$

est un sous-espace vectoriel de F .

Exercice 11 (24.2)

Soit U et V deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E .

1. Montrer que $U \cap V$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Montrer que $U \cup V$ est un sous-espace vectoriel de E si, et seulement si $U \subset V$ ou $V \subset U$.
3. Donner un exemple de sous-espaces U et V de \mathbb{R}^3 qui illustre le fait que $U \cap V$ est un sous-espace vectoriel, mais que $U \cup V$ ne l'est pas.

Exercice 12 (24.2)

Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel et $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille croissante (au sens de l'inclusion) de sous-espaces vectoriels de E , c'est-à-dire vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n \subset F_{n+1}.$$

Montrer que $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 13 (24.2)

Montrer que

$$F = \left\{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \exists (A, \phi) \in \mathbb{R}^2, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = A \cos(x + \phi) \right\}.$$

est un \mathbb{R} -espace vectoriel.

Exercice 14 (24.2)

Soit $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrice $(2, 2)$ à coefficients réels.

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont des sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

$$\begin{aligned} W_1 &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}, & W_2 &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}, \\ W_3 &= \left\{ \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}. \end{aligned}$$

Exercice 15 (24.2)

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^3

- en utilisant la définition (ou caractérisation) d'un sous-espace vectoriel ;
- en les décrivant comme le noyau d'une matrice ou comme l'image d'une matrice.

$$1. F_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \right\}.$$

$$2. F_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 2s + t \\ s - t \\ s + t \end{pmatrix} \mid (s, t) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

$$3. F_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \text{ et } x + y - z = 0 \right\}.$$

$$4. F_4 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - 2z = 0 \right\} \cap \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y - z = 0 \right\}.$$

$$5. F_5 = \left\{ \begin{pmatrix} 2t \\ 3t \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exercice 16 (24.2)

1. Écrire, si possible, le vecteur $v = (1, 1, -3) \in \mathbb{R}^3$ comme combinaison linéaire des vecteurs

$$u_1 = (-3, 1, 2), \quad u_2 = (4, -2, 1), \quad u_3 = (-5, 1, 7).$$

2. Montrer que $\text{Vect} \{ u_3 \} \subset \text{Vect} \{ u_1, u_2 \}$ mais que ces deux sous-espaces vectoriels ne sont pas égaux.

Exercice 17 (24.2)

Dans le \mathbb{R} -espace vectoriel \mathbb{R}^3 , on pose

$$u = (1, 2, 3), \quad v = (2, -1, 1), \quad a = (1, 0, 1) \quad \text{et} \quad b = (0, 1, 1).$$

Démontrer que $\text{Vect}(u, v) = \text{Vect}(a, b)$.

Exercice 18 (24.2)

1. Écrire, si possible, le vecteur $v = (5, 1, 6) \in \mathbb{R}^3$ comme combinaison linéaire des vecteurs

$$u_1 = (0, 1, 1), \quad u_2 = (1, 2, 3), \quad u_3 = (2, -1, 3).$$

2. Montrer que $\text{Vect} \{ v, u_1, u_3 \} = \text{Vect} \{ u_1, u_2, u_3 \}$.

Exercice 19 (24.2)

On considère les vecteurs suivants

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- Montrer que u est combinaison linéaire de v_1 et v_2 et expliciter cette combinaison linéaire. Montrer que w n'est pas combinaison linéaire de v_1 et v_2 .
- Comparer les quatre sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^3 suivants
 $\text{Vect} \{ v_1, v_2 \} \quad \text{Vect} \{ v_1, v_2, u \} \quad \text{Vect} \{ v_1, v_2, w \} \quad \mathbb{R}^3.$
- En déduire que $\text{Vect} \{ v_1, v_2, u, w \} = \mathbb{R}^3$.
- Montrer également que tout vecteur $b \in \mathbb{R}^3$ peut être exprimé comme combinaison linéaire de v_1, v_2, u, w d'une infinité de manières différentes.

Exercice 20 (24.2)

Soit $v, w \in \mathbb{R}^n$. Expliquer la différence entre les ensembles

$$A = \{ v, w \} \quad \text{et} \quad B = \text{Vect} \{ v, w \}.$$

Exercice 21 (24.2)

On considère l'ensemble

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \left| x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \text{ et } x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \right. \right\}.$$

Montrer que V est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^4 :

- en utilisant la définition de sous-espace vectoriel;
- en exhibant une famille finie qui engendre V ;
- en écrivant V comme le noyau d'une matrice.

Exercice 22 (24.2)

On considère l'espace vectoriel $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions continues sur \mathbb{R} et à valeurs réelles. On note $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^{-x}$. Montrer l'égalité

$$\text{Vect}(\text{ch}, \text{sh}) = \text{Vect}(\exp, \phi).$$

Exercice 23 (24.2)

Montrer que les ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ en les décrivant sous la forme $\text{Vect}(A)$.

1. $F_1 = \{ f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' - 2f = 0 \}$.
2. $F_2 = \{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f'' - \omega^2 f = 0 \}$ où $\omega \in \mathbb{R}_+^*$.
3. $F_3 = \{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f'' + 2f' + f = 0 \}$.
4. $F_4 = \{ f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f'' - 4f = 0 \}$.

Exercice 24 (24.2)

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

1. En calculant A^{-1} , résoudre l'équation suivante d'inconnue α et β :

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix} \quad (1)$$

2. Soit $w_1 = (1, 2)^T$ et $w_2 = (1, -1)^T$. Montrer que $\text{Vect} \{ w_1, w_2 \} = \mathbb{R}^2$. C'est-à-dire, montrer que *tout* vecteur $b \in \mathbb{R}^2$ est combinaison linéaire de w_1 et w_2 en résolvant l'équation $b = Ax$ d'inconnue x :

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \quad (2)$$

3. Montrer que si v et w sont deux vecteurs non nuls de \mathbb{R}^2 , avec $v = (a, c)^T$ et $w = (b, d)^T$, alors

$$\text{Vect} \{ v, w \} = \mathbb{R}^2 \iff \forall t \in \mathbb{R}, v \neq tw \iff \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0.$$

Exercice 25 (24.2)

Soient E un \mathbb{K} -espace vectoriel, A et B deux parties quelconques de E .

1. Comparer $\text{Vect}(A \cap B)$ et $\text{Vect}(A) \cap \text{Vect}(B)$.
2. Comparer $\text{Vect}(A \cup B)$ et $\text{Vect}(A) \cup \text{Vect}(B)$.