

Chapter 7 Fonctions circulaires

Exercice 1 (7.1)

Déterminer le domaine de définition des fonctions d'une variable réelle ci-dessous.

1. $f(x) = \cos(x^2 + 4)$.

2. $f(x) = \sin \frac{1}{x(x-1)}$.

3. $f(x) = \tan 3x$.

Exercice 2 (7.2)

Calculer $\sin \alpha$ et $\cos \alpha$ sachant que $\tan \alpha = \frac{4}{5}$ et que α un angle du troisième quadrant.

Exercice 3 (7.2)

Soit α un angle du premier quadrant.

Calculer $\sin(2\alpha)$, $\cos(2\alpha)$ et $\tan(2\alpha)$ sachant que $\cos \alpha = \frac{12}{13}$.

Exercice 4 (7.3)

Résoudre dans \mathbb{R} puis dans $[0, 2\pi]$ les équations suivantes :

1. $\sin x = 0$,

2. $\sin x = 1$,

3. $\sin x = -1$,

4. $\cos x = 1$,

5. $\cos x = -1$,

6. $\cos x = 0$,

7. $\tan x = 0$,

8. $\tan x = 1$.

Exercice 5 (7.3)

Résoudre dans \mathbb{R} puis dans $[0, 2\pi]$ les équations suivantes :

1. $\sin x = \frac{1}{2}$,

2. $\sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$,

3. $\tan x = -1$,

4. $\tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$,

5. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

6. $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Exercice 6 (7.3)

Résoudre l'équation

$$\sin 2x = \cos \frac{x}{2} \quad (1)$$

et représenter sur le cercle trigonométrique les images des solutions.

Exercice 7 (7.3)

Résoudre dans \mathbb{R} :

$$2 \sin^4 x - 5 \sin^2 x + 2 = 0. \quad (1)$$

Exercice 8 (7.3)

Résoudre l'inéquation

$$\frac{1 - 2 \sin^2 x}{1 + 2 \cos x} \geq 0. \quad (1)$$

d'inconnue $x \in [0, 2\pi]$.

Exercice 9 (7.3)

Soit les deux équations

$$\cos x + \sqrt{3} \sin x = m\sqrt{2}$$

et

$$\cos a \cos x + \sin a \sin x = m \cos b.$$

1. Déterminer a et b pour qu'elles soient équivalentes.
2. En déduire pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ la première de ces équations possède des solutions.
3. La résoudre pour $m = 1$.

Exercice 10 (7.3)

Soient $\omega, t \in \mathbb{R}$. Mettre l'expression $y = 2 \cos^2 \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right) + \sin^2(\omega t)$ sous la forme $y = A \cos(2\omega t + \phi) + B$, A , B et ϕ étant des constantes réelles.

Exercice 11 (7.5)

Déterminer le domaine de définition des fonctions d'une variable réelle ci-dessous.

- | | | |
|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $f(x) = \arctan(1 - 2x)$. 2. $f(x) = \arcsin \frac{1}{x}$. | | <ol style="list-style-type: none"> 3. $f(x) = \arccos \sqrt{x(4-x)}$. |
|--|--|---|

Exercice 12 (7.5)

Donner une expression simple des réels

$A = \arcsin \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right);$	$B = \tan \left(\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right);$
$C = \arcsin \left(\sin \frac{3\pi}{4} \right);$	$D = \arccos \left(\cos \frac{89\pi}{3} \right).$

Exercice 13 (7.5)

Calculer $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$.

Exercice 14 (7.5)

Calculer $2 \arcsin \frac{3}{5} + \arcsin \frac{7}{25}$.

Exercice 15 (7.5)

Le but de cet exercice est de tracer la courbe représentative de la fonction f définie par

$$f(x) = \arcsin(\sin x).$$

1. Justifier que f est définie sur \mathbb{R} .
2. Montrer que f est 2π -périodique et impaire. Justifier que l'on peut alors restreindre l'étude de f à $[0, \pi]$.
3. Soit $x \in [0, \pi/2]$, que vaut $f(x)$?
4. Soit $x \in [\pi/2, \pi]$, que vaut $f(x)$?
5. Tracer la courbe représentative de la fonction f .

6. \Rightarrow Résoudre les équations $f(x) = 0$, $f(x) = \frac{\pi}{3}$ et $f(x) = \pi$.

7. $\Rightarrow \Rightarrow$ Pour $k \in \mathbb{Z}$, on pose $I_k = \left[-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right]$. Simplifier l'expression de $f(x)$ lorsque $x \in I_k$.

Exercice 16 (7.5)

Tracer la courbe représentative de la fonction f définie par

$$f(x) = \arccos(\cos x).$$

S'inspirer de l'exercice 15 (7.5).

Exercice 17 (7.5)

Tracer la courbe représentative de la fonction f définie par

$$f(x) = \arctan(\tan x).$$

S'inspirer de l'exercice 15 (7.5).

Exercice 18 (7.5)

Montrer

$$\forall x \in [-1, 1], \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 19 (7.5)

Montrer

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Exercice 20 (7.5)

On se propose d'étudier f , la fonction d'une variable réelle définie par

$$f(x) = \arcsin(3x - 4x^3).$$

Dans tout cet exercice, on pourra poser $\phi(x) = 3x - 4x^3$.

1. Justifier que le domaine de définition de f est $E = [-1, 1]$.
2. Dans cette question, on cherche à donner une expression simple de $\arcsin(\sin u)$.
 - (a) Montrer que si $u \in \left[-\frac{3}{2}\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$, alors $\arcsin(\sin(u)) = -\pi - u$.
 - (b) Calculer $\arcsin(\sin(u))$ pour $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
 - (c) Calculer $\arcsin(\sin(u))$ pour $u \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.
3. Montrer que pour $\theta \in \mathbb{R}$, on a $\sin(3\theta) = 3 \sin \theta - 4 \sin^3(\theta)$.
4. Soit $x \in E$. On pose $\theta = \arcsin x$. En dégageant les cas pertinents pour x , exprimer $f(x) = f(\sin \theta)$ en fonction de $\arcsin(x)$.
5. Tracer le graphe de f .
6. Déterminer sur quel ensemble f est dérivable. Calculer sa dérivée et confronter votre résultat à celui de la question 4.

Problème 21 (7.5) *Formule de Machin*

1. Préciser les parties de \mathbb{R} sur lesquelles :

(a) $\arctan(\tan(x)) = x$;

(b) $\tan(\arctan(x)) = x$.

2. Calculer successivement,

$$\tan\left(2 \arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right), \quad \tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right)\right), \quad \text{et} \quad \tan\left(4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \frac{\pi}{4}\right).$$

On obtiendra des nombres rationnels que l'on simplifiera.

3. En déduire la formule de Machin

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right).$$

Remarque. Sachant que $\arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, cette formule permet à John Machin (1680-1752) de déterminer en 1706 les 100 premières décimales de π .