

Borne supérieure dans \mathbb{R}

Aperçu

1. Théorème de la borne supérieure
2. Les dix types d'intervalles de \mathbb{R}

Borne supérieure dans \mathbb{R}

1. Théorème de la borne supérieure

1.1 Borne supérieure

1.2 Borne inférieure

1.3 La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

2. Les dix types d'intervalles de \mathbb{R}

1. Théorème de la borne supérieure

1.1 Borne supérieure

1.2 Borne inférieure

1.3 La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

2. Les dix types d'intervalles de \mathbb{R}

C'est la propriété cruciale de \mathbb{R} .

D 1 Soit A une partie de \mathbb{R} . Si l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément, celui-ci est appelé **la borne supérieure de A** et on la note $\sup A$.

On admet la propriété fondamentale suivante

T 2 *Toute partie non vide et majorée de \mathbb{R} admet une borne supérieure.*

- E 3**
1. L'ensemble \mathbb{N} n'a pas de borne supérieure dans \mathbb{R} .
 2. La borne supérieure de $[0, 1]$ est 1, c'est aussi son plus grand élément.
 3. La borne supérieure de $[0, 1[$ est 1, mais $[0, 1[$ n'a pas de plus grand élément.

C'est la propriété cruciale de \mathbb{R} .

D 1 Soit A une partie de \mathbb{R} . Si l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément, celui-ci est appelé **la borne supérieure de A** et on la note $\sup A$.

On admet la propriété fondamentale suivante

T 2 *Toute partie non vide et majorée de \mathbb{R} admet une borne supérieure.*

- E 3**
1. L'ensemble \mathbb{N} n'a pas de borne supérieure dans \mathbb{R} .
 2. La borne supérieure de $[0, 1]$ est 1, c'est aussi son plus grand élément.
 3. La borne supérieure de $[0, 1[$ est 1, mais $[0, 1[$ n'a pas de plus grand élément.

R Il est faux que toute partie non vide majorée de \mathbb{Q} admette une «borne supérieure» dans \mathbb{Q} . Par exemple avec $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$. L'ensemble des rationnels qui majore A est $[\sqrt{2}, +\infty[\cap \mathbb{Q}$: il n'a pas de plus petit élément dans \mathbb{Q} .

E 4 Soit

$$A = \left\{ -\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^{\star} \right\} = \left\{ -1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots \right\}$$

Alors A n'a pas de plus grand élément et $\sup(A) = 0$.

T 5 Soit A et B deux parties non vides de \mathbb{R} . On suppose que $A \subset B$ et que B est majorée. Alors A est majorée et $\sup A \leq \sup B$.

1. Théorème de la borne supérieure

1.1 Borne supérieure

1.2 Borne inférieure

1.3 La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

2. Les dix types d'intervalles de \mathbb{R}

D 6 Soit A une partie de \mathbb{R} . Si l'ensemble des minorants de A admet un plus grand élément, celui-ci est appelé **la borne inférieure de A** et on la note $\inf A$.

T 7 *Toute partie non vide et minorée de \mathbb{R} admet une borne inférieure.*

T 8 Soit A et B deux parties non vides de \mathbb{R} . On suppose que $A \subset B$ et que B est minorée. Alors A est minorée et $\inf A \geq \inf B$.

T 9 Soit A une partie non vide majorée de \mathbb{R} . On pose $B = \{-x \mid x \in A\}$. Alors B est minorée et $\inf B = -\sup A$.

1. Théorème de la borne supérieure

1.1 Borne supérieure

1.2 Borne inférieure

1.3 La droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$

2. Les dix types d'intervalles de \mathbb{R}

N

On note $\overline{\mathbb{R}}$ l'ensemble $\mathbb{R} \cup \{ -\infty, +\infty \}$ appelé droite numérique achevée.

1. Théorème de la borne supérieure

2. Les dix types d'intervalles de \mathbb{R}

2.1 Parties convexes de \mathbb{R}

2.2 Caractérisation des parties convexes

1. Théorème de la borne supérieure

2. Les dix types d'intervalles de \mathbb{R}

2.1 Parties convexes de \mathbb{R}

2.2 Caractérisation des parties convexes

D 10 Une partie I de \mathbb{R} est **convexe** lorsque tout segment dont les extrémités sont deux éléments de I est inclus dans I , c'est-à-dire

$$\forall (x, y) \in I^2, [x, y] \subset I.$$

ou encore

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall z \in \mathbb{R}, x \leq z \leq y \implies z \in I.$$

1. Théorème de la borne supérieure

2. Les dix types d'intervalles de \mathbb{R}

2.1 Parties convexes de \mathbb{R}

2.2 Caractérisation des parties convexes

T 11 Caractérisation des parties convexes de \mathbb{R}

Les parties convexes de \mathbb{R} sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.

► *Les intervalles ouverts, de la forme*

$$]a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x \}$$

$$]-\infty, b[= \{ x \in \mathbb{R} \mid x < b \}$$

$$]a, b[=]-\infty, b[\cap]a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x < b \}$$

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

T 11 Caractérisation des parties convexes de \mathbb{R}

Les parties convexes de \mathbb{R} sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.

► Les *intervalles fermés*, de la forme

$$[a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \}$$

$$]-\infty, b] = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq b \}$$

$$[a, b] =]-\infty, b] \cap [a, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b \}$$

$$]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

*Les intervalles de la forme $[a, b]$ fermés et bornés sont aussi appelés **segments**.*

T 11 Caractérisation des parties convexes de \mathbb{R}

Les parties convexes de \mathbb{R} sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.

► *Les intervalles de la forme*

$$]a, b] = \{ x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b \}$$

$$[a, b[= \{ x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b \}$$

Ces intervalles ne sont ni ouverts, ni fermés.

T 11 Caractérisation des parties convexes de \mathbb{R}

Les parties convexes de \mathbb{R} sont les suivantes, les bornes a et b étant des nombres réels.

► L'ensemble vide : \emptyset .

R

► Noter que si $b < a$, alors $]a, b[= [a, b] = \emptyset$. Si $a = b$, on a $[a, a] = \{ a \}$.

► Par ailleurs, \mathbb{R} et \emptyset sont des intervalles ouverts et fermés.

C 12 *Toute intersection d'intervalles est un intervalle.*