

Chapter 13 Borne supérieure dans \mathbb{R}

Exercice 1 (13.1)

Déterminer si les parties suivantes de \mathbb{R} sont majorées, minorées. Puis déterminer, s'ils existent, le plus grand élément, le plus petit élément, la borne supérieure et la borne inférieure.

- | | |
|---------------------|---|
| 1. $]0, 1[$, | 5. $\left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$, |
| 2. $[0, 1[$, | 6. $\{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 2 \}$, |
| 3. $]1, +\infty[$, | 7. $\{ x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \leq 2 \}$. |
| 4. \mathbb{N} , | |

Solution 1 (13.1)

1. Montrons que $\sup(]0, 1[) = 1$.

- Le réel 1 est un majorant de $]0, 1[$ car pour tout $x \in]0, 1[$, on a $x \leq 1$.
- Montrons que 1 est le plus petit des majorants. Soit μ un autre majorant de $]0, 1[$, et supposons que $\mu < 1$.

Dans ce cas, il existe un z tel que $\mu < z < 1$. On pose $x = \max \left\{ \frac{1}{2}, z \right\}$ (pour être sûr d'avoir $x > 0$), alors

$$x \in]0, 1[\text{ et } x \geq z > \mu;$$

ce qui contredit le fait que μ est un majorant.

Ainsi, 1 est le plus petit des majorant de $]0, 1[$, c'est-à-dire $\sup(]0, 1[) = 1$. De plus, $1 \notin]0, 1[$, donc $]0, 1[$ n'a pas de plus grand élément.

- Le réel 0 est un minorant de $]0, 1[$ car pour tout $x \in]0, 1[$, on a $x \geq 0$.
- Montrons que 0 est le plus grand des minorants. Soit μ un autre minorant de $]0, 1[$, et supposons que $\mu > 0$. On pose $x = \min \left\{ \frac{1}{2}, \mu \right\}$, alors

$$x \in]0, 1[\text{ et } x \leq \mu;$$

ce qui contredit le fait que μ est un minorant.

Ainsi, 0 est le plus grand des minorant de $]0, 1[$, c'est-à-dire $\sup(]0, 1[) = 0$. De plus, $0 \notin]0, 1[$, donc $]0, 1[$ n'a pas de plus petit élément.

2. De manière analogue à la question précédente, on a $\sup([0, 1]) = 1$ et $[0, 1[$ n'a pas de plus grand élément.

De plus, $0 \in [0, 1[$ et pour tout $x \in [0, 1[$, on a $0 \leq x$. Ainsi 0 est le plus petit élément de $[0, 1[$, c'est donc également sa borne inférieure : $\inf[0, 1[= 0$ (inutile de refaire la preuve).

3. L'intervalle $]1, +\infty[$ n'est pas majoré : il n'a ni borne supérieure, ni plus grand élément.

L'intervalle $]1, +\infty[$ est minoré par 1. De plus, si $\mu > 1$, alors il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $1 < x < \mu$ (par exemple $x = \frac{1+\mu}{2}$). Ainsi

$$x \in]1, +\infty[\text{ et } x < \mu$$

donc μ n'est pas un majorant de $]1, +\infty[$.

Ainsi, $\inf]1, +\infty[= 1$ et puisque $1 \notin]1, +\infty[$, cet intervalle n'a pas de plus petit élément.

4. \mathbb{N} n'est pas majoré : il n'a ni borne supérieure, ni plus grand élément. De plus, $0 \in \mathbb{N}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq n$: 0 est le plus petit élément de \mathbb{N} . On a donc également $\inf \mathbb{N} = \min \mathbb{N} = 0$.

5. Notons $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n} \leq 1$ et $1 \in A$, donc $1 = \max A = \sup A$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq \frac{1}{n}$, donc 0 est un minorant de A . Soit $\mu > 0$, le caractère Archimédien de \mathbb{R} montre qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\frac{1}{\mu} < n_0.$$

(Explicitement, on peut prendre $n_0 = \lfloor 1/\mu \rfloor + 1$). On a donc

$$\frac{1}{n_0} \in A \text{ et } \frac{1}{n_0} < \mu,$$

donc μ n'est pas un minorant de A . Ainsi $\inf A = 0$ et A n'a pas de plus petit élément ($0 \notin A$).

6. On a $B = \{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 2 \} = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. Il est facile de voir que $-\sqrt{2}$ est son plus petit élément et $\sqrt{2}$ son plus grand élément. Ainsi

$$\inf B = \min B = -\sqrt{2} \quad \text{et} \quad \sup B = \max B = \sqrt{2}.$$

7. Notons $C = \{ x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \leq 2 \} = \{ x \in \mathbb{Q} \mid -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2} \}$.

Le réel $\sqrt{2}$ est un majorant de C . De plus, si $\mu < \sqrt{2}$, alors $\min(\mu, 0) < \sqrt{2}$ et il existe un rationnel $z \in \mathbb{Q}$ tel que $\mu < z < \sqrt{2}$. Ainsi

$$z \in C \quad \text{et} \quad z > \mu;$$

donc μ n'est pas un majorant de C . On a donc $\sup C = \sqrt{2}$, et puisque $\sqrt{2} \notin C$, C n'a pas de plus grand élément.

De manière analogue, $\inf C = -\sqrt{2}$ et C n'a pas de plus petit élément.

Exercice 2 (13.1)

Soit A une partie non vide et majorée de \mathbb{R} . On suppose que la borne supérieure M de A vérifie $M = \sup(A) > 0$. Montrer qu'il existe un élément de A strictement positif.

Solution 2 (13.1)

Puisque $M > 0$, et que M est le plus petit des majorant de A , 0 n'est pas un majorant de A : il existe $x_0 \in A$ tel que $x_0 > 0$.

Exercice 3 (13.1)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un application croissante et $A \subset \mathbb{R}$ une partie non-vide majorée.

1. Montrer que $\sup(f(A)) \leq f(\sup A)$.
2. Trouvez un exemple où l'inégalité est stricte.

Solution 3 (13.1)

1. Montrer que $\sup(f(A)) \leq f(\sup A)$ revient à démontrer que $f(\sup A)$ est un majorant de $f(A)$.

Soit $y \in f(A)$, il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$. Or $x \in A$ donc $x \leq \sup A$. De plus, f est croissante donc $y = f(x) \leq f(\sup A)$.

On a donc

$$\forall y \in f(A), y \leq f(\sup A),$$

c'est-à-dire que $f(\sup A)$ est un majorant de $f(A)$. Or $\sup(f(A))$ est le plus petit des majorants de $f(A)$ d'où

$$\sup(f(A)) \leq f(\sup A).$$

2. Posons

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad A = [0, 3[$$
$$x \mapsto \begin{cases} x & : x < 3 \\ x + 8 & : x \geq 3 \end{cases}$$

L'application f est croissante. De plus,

- $f(A) = [0, 3[$ donc $\sup(f(A)) = 3$,
- $\sup A = 3$ et $f(\sup A) = f(3) = 11$.

On a donc bien $\sup(f(A)) < f(\sup A)$.

Exercice 4 (13.1)

Soient A et B deux parties non vides majorées de \mathbb{R} . On note

$$A + B = \{ a + b \mid a \in A \text{ et } b \in B \}.$$

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Compléter : $x \in A + B \iff \dots$.
2. Montrer que $A + B$ est non vide est majorée.
3. Déterminer $\sup(A + B)$.

Exercice 5 (13.2)

Montrer que l'intersection de deux intervalles est un intervalle (éventuellement vide).
Que peut-on dire de l'intersection de deux intervalles ouverts ? De deux intervalles fermés ?

Solution 5 (13.2)

On peut traiter les $10 \times 10 = 100$ cas à la main. Il vaut mieux utiliser le caractère convexe des intervalles.

Soit A et B deux intervalles de \mathbb{R} . Montrons que $A \cap B$ est convexe, donc un intervalle de \mathbb{R} .

Soit $x, y \in A \cap B$ tels que $x < y$ et soit $z \in [x, y]$.

- $(x, y) \in A$ et A est un intervalle, donc $z \in A$,
- $(x, y) \in B$ et B est un intervalle, donc $z \in B$.

Ainsi $z \in A \cap B$.

Conclusion

$A \cap B$ est un intervalle de \mathbb{R} .