
 <p>HOSPITAL DE ILLAPEL DR. HUMBERTO ELORZA CORTÉS <small>(TU HOSPITAL PROVINCIAL)</small></p>	<p>PROTOCOLO ANTIBIOPROFILAXIS EN PABELLON</p>	Código: PO-PAB-04
		Edición: 03
		Página 7 de 11
		Fecha: Diciembre 2024
		Vigencia: Diciembre 2029
		<p>HOSPITAL ILLAPEL</p>

TABLA N°1:
RESUMEN DOSIS DE ANTIBIOPROFILAXIS

Antimicrobiano	Dosis en adultos	Dosis pediátrica	Tiempo Infusión	Refuerzo (horas)
Cefazolina	2 gr (3 gr en >120 kgs)*>100k	30mg/kg	3-5 min	4 hrs
Vancomicina	1 gr (1,5 gr en >90 kgs)	15 mg/kg	>60 min	No 12h
Clindamicina	900 mg (Incluidas cirugías obstétricas / ginecológicas y >100kg)	10 mg/kg	10-20 min	6 hrs
Ciprofloxacino	400 mg	10 mg/kg	>60min	No
Gentamicina	5 mg/kg (ClCr>30) 2 mg/kg (ClCr<30)	2.5 mg/kg 3-5 mg/kg	>30 min	No
Metronidazol	500 mg	15 mg/kg 10mg/kg	>10 min	No 12h
Ampicilina- Sulbactam	3 gr	50 mg/kg del componente ampicilina	3-5 min	2 hrs
Ceftriaxona	2 gr	50 - 75 mg/kg	3-5 min	No
Cefuroximo	750 mg 1500mg	50 mg/kg	10-25 min	4 hrs
Doxiciclina	100 mg VO	-	1-2 horas	-

 <p>HOSPITAL DE ILLAPEL DR. HUMBERTO ELORZA CORTÉS <small>(TU HOSPITAL PROVINCIAL)</small></p>	<p>PROTOCOLO ANTIBIOPROFILAXIS EN PABELLON</p>	Código: PO-PAB-04
		Edición: 03
		Página 7 de 11
		Fecha: Diciembre 2024
		Vigencia: Diciembre 2029
		HOSPITAL ILLAPEL

A continuación, tabla resumen de recomendaciones en antibioprolifaxis para las cirugías más frecuentes en este centro con su alternativa frente a alergia a betalactámicos:

**TABLA N°2:
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO**


Procedimiento	Esquema de elección	Alergia a Betalactámicos
Cirugía con prótesis, materiales exógenos y grandes desplazamientos de piel y tejidos subcutáneos	Cefazolina	Clindamicina
Cirugía que atraviesa la cavidad oral o cirugía mayor de cabeza y cuello	Cefazolina + Metronidazol	Clindamicina
Reducción cerrada o abierta de fractura mandibular	Cefazolina	Clindamicina

**TABLA N°3:
CIRUGIA GINECOLOGICAS Y OBSTETRICAS**

Procedimiento	Esquema de elección	Alergia a Betalactámicos
Parto por cesárea	Cefazolina	Clindamicina + Gentamicina
Histerectomía vaginal o abdominal, por vía laparoscópica o abierta	Cefazolina	Clindamicina + Gentamicina
Ginecológicas: legrado, Resección y Marsupialización de Glándula de Bartolino	Doxiciclina	

**TABLA N°4:
CIRUGIA APARATO DIGESTIVO**

Procedimiento	Esquema de elección	Alergia a Betalactámicos
Cirugía vía biliar, colecistectomía clásica o laparoscópica	Cefazolina	Gentamicina
Cirugía intestino delgado sin obstrucción	Cefazolina	Gentamicina
Cirugía intestino delgado con obstrucción	Cefazolina + Metronidazol	Ciprofloxacino + Metronidazol
Cirugía colorrectal electiva	Cefazolina + Metronidazol	Ciprofloxacino + Metronidazol
Cirugía colorrectal de urgencia	Cefazolina + Metronidazol	Ciprofloxacino + Metronidazol
Apendicectomía	Cefazolina + Metronidazol	Ciprofloxacino + Metronidazol
Herniorrafia (con uso de malla op factores de riesgo)	Cefazolina	Gentamicina

 <p>HOSPITAL DE ILLAPEL DR. HUMBERTO ELORZA CORTÉS <small>(SU HOSPITAL PROVINCIAL)</small></p>	<p>PROTOCOLO ANTIBIOPROFILAXIS EN PABELLON</p>	Código: PO-PAB-04
		Edición: 03
		Página 7 de 11
		Fecha: Diciembre 2024
		Vigencia: Diciembre 2029
<p>HOSPITAL ILLAPEL</p>		

Cirugías que no requieren antibioprolifaxis

- Retiro de catéter
- Adenoidectomía
- Amigdalectomía
- Cirugía limpia de oído sin implante coclear
- Cirugía limpia de cabeza y cuello que no atraviesa cavidad oral
- Cirugía endoscópica de nariz y senos paranasales
- Cirugía limpia de mano, rodilla y pie sin implante
- Retiro de material de osteosíntesis
- Cistoscopia sin manipulación (sin biopsia, fulguración, etc)
- Circuncisión
- Descenso testicular
- Vasectomía
- Hernioplastia inguinal
- Procedimientos dentales