แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Human normal immunoglobulin, intravenous (IVIG) ข้อบ่งใช้ โรค idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) ชนิดรุนแรง

(กรอกเอกสารทุกครั้งที่มีการสั่งใช้ยา)

(รายละเอียดการใช้ยาโปรดอ้างอิงจากแนวทางกำกับการใช้ยาและคู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ)

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

1. ชื่อ-นามสกุล .....
2. HN .....
3. AN .....
4. สิทธิการเบิก ☐ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ☐ ประกันสังคม ☐ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ☐ อื่นๆ ระบุ .....
5. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
6. วันเดือนปีเกิด ...../...../.....
7. อายุ ..... ปี ..... เดือน
8. เลขประจำตัวประชาชน
9. รหัสโรงพยาบาล .....
10. ได้รับ pre-authorization แล้ว ☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
11. authorization number .....
12. น้ำหนักตัว ..... กิโลกรัม
13. ส่วนสูง ..... เซนติเมตร

แพทย์

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการอนุมัติและข้อมูลการใช้ยา

วันเดือนปีที่ให้ยา ...../...../.....

	ใช่	ไม่ใช่
1. ผู้ป่วยไม่อยู่ในภาวะ terminally ill (ไม่อนุมัติการใช้ยานี้ในผู้ป่วย terminally ill)	○	○
2. วินิจฉัยตามเกณฑ์ พบว่าเป็นโรค ITP ที่มีอาการรุนแรง ตามเกณฑ์ครบถ้วนทุกข้อดังนี้		
A มีเลือดออกผิดปกติที่เกิดจากจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ	○	○
B มี isolated thrombocytopenia ร่วมกับมีจำนวน megakaryocyte ในไขกระดูกปกติ วันเดือนปีที่ตรวจ ...../...../..... (peripheral blood smear และ bone marrow examination)	○	○
C ไม่มีสาเหตุอื่นๆของจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ เช่น ติดเชื้อ ยา เป็นต้น	○	○

กรณี absolute indication กรอกข้อ 3, 5 และ 6
กรณี relative indication กรอกข้อ 4, 5 และ 6

3. **กรณี absolute indication** ผู้ป่วยเป็นโรค ITP ที่มีอาการรุนแรง ตามเกณฑ์ครบถ้วนทุกข้อดังนี้		
D มีจำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 20,000/ลูกบาศก์มิลลิเมตร ระบุจำนวนเกล็ดเลือด ..... /ลูกบาศก์มิลลิเมตร วันเดือนปีที่ตรวจ ...../...../.....	○	○
E มีภาวะเลือดออกรุนแรงที่คุกคามต่อชีวิต ระบุตำแหน่งเลือดออกในอวัยวะสำคัญ ☐ สมอง ☐ ปอด ☐ ช่องท้อง ☐ อื่นๆ ระบุ	○	○
F ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐาน เช่น anti-Rho (D) immune globulin, เกล็ดเลือดและคอร์ติโคสเตรอยด์ วันเดือนปีที่เริ่มให้คอร์ติโคสเตรอยด์ ...../...../.....	○	○

แพทย์

		ใช่	ไม่ใช่
3. F	ระบุชื่อยา ..... ระบุขนาดยา ..... มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ระบุจำนวนเกล็ดเลือดภายหลังการให้คอร์ติโคสเตรอยด์ ..... /ลูกบาศก์มิลลิเมตร วันเดือนปีที่ตรวจ ...../...../.....		
4. กรณี relative indication เป็นการให้ยาในกรณีผู้ป่วยเป็นโรค acute ITP ที่เป็นต้องได้รับการตัดม้าม			
G	มีจำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 50,000/ลูกบาศก์มิลลิเมตร	◯	◯
H	ได้รับ คอร์ติโคสเตรอยด์ และ anti-Rho (D) immune globulin แล้ว แต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเกล็ดเลือดให้มากกว่า 50,000/ลูกบาศก์มิลลิเมตร ได้	◯	◯

5. ขนาดยาและระยะเวลาที่ให้ยา***ไม่เกิน 2 กรัม/กิโลกรัมต่อการรับไว้ในโรงพยาบาล 1 ครั้ง***

น้ำหนักตัว ..... กิโลกรัม (ขนาดยาที่แนะนำ ขนาด 400 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นเวลา 2-5 วัน หรือ 1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม. ให้ยาซ้ำครั้งที่สอง 24 ชั่วโมงหลังให้ยาครั้งแรก)

วันเดือนปีที่เริ่มให้ยา ...../...../..... ระยะเวลาที่ให้ยา ..... วัน

ขนาดยาIVIGทั้งหมดที่สั่งใช้ในครั้งนี้ ..... กรัม คิดเป็นขนาดยา ..... กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

สำหรับผู้อนุมัติ **กรณี absolute indication คือ 1. ✓ ใช่ 2. ✓ ใช่ทุกข้อ 3. ✓ ใช่ทุกข้อ และ 5.ระบุขนาดยาเป็นไปตามเกณฑ์**
กรณี relative indication คือ 1. ✓ ใช่ 2. ✓ ใช่ทุกข้อ 4. ✓ ใช่ทุกข้อ และ 5.ระบุขนาดยาเป็นไปตามเกณฑ์

6. ผลการรักษา

6.1 เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา (โปรดระบุรายละเอียด)	◯	◯
6.2 ผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษา ระบุจำนวนเกล็ดเลือดหลังให้ยา ..... /ลูกบาศก์มิลลิเมตร วันเดือนปีที่ตรวจ ...../...../..... (ควรตรวจหลังให้ยา IVIG 3 วัน)	◯	◯

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

.....

ลงนามแพทย์ผู้สั่งใช้ยา

(.....)

.....

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ

วันที่ ...../...../.....

ผลการอนุมัติ

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

ลงนามแพทย์ผู้อนุมัติ .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ ...../...../.....