แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา Prothrombin complex concentrate (PCC)
ข้อบ่งใช้ ภาวะเลือดออกรุนแรง ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดวอร์ฟาริน
(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.2/ว 286 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568)

1. คุณสมบัติของสถานพยาบาล

1.1 เป็นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมให้บริการทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 เป็นสถานพยาบาลที่มีเครือข่ายหน่วยบริการรับส่งต่อและดูแลรักษาในทุกระดับ พร้อมทั้งระบบสนับสนุนเครือข่ายด้านการจัดการการส่งต่อ ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย และวิชาการอย่างต่อเนื่อง

1.3 เป็นสถานพยาบาลที่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมจะร่วมดูแลรักษาตามที่ระบุไว้ในข้อ 3

2. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรจากแพทยสภาในสาขาอายุรศาสตร์ หรือกุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา หรือสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด หรือสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด หรืออนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก หรือเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

3. เกณฑ์อนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา

อนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา Prothrombin complex concentrate (PCC) ข้อบ่งใช้ภาวะเลือดออกรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดวอร์ฟาริน โดยต้องมีเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

3.1 ได้รับยาวอร์ฟารินโดยยังมีระดับ international normalized ratio (INR) มากกว่า 1.5

3.2 ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจทำให้เกิดความพิการ ไม่สามารถหยุดเลือดได้โดยวิธีอื่น โดยมีนิยามตาม International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คือ

3.2.1 เลือดออกรุนแรงจนมีความดันโลหิตตก หรือชีพจรเร็ว หรือต้องได้รับเม็ดเลือดแดง

3.2.2 เลือดออกในสมองหรือไขสันหลัง

3.2.3 เลือดออกที่อาจอุดตันทางเดินหายใจ

3.2.4 เลือดออกในช่องอก ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องท้อง หรือ retroperitoneum

3.2.5 เลือดออกที่มีการกดทับเส้นประสาทหรือกดทับหลอดเลือด

3.2.6 ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด การผ่าตัดช้ากว่านี้อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเกิดความพิการ จึงต้องทำการแก้ฤทธิ์ยาโดยเร็ว

3.3 ผู้ป่วยมีสาเหตุที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ fresh frozen plasma ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

3.3.1 มีความจำเป็นที่ต้องแก้ฤทธิ์ warfarin อย่างเร็วภายใน 1 - 2 ชั่วโมง ถ้าช้าอาจทำให้เสียชีวิตหรือเกิดความพิการ เช่น เลือดออกในสมองจนมี neurological deficit เป็นต้น

กรมบัญชีกลาง

3.3.2 มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะน้ำเกินจากการได้รับ fresh frozen plasma เนื่องจากมีภาวะหัวใจวายหรือไตวายรุนแรง

หมายเหตุ: ให้สถานพยาบาลกำกับการใช้ยาให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.1 - 3.3 โดยให้มีหลักฐาน เช่น แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา หรือผลการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แนบไว้ในเวชระเบียนเพื่อการตรวจสอบ

4. ขนาดยาที่แนะนำและวิธีการให้ยา

Prothrombin complex concentrate (PCC) ให้ในขนาด 25 - 50 ยูนิต/กก./ครั้ง เพียงครั้งเดียว

5. การประเมินผลการรักษา

5.1 การประเมินด้านประสิทธิผลของการรักษา

เลือดหยุดไหลโดยดูจากอาการทางคลินิก และ/หรือภาพรังสี และ/หรือระดับฮีโมโกลบิน

5.2 การประเมินด้านความปลอดภัย

5.2.1 ติดตามอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วย

5.2.2 ติดตามภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วย

6. เกณฑ์การหยุดยา เป็นการให้เพียงครั้งเดียว

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา Prothrombin complex concentrate (PCC)
ข้อบ่งใช้ ภาวะเลือดออกรุนแรง ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดวอร์ฟาริน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

1. ชื่อ..... สกุล..... 2. เพศ ❍ ชาย ❍ หญิง
3. HN..... 4. รหัสโรงพยาบาล.....
5. เลขที่ประจำตัวประชาชน ☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐
6. วัน/เดือน/ปีเกิด ...../...../..... 7. อายุ.....ปี.....เดือน 8. น้ำหนัก.....กิโลกรัม
9. สิทธิ์การรักษา ❍ สปสช. ❍ ประกันสังคม
❍ สวัสดิการข้าราชการ ❍ อื่น ๆ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการอนุมัติและข้อมูลการใช้ยา

	ใช่	ไม่ใช่
วัน/เดือน/ปีที่ขออนุมัติ ...../...../.....		
1. ผู้ป่วยได้รับยาวอร์ฟาริน โดยยังมีระดับ International normalized ratio (INR) มากกว่า 1.5 โปรดระบุระดับ INR	❍	❍
2. ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจทำให้เกิดความพิการ ไม่สามารถหยุดเลือดได้โดยวิธีอื่น โดยมีนิยามตาม International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คือ	❍	❍
☐ 1) เลือดออกรุนแรงจนมีความดันโลหิตตก หรือชีพจรเร็ว หรือต้องได้รับเม็ดเลือดแดง		
☐ 2) เลือดออกในสมองหรือไขสันหลัง		
☐ 3) เลือดออกที่อาจอุดตันทางเดินหายใจ		
☐ 4) เลือดออกในช่องอก ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องท้อง หรือ retroperitoneum		
☐ 5) เลือดออกที่มีการกดทับเส้นประสาทหรือกดทับหลอดเลือด		
☐ 6) ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด การผ่าตัดช้ากว่านี้อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเกิดความพิการ จึงต้องทำการแก้ฤทธิ์ยาโดยเร็ว		
4. ผู้ป่วยมีสาเหตุที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ Fresh frozen plasma โดย ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คือ	❍	❍
☐ 1) มีความจำเป็นที่ต้องแก้ฤทธิ์ warfarin อย่างเร็วภายใน 1-2 ชั่วโมง ถ้าช้าอาจทำให้เสียชีวิตหรือเกิดความพิการ โปรดระบุความจำเป็นที่ต้องแก้ฤทธิ์ warfarin อย่างรวดเร็ว.....		
☐ 2) มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะน้ำเกินจากการได้รับ Fresh frozen plasma เนื่องจาก ☐ มีภาวะหัวใจวาย ☐ ไตวายรุนแรง		
5. ขนาดยา Prothrombin complex concentrate (PCC) ที่ขออนุมัติใช้ โดยให้ในขนาด 25 - 50 ยูนิต/กก./ครั้ง เพียงครั้งเดียว (.....ยูนิต/ครั้ง)		

แพทย์ผู้สั่งใช้ยา

ลงชื่อ .....
(.....)
ว.....

ผู้อำนวยการสถานพยาบาลหรือแพทย์ผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้ยา

O อนุมัติ O ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ .....
(.....)
ว.....
วัน/เดือน/ปีที่อนุมัติ ...../...../.....

กรมบัญชีกลาง