

## Tema nr. 2

Date:  $n$  - dimensiunea sistemului,  $\epsilon$  - precizia calculelor, matricea sistemului  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  simetrică și pozitiv definită, vectorul termenilor liberi  $b \in \mathbb{R}^n$ :

- Să se calculeze, o descompunere  $LDL^T$  (descompunerea/factorizarea Choleski) a matricei  $A$  ( $A = LDL^T$ ), unde  $L$  este matrice inferior triunghiulară cu toate elementele de pe diagonala principală egale cu 1 iar  $D$  este matrice diagonală;
- Folosind această descompunere, să se calculeze determinantul matricei  $A$  ( $\det A = \det L \det D \det L^T$ );
- Utilizând descompunerea Choleski calculată mai sus și metodele substituției directe și inverse, să se calculeze  $x_{Chol}$ , o soluție aproximativă a sistemului  $Ax = b$ ;
- Folosindu-se una din bibliotecile menționate în pagina laboratorului, să se calculeze și să se afișeze o descompunere  $LU$  a matricei  $A$  și soluția sistemului  $Ax = b$ ;
- Să se verifice soluția calculată prin afișarea normei:

$$\|A^{init}x_{Chol} - b\|_2$$

(această normă ar trebui să fie mai mică decât  $10^{-8}, 10^{-9}$ )

$A^{init}$  este matricea inițială,  $\|\cdot\|_2$  este norma euclidiană.

- *Restricție:* în program să se aloce doar două matrice  $A$  și  $A^{init}$ . Matricea  $D$  se va memora într-un vector  $d$  (se memorează doar elementele de pe diagonala matricei  $D$ ). Elementele de sub diagonala principală a matricei  $L$  (partea strict inferior triunghiulară a matricei  $L$ ) se vor calcula direct în matricea  $A$ . Nu se vor memora elementele 1 de pe diagonala matricei  $L$ , dar se va ține cont de acest lucru la rezolvarea sistemelor triunghiulare ce implică matricea  $L$ .
- Scrieți programul astfel încât să poată fi testat (și) pe sisteme de dimensiuni mai mari decât 100. Generați folosind valori random o matrice  $A$  care să fie doar simetrică. Dacă matricea nu este pozitiv definită,

algoritmul de calcul al descompunerii Choleski și celelalte calcule se opresc. Se poate construi matricea aleator astfel încât să fie și pozitiv definită, dacă elementele diagonale satisfac următoarea relație:

$$a_{ii} > \sum_{\substack{j=1, \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Asemenea matrice se numesc matrice cu diagonala dominantă (pe linii).

**Bonus (25pt):** Să se verifice corectitudinea descompunerii calculate, i.e.:

$$LDL^T \approx A^{\text{initial}}$$

verificându-se relațiile:

$$(LDL^T)_{ij} \approx a_{ij} \iff |(LDL^T)_{ij} - a_{ij}| \leq 10^{-5}, \quad \forall i, j = 1, \dots, n, \quad i \leq j.$$

Pentru calculul elementelor  $(LDL^T)_{ij} - a_{ij}$ , să se folosească doar matricea  $A$  obținută după calculul descompunerii Choleski și vectorul  $d$ .

### Observații

1. Precizia calculelor  $\epsilon$ , este un număr pozitiv de forma:

$$\epsilon = 10^{-m} \text{ (cu } m = 5, 6, \dots, 10, \dots \text{ la alegere)}$$

valoare care este dată de intrare în program (se citește de la tastatură sau din fișier) la fel ca și dimensiunea  $n$  a datelor. Acest număr se folosește atunci când testăm dacă o variabilă este 0 sau nu înaintea unei operații de împărțire.

Dacă vrem să efectuăm operația de împărțire  $s = \frac{1.0}{v}$  unde  $v \in \mathbb{R}$  nu vom scrie:

```
if(v!=0) s = 1/v;
```

```
else print(" nu se poate face impartirea");
```

ci vom scrie în program:

```
if(abs(v) > eps) s = 1/v;
```

```
else print(" nu se poate face impartirea");
```

2. Dacă pentru o matrice  $A$  simetrică și pozitiv definită avem descompunerea  $LDL^T$ , rezolvarea sistemului  $Ax = b$  se reduce la rezolvarea a două sisteme cu matrice triunghiulară și a unuia cu matrice dagonală:

$$Ax = b \longleftrightarrow LDL^T x = b \longleftrightarrow \begin{cases} Lz = b, \\ Dy = z, (y_i = \frac{z_i}{d_i}, i = 1, \dots, n) \\ L^T x = y. \end{cases}$$

Se rezolvă întâi sistemul inferior triunghiular  $Lz = b$  (se adaptează formulele substituției directe pentru matrice cu diagonala egală cu 1). Apoi se rezolvă sistemul diagonal  $Dy = z$  (formulele de rezolvare sunt scrise mai sus,  $z$  fiind soluția obținută anterior) și apoi se rezolvă sistemul superior triunghiular  $L^T x = y$  unde  $y$  este soluția obținută la rezolvarea sistemului precedent  $Dy = z$  (din nou trebuie să se adapteze formulele de rezolvare a sistemelor superior triunghiulare pentru matrice cu diagonala egală cu 1). Vectorul  $x$  obținut la rezolvarea sistemului  $L^T x = y$  este și soluția sistemului inițial  $Ax = b$ .

3. Pentru calculul  $\|A^{init}x_{Chol} - b\|$  avem:

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad Ax = y \in \mathbb{R}^n, \quad y = (y_i)_{i=1}^n$$

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$z = (z_i)_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n, \quad \|z\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n z_i^2}$$

Atenție la calculul vectorului  $Ax_{Chol}$  - matricea  $A$  va fi modificată după calculul descompunerii Choleski: va avea în partea strict inferior triunghiulară elementele matricei  $L$ , iar elementele matricei  $A$  se găsesc în partea superior triunghiulară a matricei  $A$ .

## Metodele substituției

Fie sistemul liniar:

$$Ax = b \quad (1)$$

unde matricea sistemului  $A$  este triunghiulară. Pentru a găsi soluția unică a sistemului (1), trebuie ca matricea să fie nesingulară. Determinantul matricelor triunghiulare este dat de formula:

$$\det A = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

Prin urmare pentru rezolvarea sistemului (1) vom presupune că:

$$\det A \neq 0 \iff a_{ii} \neq 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

Vom considera întâi cazul când matricea  $A$  este inferior triunghiulară. Sistemul (1) are forma:

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 & & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 & & = b_2 \\ \vdots & & \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ii}x_i & & = b_i \\ \vdots & & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{ni}x_i + \cdots + a_{nn}x_n & = & b_n \end{array}$$

Necunoscutele  $x_1, x_2, \dots, x_n$  se deduc folosind ecuațiile sistemului de la prima către ultima.

Din prima ecuație se deduce  $x_1$ :

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}} \quad (2)$$

Din a doua ecuație, folosind (2), obținem  $x_2$ :

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1}{a_{22}}$$

Când ajungem la ecuația  $i$ :

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{ii-1}x_{i-1} + a_{ii}x_i = b_i$$

folosind variabilele  $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$  calculate anterior, avem:

$$x_i = \frac{b_i - a_{i1}x_1 - \dots - a_{ii-1}x_{i-1}}{a_{ii}}$$

Din ultima ecuație se deduce  $x_n$  astfel:

$$x_n = \frac{b_n - a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \dots - a_{nn-1}x_{n-1}}{a_{nn}}$$

Algoritmul de calcul a soluției sistemelor (1) cu matrice inferior triunghiulară este următorul:

$$x_i = \frac{\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j\right)}{a_{ii}} \quad , \quad i = 1, 2, \dots, n-1, n \quad (3)$$

Acest algoritm poartă numele de *metoda substituției directe*. Pentru matricele inferior triunghiulare cu 1 pe diagonală ( $a_{ii} = 1, \forall i$ ) formula de mai sus devine:

$$x_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j \quad , \quad i = 1, 2, \dots, n-1, n \quad (4)$$

Vom considera, în continuare sistemul (1) cu matrice superior triunghiulară:

$$\begin{array}{ccccccccccc} a_{11}x_1 & + & \dots & + & a_{1i}x_i & + & \dots & + & a_{1n-1}x_{n-1} & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & & \ddots & & & & & & & & & & \\ & & & & a_{ii}x_i & + & \dots & + & a_{in-1}x_{n-1} & + & a_{in}x_n & = & b_i \\ & & & & & & \ddots & & & & & & \\ & & & & & & & & a_{n-1n-1}x_{n-1} & + & a_{n-1n}x_n & = & b_{n-1} \\ & & & & & & & & & & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array}$$

Necunoscutele  $x_1, x_2, \dots, x_n$  se deduc pe rând, folosind ecuațiile sistemului de la ultima către prima.

Din ultima ecuație găsim  $x_n$ :

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \quad (5)$$

Folosind valoarea lui  $x_n$  dedusă mai sus, din penultima ecuație a sistemului obținem:

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1n}x_n}{a_{n-1n-1}}$$

Când ajungem la ecuația  $i$ :

$$a_{ii}x_i + a_{ii+1}x_{i+1} + \dots + a_{in}x_n = b_i$$

se cunosc deja  $x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_n$  și deducem:

$$x_i = \frac{b_i - a_{ii+1}x_{i+1} - \dots - a_{in}x_n}{a_{ii}}$$

Din prima ecuație găsim valoarea lui  $x_1$ :

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - \dots - a_{1n}x_n}{a_{11}}$$

Procedeul descris mai sus poartă numele de *metoda substituției inverse* pentru rezolvarea sistemelor liniare cu matrice superior triunghiulară:

$$x_i = \frac{\left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j\right)}{a_{ii}} \quad , \quad i = n, n-1, \dots, 2, 1 \quad (6)$$

Pentru matricele superior triunghiulare cu  $a_{ii} = 1, \forall i$  formula de mai sus devine:

$$x_i = b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \quad , \quad i = n, n-1, \dots, 2, 1 \quad (7)$$

## Descompunerea Choleski ( $LDL^T$ )

Fie  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  o matrice cu elemente reale, pătratică de dimensiune  $n$ , simetrică ( $A = A^T$ ) și pozitiv definită.

O matrice simetrică este o matrice egală cu transpusa sa. În astfel de matrice elementele de sub diagonală principală a matricei coincid cu elementele de deasupra diagonalei principale a matricei (informația se repetă).

Se numește matrice pozitiv definită o matrice care satisface următoarea relație:

$$(Ax, x)_{\mathbb{R}^n} > 0 \quad , \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad x \neq 0 \quad (8)$$

O matrice pozitiv definită are proprietatea că este nesingulară ( $\det A \neq 0$ ). Se caută o descompunere pentru matricea  $A$  de forma:

$$A = LDL^T$$

unde  $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$  este matrice inferior triunghiulară cu elementele de pe diagonală principală egale cu 1 ( $l_{ii} = 1 \quad \forall i$ ),  $D$  este o matrice diagonală,  $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ , iar  $L^T$  este transpusa matricei  $L$  ( $L^T$  este matrice superior triunghiulară )

### Algoritmul de calcul al descompunerii $LDL^T$ (metoda Choleski)

Fie  $A$  o matrice pătratică, pozitiv definită și simetrică. Algoritmul de calcul al matricei inferior triunghiulare  $L$  și al matricei  $D$  are  $n$  etape. La fiecare pas se determină câte o coloană din matricea  $L$  și un element de pe diagonală matricei  $D$ .

Facem următoarele notații (pentru a ușura deducerea algoritmului):

$$T = LD = (t_{ij}) \quad \quad U = L^T = (u_{ij})$$

$$t_{ij} = d_j l_{ij} \quad \quad u_{ij} = l_{ji} \quad \quad \forall i, j$$

#### **Pasul $p$** ( $p = 1, 2, \dots, n$ )

La acest pas se calculează elementul  $d_p$  și elementele coloanei  $p$  a matricei  $L$ ,  $l_{ip}, i = p + 1, \dots, n$  (restul elementelor de pe coloana  $p$  a matricei  $L$  au valori cunoscute:  $l_{ip} = 0, i = 1, \dots, p - 1, \quad l_{pp} = 1$ ).

Întâi se calculează elementul diagonal  $d_p$  și apoi elementele coloanei  $p$  a matricei  $L$ ,  $l_{ip}, i = p + 1, \dots, n$ .

Sunt cunoscute de la pașii anteriori:

- primele  $p - 1$  elemente de pe diagonală lui  $D$ :  $d_k, k = 1, \dots, p - 1$
- elementele primelor  $p - 1$  coloane din  $L$ :  $l_{ik}$  cu  $k = 1, \dots, p - 1, \forall i$

*Calculul elementului diagonal  $d_p$  :*

Folosind relația  $A = LDL^T = TU$ :

$$a_{pp} = (LDL^T)_{pp} = (TU)_{pp} = \sum_{k=1}^n t_{pk} u_{kp} = \sum_{k=1}^{p-1} d_k l_{pk} l_{pk} + d_p \cdot 1$$

Prin urmare:

$$a_{pp} = \sum_{k=1}^{p-1} d_k l_{pk}^2 + d_p$$

În această relație singurul element necunoscut este  $d_p$  deoarece elementele  $d_k$  și  $l_{pk}, k = 1, \dots, p - 1$  sunt elemente de pe diagonală matricei  $D$  și de pe coloane ale matricei  $L$  calculate la pașii anteriori. Deducem:

$$d_p = a_{pp} - \sum_{k=1}^{p-1} d_k l_{pk}^2 \quad (9)$$

*Calculul elementelor  $l_{ip}, i = p + 1, \dots, n$*

Folosim, din nou, relația  $A = LDL^T = TU$ :

$$a_{ip} = (LDL^T)_{ip} = (TU)_{ip} = \sum_{k=1}^n t_{ik} u_{kp} = \sum_{k=1}^{p-1} d_k l_{ik} l_{pk} + l_{ip} d_p$$

Dacă  $d_p \neq 0$  (pentru matrice  $A$  pozitiv definite acest lucru este adevărat) putem calcula elementele coloanei  $p$  a matricei  $L$  astfel:

$$l_{ip} = \left( a_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} d_k l_{ik} l_{pk} \right) / d_p, \quad i = p + 1, \dots, n \quad (10)$$

(elementele  $d_k, l_{ik}$  și  $l_{pk}, k = 1, \dots, p - 1$  sunt elemente din  $D$  și  $L$  calculate la pașii anteriori)



Dacă avem un element  $d_p = 0$ , algoritmul se oprește, descompunerea  $LDL^T$  nu poate fi calculată. Pentru matricele simetrice și pozitiv definite  $d_p \neq 0, \forall p$ .

**Observație:**

Pentru memorarea elementelor plasate sub diagonală principală a matricei  $L$  se poate folosi partea strict inferior triunghiulară a matricei  $A$  inițială:

$$l_{ij} = a_{ij} \quad , \quad i = 1, 2, \dots, n \quad , \quad j = 1, 2, \dots, i - 1.$$

Se observă că în acest fel nu se memorează elementele de pe diagonală principală a matricei  $L$ ,  $l_{ii} = 1, i = 1, \dots, n$ . Vom 'memora' mascat aceste elemente în formulele de rezolvare a sistemelor triunghiulare ce implică matricea  $L$ . Se vor folosi formulele (4) pentru rezolvarea sistemului inferior triunghiular  $Lz = b$  și formulele (7) pentru rezolvarea sistemului superior triunghiular  $L^T x = y$ .

Calcululele (9) și (10) se pot face direct în matricea  $A$ .

Cu acest tip de memorare (partea strict inferior triunghiulară a matricei  $A$  conține elementele matricei  $L$ , iar partea superior triunghiulară are elementele matricei  $A$  inițiale) trebuie adaptate formulele de calcul a vectorului  $A^{init} x_{Chol}$ . Se va folosi proprietatea de simetrie a matricei  $A$  pentru a utiliza valorile corecte ale elementelor de sub diagonală principală a matricei  $A$ :

$$a_{ij} = a_{ji} \quad , \quad i = 1, \dots, n \quad , \quad j = 1, \dots, i - 1.$$

### Exemplu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2.5 & 3 \\ 2.5 & 8.25 & 15.5 \\ 3 & 15.5 & 43 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2.5 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2.5 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

După calculul acestei descompuneri, matricea  $A$  și vectorul  $d$  au următoarea structură:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2.5 & 3 \\ 2.5 & 8.25 & 15.5 \\ 3 & 4 & 43 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Sistemul liniar:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2.5 & 3 \\ 2.5 & 8.25 & 15.5 \\ 3 & 15.5 & 43 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 12 \\ 38 \\ 68 \end{pmatrix}$$

are soluția  $x = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ , soluțiile intermediare fiind  $z = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$  și

$$y = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$