# Récurrence

Romain Lemahieu

December 13, 2023

#### Première récurrence 1

Soit  $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$$

Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n - 1$$

#### Définition 1.1

Une propriété est une "fonction" qui est soit vraie ou fausse, par exemple :

 $\mathcal{P}_1(x)$ : "x+1=4"  $\qquad \qquad \mathcal{P}_1(2)$  est fausse

 $\mathcal{P}_1(3)$  est vraie

 $\mathcal{P}_2(x)$ : "x < 2"  $\qquad \qquad \mathcal{P}_2(2)$  est fausse  $\qquad \qquad \mathcal{P}_1\left(-\sqrt{3}\right)$  est vraie

 $\mathcal{P}_3(x;y)$ : "x>y"  $\mathcal{P}_3(2;4)$  est fausse  $\mathcal{P}_3(-2;t^2)$  est vraie pour tout réel t

Dans le raisonnement par récurrence classique utilise une propriété définie sur un sous ensemble d'un entier avec qu'un paramètre

 $R\'{e}daction:$ 

Soit la propriété définie pour tout entier naturel  $\mathcal{P}(n u_n = 2^n - 1)$ 

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n - 1 \Leftrightarrow \mathcal{P}(n)$$
 est vraie

#### Initialisation

Ne pas faire:

$$u_0 = 2^0 - 1 = 0$$

Rédaction:

Montrons que  $\mathcal{P}(0)$  est vraie :

$$u_0 = 0 \quad 2^0 - 1 = 0$$

Donc  $\mathcal{P}$  est initialisée.

### 1.3 Hérédité

En supposant pour un certain entier naturel k que  $\mathcal{P}(k)$  est vraie montrons que  $\mathcal{P}(k+1)$  l'est : Broullion :

Hypothèse de récurrence :  $\mathcal{P}(k)$  : " $u_k = 2^k - 1$ "

Ce que on veut démontrer :  $\mathcal{P}(k)$  : " $u_{k+1} = 2^{k+1} - 1$ "

#### 1.3.1 En partant d'énoncé :

$$u_{k+1} = 2u_k + 1$$

$$u_{k+1} = 2 \times (2^k - 1) + 1$$

$$u_{k+1} = 2 \times 2^k - 2 + 1$$

$$u_{k+1} = 2^{k+1} - 1$$

d'après l'énoncé par hypothèse de récurrence

Donc  $\mathcal{P}$  est héréditaire.

#### 1.3.2 En partant de la propriété:

$$u_{k} = 2^{k} - 1$$

$$2u_{k} = 2 \times (2^{k} - 1)$$

$$u_{k+1} = 2 \times 2^{k} - 2 + 1$$

$$u_{k+1} = 2^{k+1} - 1$$

par hypothèse de récurrence

d'après l'énoncé

Donc  $\mathcal{P}$  est héréditaire

### 1.4 Conclusion

La propriété  $\mathcal{P}$  étant initialisée au rang 0 et héréditaire  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout entier naturel n donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n - 1$$

## 2 Exercice

1. Soit  $u_n$  definie pour tout entier naturel n tel que :

$$\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = -3u_n + 2 \end{cases}$$

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = -2, 5 \times (-3)^n + 0, 5$ 

- 2. Montrer que la somme des angles d'un polygone de n côtés est égale à 180 + 180n
- 3. Montrer l'inégalité de bernoulli :

$$(x+1)^n > 1 + nx$$

pour tout entier naturel non nul réel x non nul supérieur ou égal à -1

4. (Récurrence Double) Exercice 7 LLG. Soit  $u_n$  definie pour tout entier naturel n tel que :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_1 = 5 \\ u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n. \end{cases}$$

Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n = 2^n + 3^n$ 

5. Montrer pour tout entier n et tout réel q différent de 1 que :

$$\sum_{k=0}^{n} q^{n} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

- 6. (Récurrence forte) Montrer que pour tout entier naturel n strictement supérieur à 1 s'exprime comme un produit de facteurs premiers d'une unique façon, à l'ordre près des facteurs.
- 7. Polynômes de Tchebychev de première espèce (Ex CGL 2023). Soit  $T_n$  definie pour tout entier naturel n tel que :

$$\begin{cases} T_0(x) &= 0 \\ T_1(x) &= x \\ T_{n+2} &= 2xT_{n+1}(x) - T_n(x) \end{cases}$$

Montrer que  $T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$ , sachant que:

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$$
$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

8. soit

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ b_0 = 0 \\ c_0 = 0 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n + \frac{1}{4}b_n \\ b_{n+1} = \frac{2}{3}a_n + \frac{1}{2}b_n + \frac{2}{3}c_n \\ c_{n+1} = \frac{1}{4}b_n + \frac{1}{3}c_n \end{cases}$$

montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{cases} a_n = \frac{3}{14} + \frac{2}{7} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{2}{7} \left(-\frac{1}{6}\right)^n \\ b_n = \frac{4}{7} - \frac{4}{7} \left(-\frac{1}{6}\right)^n \\ c_n = \frac{3}{14} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{2}{7} \left(-\frac{1}{6}\right)^n \end{cases}$$