

Tricomoníase

O que é essa doença:

Conhecido como *Trichomonas vaginalis* é um protozoário flagelado e eucarionte que causa uma infecção sexualmente transmissível, afetando mais mulheres do que homens. Embora a infecção possa ser assintomática em ambos os sexos, nos homens, o protozoário pode permanecer no trato geniturinário por longos períodos sem causar sintomas, possibilitando a transmissão para parceiros sexuais.

O *Trichomonas vaginalis* é o agente causador da tricomoníase, uma das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) mais comuns no mundo. A infecção é transmitida principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas, mas também pode ocorrer a partir de superfícies contaminadas, como por exemplo: toalhas, roupas de banho ou por transmissão vertical (da mãe para o bebê durante o parto).

Sintomas:

Requer um diagnóstico médico, e costuma ser silenciosa.

Mas quando há sintomas, provoca corrimento vaginal de odor desagradável, com elasticidade, bastante coceira genital e dor ao urinar nas mulheres. Os homens não costumam apresentar sintomas. Pode ocorrer também Dores locais no abdômen, dores durante a micção ou durante a relação sexual. Pode ocorrer também inflamação na uretra, inflamação na vulva, inflamação no colo do útero, inflamação vaginal, irritação vaginal.

Tratamento:

Após o diagnóstico o paciente deve receber um tratamento que é feito com antibiótico via oral, duas vezes ao dia, durante 7 dias ou de dose única irá depender do caso de cada um. É importante que caso tenha parceiro(a) faça o tratamento juntos.

Nesse período de tratamento não se deve consumir bebidas alcoólicas nem ter relação íntima.

Prevenção:

Usar preservativos em toda relação íntima, visitar regularmente o ginecologista, realizar exames regulares, e ter uma vida sexual com responsabilidade.

- Fonte de pesquisa: <https://saude.abril.com.br>

