




Enthornen beim Kalb





Enthornte Kälber zum Markt

Die Kälberkäufer auf unseren Märkten verlangen auf Grund der aktuellen Gesetzeslage immer mehr nach enthornten Kälbern, dies zeigt sich auch an den höheren Erlösen für diese Tiere.

Die Wichtigkeit des Themas kann man auch daran ersehen, dass das schonende Enthornen eine einzuhaltende Verpflichtung bei Cross Compliance geworden ist.

In der Cross Compliance Broschüre 2015 ist dies wie folgt formuliert:

„Bei der Enthornung von Kalbern, die bis zu einem Alter von sechs Wochen ohne Betäubung durchgeführt werden darf, bedeutet dies, dass im Rahmen des Eingriffs

Schmerzmittel verabreicht und eine Sedation (Anmerkung: d.h. Beruhigung, Ruhigstellung) vorgenommen werden muss, um alle Möglichkeiten zur Minderung von Schmerzen und Leiden auszuschöpfen. Die entsprechenden Tierarzneimittel müssen gemäß der Behandlungsanweisung des Tierarztes angewendet werden.“

Der Tiergesundheitsdienst hat ein sehr schonendes Verfahren zum Veröden der Hornanlage entwickelt, das wissenschaftlich überprüft und anerkannt ist, den Forderungen von CC gerecht wird und vom Landwirt durchgeführt werden darf.

Wir empfehlen dringend, dieses Verfahren anzuwenden und skizzieren es hier nochmal in kurzen Zügen:

Grundsätzlich sollen Schmerzen, Leiden und Schäden an unseren Tieren verhindert werden. Nach §5 Abs.3 Nr.2 des Tierschutzgesetzes ist ein Enthornen ohne Betäubung nur in den ersten 6 Lebenswochen des Kalbes zulässig.

Wir empfehlen dringend, dieses Verfahren anzuwenden und skizzieren es hier nochmal in kurzen Zügen:

- Frühzeitiges Enthornen
(bis zur 2. Lebenswoche da Hornanlage noch klein und passiver Immunschutz am größten ist)
- Zeitmanagement beachten
(wegen der Wirkungsdauer der Medikamente nicht mehr als 2-3 Kälber direkt nacheinander einspritzen)
- Beruhigungsmittel Xylazin (Empfehlung TGD: 0,7 – 0,9 ml/Kalb intramuskulär; je nach Größe des Kalbes)
- Schmerzmittel Metacam (Empfehlung TGD: 1,5 ml/Kalb subkutan)
- Enthornung erst 15 Minuten nach Medikamentenverabreichung wegen Wirkung der Medikamente
- Aufheizphase des Gerätes beachten.
- Hornknospen scheren
- Hornknospen nicht heraushebeln, sondern Knospe vom umliegenden Gewebe freibrennen, d.h. Ring um die Knospe brennen (Veröden)
- Prüfen, ob das Gewebe völlig durchtrennt ist (geschlossener Ring)
- Wundversorgung mit CTC-Spray/Silberspray
- Nachkontrolle der Kälber





Hinweis:

Das beschriebene Verfahren gilt nur für Kälber bis zum Alter von sechs Wochen. Über sechs Wochen alte Kälber dürfen nur mit Betäubung durch den Tierarzt enthornt werden.

Detaillierte Informationen zum Thema Enthornen finden Sie im Internet auf der Homepage der LfL unter folgenden Adressen:
<http://www.lfl.bayern.de/ilt/leherschau/084977/index.php> oder
<http://lfl.bayern.de/lvz/achselschwang/103371/index.php>.

Wir bitten Sie eindringlich im Sinne des Tierschutzes alle Kälber enthornt zu verkaufen! Verkaufen Sie ein Kalb über 6 Wochen Lebensalter, zwingen Sie den Käufer möglicherweise zu illegalem Handeln mit weitreichenden Folgen für seinen Betrieb! Das muss nicht sein! Die Landwirtschaft ist schon viel zu viel im Fokus der Tierschutzverbände! Die Käufer werden Ihnen für Ihre Unterstützung durch entsprechend höhere Gebote danken!

Auswahl des Enthornungsgerätes

Bei der Auswahl des Enthornungsgerätes sollte darauf geachtet werden, dass eine ausreichend tiefe Aussparung für die Hornknospe vorhanden ist. Hier ist es für den Betriebsleiter entscheidend, zu wissen, zu welchem Zeitpunkt (Lebenswoche der Kälber) das Veröden der Hornanlage auf seinem Betrieb stattfindet, um die richtige Geräteauswahl treffen zu können. So ist der Einsatz von Buddex® und HornUp® (Abb. unten links) für Kälber, die in der 3-ten bis 6-ten Lebenswoche behandelt werden, nicht zu empfehlen. Für die anderen Geräte gibt es unterschiedliche Brennköpfe, die man gegebenenfalls austauschen kann. Jeder Landwirt sollte das Enthornungsgerät nach den eigenen Präferenzen auswählen. Wichtig hierbei ist, die Handgröße, die baulichen Gegebenheiten (Netzbetrieb möglich oder nicht), Anzahl zu behandelnder Tiere an einem Tag, Zeitpunkt der Behandlung usw. zu beachten.



Akku

Gas

Elektro

<http://www.aelf-rh.bayern.de/landwirtschaft/tierhaltung/093484/index.php>

Empfehlungen

Grundlegend wird empfohlen, das Veröden der Hornanlage in den ersten 14 Lebenstagen durchzuführen. In diesem Alter sind die Hornknospen noch relativ klein und der Eingriff ist dementsprechend weniger invasiv als bei großen Hornknospen. Außerdem befinden sich die Kälber in diesem Alter meist in Einzelhaltung und das Handling und die Kontrolle der Tiere ist leichter durchführbar. Zusätzlich müssen sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem neuen Keimmilieu aus der Gruppenhaltung bzw. Umstellung an einen Tränkeautomaten etc. auseinandersetzen, wodurch eine zusätzliche Belastung des Immunsystems vermieden wird.

Was versteht man unter:

- Beruhigung (Sedation):

Bei einer Sedation wird das Tier ruhig gestellt. Zum Einsatz kommen dabei oft xylazinhaltige Mittel, die auch eine leichte und kurze schmerzlindernde Wirkung haben. Xylazinhaltige Mittel dürfen frühestens ab dem 10. Lebenstag und nur bei nüchternen Tieren (d.h. mindestens 4 h Abstand zur letzten Fütterung) eingesetzt werden. Sie müssen über einen Tierarzt bezogen oder verschrieben werden, dürfen aber auch vom Landwirt verabreicht werden.

- Schmerzbehandlung:

Sogenannte nicht-steroidale Entzündungshemmer (NSAID) sind Schmerzmittel mit entzündungshemmenden, fiebersenkenden und Schmerz lindernden Eigenschaften und wirken nach dem Eingriff auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Auch sie müssen über einen Tierarzt bezogen oder verschrieben werden, dürfen aber auch vom Landwirt verabreicht werden. Grundsätzlich gibt es verschiedene NSAID-Wirkstoffe, die sich auch in der Stärke und Dauer der Schmerzlinderung und/oder der Entzündungshemmung unterscheiden. Wichtig ist, dass für die Anwendung beim Enthornen zurzeit nur Präparate mit dem Wirkstoff Meloxicam zugelassen sind.

- Betäubung (Lokalanästhesie):

Die Betäubung schaltet die Weiterleitung der Schmerzreize an das Gehirn aus, vergleichbar mit der Betäubungsspritze beim Zahnarzt. Vorgeschrieben ist die medikamentelle Betäubung beim Enthornen für Biobetriebe. In Deutschland darf eine sogenannte Lokalanästhesie nur vom Tierarzt durchgeführt werden.

Fragen zu den genannten Medikamenten und deren Einsatz beantwortet auch Ihr Hoftierarzt.




Abb. 2: Entwicklung Körperabwehr Kalb und Zeitpunkt




Abb. 3: Schema Kalb mit Hornknospen und Lage Kopfnerv Horn



Das Veröden der Hornanlage darf laut Tierschutzgesetz bei Kälbern bis zum 41. Lebensstag durchgeführt werden. Sind die Tiere älter, bedarf es einer tierärztlichen Indikation (z.B. Verletzung am Horn etc.) und einer Betäubung. Seit 2015 ist in Bayern die Anwendung eines Sedativums und eines Schmerzmittels beim Veröden der Hornanlage verpflichtend und CC-relevant. Ökologisch wirtschaftende Betriebe haben je nach Öko-Verband zusätzliche Vorgaben zu beachten bzw. dürfen nicht enthornen.

Die vorliegenden Erfahrungen basieren auf dem Gemeinschaftsprojekt der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und dem Tiergesundheitsdienst Bayern e.V. zum schonenden Veröden der Hornanlage bei Kälbern. Gefördert wurde es durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Für ein tierschonendes und erfolgreiches Veröden der Hornanlage sollten folgende Punkte beachtet werden.

Die einzelnen Arbeitsschritte

1. Vorbereiten der Gerätschaften

Enthornungsgerät, Medikamente, Scherapparat, Wundspray, Arbeitshandschuhe etc.



2. Medikamentengabe

a) Mittel zum Sedieren (Wirkstoff: Xylazinhydrochlorid) die Gabe erfolgt intramuskulär z.B. in den Schultermuskel.




Foto: Riesberg

b) Schmerzmittel (Wirkstoff: Meloxicam) die Gabe erfolgt subkutan.



Foto: Riesberg

Die Dosierung der Medikamente sollte mit dem jeweiligen Tierarzt abgesprochen werden. Die Wirkstoffkonzentration kann je nach Medikament verschieden sein, so dass unterschiedliche Dosierungen erforderlich sein können.

3. **15 Minuten warten**, dabei die Kälber in Ruhe lassen, dann kann die Sedierung gut wirken.

4. Kurz vor dem Veröden die **Hornanlagen freischaufeln**.



So kann an der richtigen Stelle die Hornanlage verödet werden. Auch kleine Hornanlagen, die noch nicht fühlbar sind, sind dann gut sichtbar (weniger behaarte Stelle).



5. **Veröden der Hornanlage** unter Drehbewegungen des Gerätes.



Foto: Riesberg

Geräte, die eine Aufheizphase benötigen, müssen zum Veröden die entsprechende Betriebstemperatur erreicht haben.

Möglichst nicht länger als ca. 10 Sekunden durchgehend an einer Hornknospe arbeiten (zu hoher Wärmeeintrag).



Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft



Schonendes Veröden der Hornanlage bei Kälbern



6. Kontrolle des durchtrennten Gewebes

Es dürfen keine Gewebebrücken mehr bestehen, da es sonst leicht zu nachwachsenden Hörnern kommen kann.



7. Wundversorgung mit Wundspray

Um den Heilungsprozess zu unterstützen, ist die Kontrolle der Wunde wichtig (z.B. um Fliegenbefall und Entzündungen zu vermeiden).



8. Kalb in Brustlage

Vor Witterungseinflüssen (Regen, Kälte, Sonne) geschützt ablegen. Im Winter Kälber bei Bedarf mit Kälberdecke schützen.



9. Kontrolle der Wundheilung und gegebenenfalls Nachbehandlung.

Wichtige zu beachtende Punkte:

- Nur gesunde Kälber behandeln
- Möglichst in den ersten zwei Lebenswochen
→ Hornknospen noch klein, besseres Handling (Einzelbox)
- Keine gestressten Kälber behandeln
→ Sedierung wirkt nicht gut
- Ausreichend Abstand zu Mahlzeiten einhalten (1-2 Stunden)
- Fressgitter und ähnliche Öffnungen schließen (Erdrösselungsgefahr)
- Zeitmanagement beachten, zum einen je Kalb (15 Minuten), zum anderen bei mehreren Kälbern (nicht zu viele Kälber vorspritzen: < 4 Kälber)
- Größe des Brennkopfes muss für Hornknospen-größe passen
- Akkubetriebene Geräte eignen sich nur für junge Kälber
- Geräte benötigen bei geringen Außentemperaturen längere Aufheizphasen
- Geräte mit Vorsicht anwenden: unverhältnismäßig starke Krafteinwirkung sowie langes Brennen kann zu Gewebeschädigungen beim Kalb führen

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

<http://www.LfL.bayern.de/ilt/tierhaltung/120554/index.php>

Impressum

Herausgeber: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
Vöttinger Straße 38, 85354 Freising
www.LfL.bayern.de

Redaktion: Institut für Landtechnik und Tierhaltung
Vöttinger Straße 36, 85354 Freising
E-Mail: ILT@LfL.bayern.de
Tel.: 08161 71-3450, Fax: 08161 71-4048

Druck: diedruckerei.de, Neustadt a. d. Aisch
© LfL Schutzgebühr: 0,50 €