



BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



Tiertransport

Kühe treiben und lenken





Merkblatt T 11

Merkblatt zu landwirtschaftlichen Tiertransporten von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen

Grundsätzliches

Die hier aufgeführten Regelungen ergeben sich aus der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 und der Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV). Sie gelten nur für Transporte von Wirbeltieren in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Für den Transport von Tieren, der unter Anleitung eines Tierarztes unmittelbar in eine bzw. aus einer Tierarztpraxis oder Tierklinik erfolgt, sowie für z.B. Transporte von Hobbypferden oder den Transport von Rindern zur Alm („Transport zur jahreszeitlich bedingten Wanderhaltung“) gelten zum Teil geringere Anforderungen.

Nach VO (EG) Nr. 1/2005 dürfen eigene Tiere mit dem betriebseigenen Fahrzeug ohne weitere Auflagen (auch ohne Transportpapier) bis 50 km weit (z.B. zum Metzger) transportiert werden, wenn die Tiere transportfähig sind (s.u.), das Personal qualifiziert ist (z.B. landwirtschaftliche Ausbildung), die Fahrzeuge ausreichend Platz bieten und in gutem Zustand sind.

Voraussetzungen und Dokumente

- bei Transporten über 65 km benötigen Landwirte eine **Zulassung** durch das Veterinäramt (muss alle 5 Jahre neu beantragt werden). Voraussetzung dafür ist der **Befähigungsnachweis**. Dieser kann durch einen etwa einstündigen Ergänzungslehrgang von Landwirten/Hauswirtschaftlerinnen und sonstigen sachkundigen Personen mit einer Prüfung durch die Veterinärbehörde erlangt werden, bzw. kann beantragt werden, wenn ein erfolgreicher Abschluss nach dem 5. Januar 2007 im Bereich Landwirtschaft (z.B. Studium, Berufsausbildung) nachgewiesen wird. Für Personen ohne Erfahrung im Umgang mit Tieren ist ein dreitägiger Lehrgang nötig.
- Das übliche **Transportpapier** (Angaben zu Herkunft und Eigentümer der Tiere, Versandort, Tag, Uhrzeit des Beladebeginns, Bestimmungsort und voraussichtliche Dauer der Beförderung) muss bei Transporten über 65 km mitgeführt werden.
- Grundsätzlich darf die Beförderungsdauer nicht mehr als 8 Stunden betragen. Werden Transporte mit einer Dauer von über 8 Stunden durchgeführt, müssen die Transportfahrzeuge zusätzlich z.B. Tränken, Temperatursensoren und ein Navigationssystem besitzen sowie vom Veterinäramt zugelassen sein. Zudem müssen Fahrtrouten festgelegt, Ruhezeiten eingehalten, die Tiere gefüttert und Fahrtenbücher geführt werden. Lediglich bei rein nationalen Transporten bis zu 12 Stunden von Zucht- und Nutztieren (nicht Schlachttieren) dürfen Fahrzeuge ohne Zulassung des Veterinäramts eingesetzt werden, die zwar mit Lüftung und Tränkeeinrichtungen ausgestattet sein müssen, aber kein Navigationssystem, keine Temperatursensoren und keinen Datenschreiber benötigen.
- Eine **Erzeugererklärung** zur Lebensmittelsicherheit ist Geflügel, Schweinen, Kälbern und Equiden zum Schlachten mitzugeben. Beim Verbringen von Schafen/Ziegen sowie Schweinen sind Begleitdokumente zu erstellen und dem Empfänger (Landwirt) zu übergeben.

Generelle Anforderungen bei Tiertransporten

1. Transportfähigkeit:

- Transportfähig ist ein Tier dann, wenn es selbständig auf das Fahrzeug laufen kann bzw. keine Verletzungen oder sichtbare Erkrankungen hat.
- Als nicht transportfähig gelten insbesondere
 - Muttertiere im letzten Zehntel der Trächtigkeit und bis zum siebten Tag nach der Geburt
 - Neugeborene mit noch unverheilten Nabelwunden
 - Ferkel < 3 Wochen und Lämmer < 1 Woche (wenn über 100 km Transportentfernung)



2. Transportmittel:

- Transportmittel müssen so konstruiert und gebaut sein, dass
 - a) Verletzungen und Leiden der Tiere vermieden werden und ihre Sicherheit gewährleistet ist
 - b) Tiere vor widrigen Wettereinflüssen geschützt sind; d.h. sie müssen stets überdacht sein
 - c) sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind
 - d) eine angemessene und ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist
 - e) Bodenfläche rutschfest und so beschaffen ist, dass möglichst kein Urin oder Kot ausfließt
 - f) ausreichende Licht zur Kontrolle und Pflege der Tiere gewährleistet ist
- Transport von Ferkel < 10 kg, Lämmer < 20 kg und Kälber < 6 Monate nur mit Einstreu o.ä.
- deutlich lesbare und sichtbare Beschilderung der Transportmittel: Verweis auf „lebende Tiere“
- angemessene Ver- und Entladevorrichtung ist mitzuführen

3. Transportpraxis:

Ver- und Entladen

- Anlagen zum Ver- und Entladen von Tieren, einschließlich des Bodenbelags, sind so konstruiert und gebaut und werden so in Stand gehalten und verwendet, dass
 - a) Verletzungen, Leiden, Erregung und Stress während der Tierbewegungen vermieden bzw. auf ein Mindestmaß beschränkt werden und die Sicherheit der Tiere gewährleistet ist; Flächen müssen in jedem Falle rutschfest sein;
 - b) sie leicht gereinigt und desinfiziert werden können.
- Das Gefälle der Rampenanlagen beträgt auf horizontaler Ebene höchstens 20° oder 36,4 % bei Schweinen, Kälbern und Pferden und höchstens 26° 34' oder 50 % bei Schafen und Rindern, ausgenommen Kälber. Beträgt das Gefälle der Rampenanlagen mehr als 10° oder 17,6 %, so sind sie mit einer Vorrichtung, wie z. B. Querlatten, zu versehen, die es den Tieren ermöglicht, risikofrei und ohne Mühen hinauf- oder hinabzusteigen.
- Werden in ein und demselben Transportmittel Tiere zusammen mit anderen Gütern befördert, so sind Letztere so zu verstauen, dass sie den Tieren weder Verletzungen noch Leiden oder Stress zufügen.
- Beim Ver- und Entladen muss eine angemessene Beleuchtung gewährleistet sein.
- Werden Transportbehälter mit Tieren übereinander auf ein Transportmittel verladen, so sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um
 - a) zu vermeiden, dass die Tiere auf den unteren Ebenen von den über ihnen eingestellten Tieren mit Urin und Kot verunreinigt werden, bzw. im Falle von Geflügel, Kaninchen und Pelztieren diese Verunreinigung in Grenzen zu halten;
 - b) die Stabilität der Transportbehälter zu gewährleisten;
 - c) sicherzustellen, dass die Belüftung nicht behindert wird.

Umgang mit Tieren

- Es ist verboten,
 - a) Tiere zu schlagen oder zu treten;
 - b) auf besonders empfindliche Körperteile Druck auszuüben, der für die Tiere unnötige Schmerzen oder Leiden verursacht;
 - c) Tiere mit mechanischen Mitteln, die am Körper befestigt sind, hoch zu winden;
 - d) Tiere an Kopf, Ohren, Hörnern, Beinen, Schwanz oder Fell hoch zu zerren oder zu ziehen oder so zu behandeln, dass ihnen unnötige Schmerzen oder Leiden zugefügt werden;
 - e) Treibhilfen oder andere Geräte mit spitzen Enden zu verwenden;
 - f) Tiere, die durch einen Bereich getrieben oder geführt werden, in denen mit anderen Tieren umgegangen wird, vorsätzlich zu behindern.
- Die Verwendung von Elektroschockgeräten ist möglichst zu vermeiden. Sie dürfen allenfalls bei ausgewachsenen Rindern und bei ausgewachsenen Schweinen eingesetzt werden, die jede Fortbewegung verweigern, und nur unter der Voraussetzung, dass die Tiere genügend Freiraum zur Vorwärtsbewegung haben. Es dürfen nur Stromstöße von maximal einer Sekunde in angemessenen Abständen und nur an den Muskelpartien der Hinterviertel verabreicht werden. Sie dürfen nicht wiederholt werden, wenn das Tier nicht reagiert.



- Tiere dürfen auf keinen Fall an Hörnern, Geweih, Nasenringen oder Beinfesseln angebunden werden. Kälbern darf kein Maulkorb angelegt werden.
- Müssen Tiere angebunden werden, so müssen die Seile, Anbindegurte oder anderen Anbindemittel
 - a) stark genug sein, damit sie unter normalen Transportbedingungen nicht reißen;
 - b) so beschaffen sein, damit sich die Tiere evtl. hinlegen, fressen und trinken können;
 - c) so konzipiert sein, dass sich die Tiere nicht strangulieren oder auf andere Art verletzen und dass sie schnell befreit werden können.

Getrennter Transport (Absondern)

- Mit folgenden Tieren wird getrennt umgegangen und sie werden getrennt transportiert:
 - a) Tiere unterschiedlicher Arten;
 - b) Tiere mit beträchtlichem Größen- oder Altersunterschied;
 - c) ausgewachsene Zuchteber oder Hengste;
 - d) geschlechtsreife männliche Tiere und weibliche Tiere;
 - e) behornete Tiere und unbehornete Tiere;
 - f) rivalisierende Tiere;
 - g) angebundene und nicht angebundene Tiere.
- Die Bestimmungen gemäß Buchstaben a), b), c) und e) gelten nicht, wenn die betreffenden Tiere in verträglichen Gruppen aufgezogen wurden und aneinander gewöhnt sind. Sie gelten ebenfalls nicht, wenn die Trennung den Tieren Stress verursachen würde, oder in Fällen, in denen weibliche Tiere nicht entwöhnte Junge mitführen.

Raumangebote bei Straßentransport für verschiedene Tierarten

Rinder

Bei den Ladedichten nach VO (EG) Nr. 1/2005 (siehe Tabelle) sind je nach Gewicht und Größe der Tiere sowie entsprechend ihrer körperlichen Verfassung, den Witterungsbedingungen und der voraussichtlichen Beförderungsdauer Abweichungen möglich.

Kategorie	Ungefähres Gewicht (kg)	Fläche (m ² /Tier)
Zuchtkälber	50	0,30 - 0,40
Mittelschwere Kälber	110	0,40 - 0,70
Schwere Kälber	200	0,70 - 0,95
Mittelgroße Rinder	325	0,95 - 1,30
Ausgewachsene Rinder	550	1,30 - 1,60
Sehr große Rinder	> 700	> 1,6

Nach TierSchTrV sind bis zu 25 Kälber oder bis zu 6 erwachsene Rinder bei Querverladung oder bis zu 8 erwachsene Rinder beim Transport in der Gruppe durch eine stabile Trennvorrichtung abzutrennen. Die Gruppengröße bei Rindern (> 70 kg LG) kann um bis zu 20 % überschritten werden, soweit Tiere zusammen befördert werden, die mindestens sieben Tage vor Transportbeginn am Versandort als Gruppe gehalten wurden. Geschlechtsreife männliche Rinder dürfen in Gruppen nur befördert werden, wenn die lichte Raumhöhe auf max. 50 cm über dem Widerrist des höchsten Tieres begrenzt ist. Das Mindestalter für Kälber beträgt bei nationalen Transporten generell 14 Tage.

Schweine

Nach VO (EG) Nr. 1/2005 müssen alle Schweine mindestens liegen und in ihrer natürlichen Haltung stehen können. Zur Erfüllung dieser Mindestanforderungen darf die Ladedichte bei Schweinen mit einem Gewicht von ungefähr 100 kg beim Transport 235 kg/m² nicht überschreiten. Rasse, Größe und körperliche Verfassung der Schweine können eine Vergrößerung der hier geforderten Mindestbodenfläche erforderlich machen; diese Mindestbodenfläche kann ferner entsprechend den Witterungsbedingungen und der Beförderungsdauer um bis zu 20 % größer sein.

Präzisierte Anforderungen für innerstaatliche Transporte durch TierSchTrV siehe nebenstehende Tabelle. Den Schweinen darf jedoch nicht mehr als die doppelte Mindestbodenfläche zur Verfügung stehen.



Bis zu 20 Mastschweine oder Zuchtläufer (< 70 kg) bzw. bis zu 15 Mastschweine (> 70 kg) oder bis zu 5 Sauen sind jeweils durch eine stabile Trennvorrichtung abzutrennen. Die Höchstgruppengröße bei Ferkeln liegt bis 10 kg bei 120, bis 25 kg bei 50 und bis 30 kg bei 35.

Die Gruppengröße bei Schweinen (> 70 kg LG) kann um bis zu 20 % überschritten werden, soweit Tiere zusammen befördert werden, die mindestens sieben Tage vor Transportbeginn am Versandort als Gruppe gehalten wurden.

Lebendgewicht bis zu kg je Tier	Mindestfläche (m ² /Tier)	Lebendgewicht bis zu kg je Tier	Mindestfläche (m ² /Tier)
6	0,07	50	0,3
10	0,11	60	0,35
15	0,12	70	0,37
20	0,14	80	0,4
25	0,18	90	0,43
30	0,21	100	0,45
35	0,23	110	0,5
40	0,26	120	0,55
45	0,28	> 120	0,7

Schafe und Ziegen

Bei den in der nebenstehenden Tabelle genannten Bodenflächen nach VO (EG) Nr. 1/2005 sind je nach Rasse, Größe, körperlicher Verfassung und Länge des Fells der Tiere sowie entsprechend den Witterungsbedingungen und der Beförderungsdauer Abweichungen möglich. Bei kleineren Lämmern beispielsweise kann eine Fläche von weniger als 0,2 m² pro Tier vorgesehen werden. Bis zu 50 Schafe und Ziegen sind jeweils durch eine stabile Trennvorrichtung abzutrennen (TierSchTrV).

Kategorie	Ungefähres Gewicht (kg)	Fläche (m ² /Tier)
Geschorene Schafe und Lämmer ab 26 kg	< 55	0,20 - 0,30
	> 55	> 0,30
Ungeschorene Schafe	< 55	0,30 - 0,40
	> 55	> 0,40
Hochträchtige Mutterschafe	< 55	0,40 - 0,50
	> 55	> 0,50
Ziegen	< 35	0,20 - 0,30
	35 - 55	0,30 - 0,40
	> 55	0,40 - 0,75
Hochträchtige Ziegen	< 55	0,40 - 0,50
	> 55	> 0,50

Für weitere Informationen und Einzelauskünfte wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Veterinäramt an der Kreisverwaltungsbehörde.



Verladung vorbereiten: 'Was tun?'

- 1 Als Fahrer, **prüfen Sie** 'Fahrer Checkliste: Sind Sie vorbereitet?'. Bei Zweifeln oder Notfällen tierärztlichen Rat holen
- 2 **Anzahl und Gesundheitszustand** der Rinder feststellen (Größe, Gewicht, Transportfähigkeit), Für die Überprüfung des Gesundheitszustands '[Praxis-Leitfaden zur Bestimmung der Transportfähigkeit von adulten Rindern](#)' verwenden
- 3 **Ladeplan** vorbereiten, dabei beachten: Anzahl, Gewicht, Geschlecht und ob behornt oder unbehornt, geschlechtsreife Tiere getrennt aufstellen und getrennt verladen
- 4 **Seitenklappen** für bessere Belüftung während der Beladung öffnen
- 5 **Laderampe** mit so geringer Steigung wie möglich (max. 36% oder 20° für Kälber; max. 50% oder 26° für adulte Rinder) und möglichst keine Spalten oder Stufen
- 6 Ein **gebogener bzw. verwinkelter** Treibgang (geschlossene Treibgänge, 1,7 m hoch für adulte Rinder) ist vorteilhaft
- 7 **Stroh im Treib- und Ladebereich** hilft gegen Lichtreflektionen und rutschigen Boden
- 8 Der Treibgang muss frei von visuellen oder physischen **Hindernissen** sein
- 9 Die Beladung sollte **ruhig** ablaufen




Alle Tiere sollen zur selben Zeit stehen oder sich ablegen können, 20 cm Raum über der Schulter der Tiere sind nötig für eine optimale Lüftung



Ladedichte

Kategorien	Durchschnittsgewicht	Min. Fläche / Tier (m²)
Kleine Kälber	50	0,30 bis 0,40
Mittlere Kälber	110	0,40 bis 0,70
Schwere Kälber	200	0,70 bis 0,95
Mittlere Rinder	325	0,95 bis 1,30
Schwere Rinder	550	1,30 bis 1,60
Sehr schwere Rinder	>700	> 1,60

Fertig zur Beladung!



ANIMAL TRANSPORT GUIDES


✓ Beladung



1. Rinder mit **angemessener Geschwindigkeit** treiben
2. Rinder **in Gruppen** treiben (5 adulte, 10 – 15 Kälber)
3. **Möglichst wenig** Geräusche, um die Belastung gering zu halten
4. Noch besser ist es **Kälber** mit **individueller** Hilfe zu verladen
5. Das **Gesichtsfeld** der Rinder bedenken: um das Rind vorwärts zu bewegen, halb hinter ihm stehen



beidäugige Sicht reduzierte Sicht
einäugige Sicht Toter Winkel



Was tun wenn die Tiere anhalten und die Fortbewegung verweigern

- Lärm sollte vermieden werden. Nicht Schreien
- Das Tier beruhigen lassen und prüfen ob es transportfähig ist
- Den Weg auf Hindernisse, Reflektionen o.ä. prüfen und ggf. korrigieren. Nicht möglich? Den Tieren Zeit zur Gewöhnung geben und vor der nächsten Verladung die Situation ändern
- Passiv treiben (z.B. mit einem Holz- oder Plastikstock zur Fortbewegung animieren)
- Pfeifen oder Sprechen um die Tiere zu treiben, nicht schlagen!
- Elektrotreiber sollten weitestgehend vermieden werden und nur an adulten Tieren genutzt werden, wenn sie sich nicht anders bewegen lassen (nicht mehr als 1 Sekunde!). Nur an der Außenseite der Hinterhand

✓ Entladen

1. Im Fall von Verzögerungen bei der Entladung, stellen Sie eine gute Durchlüftung des stehenden Fahrzeugs sicher (Lüftungskappen öffnen, Zwangslüftung nutzen im Schatten parken)
2. Die komplette Breite des Treibganges zur Entladung nutzen und den Gang gut ausleuchten
3. Beim Entladen die Gruppengröße an die Buchten des Zielortes anpassen
4. Kranke oder verletzte Tiere bei der Entladung in gesonderte Buchten aufstellen
5. Nutzen Sie die selben passiven Methoden zum Treiben wie bei der Beladung
6. Nach dem Entladen das Fahrzeug waschen und desinfizieren
7. Probleme protokollieren und Fahrtenbuch zurück an die zuständige Behörde. **Noch besser!** Berichte vergangener Transporte für die zukünftige Planung nutzen

Danksagungen: Projekt der EU Kommission (SANCO /2015/G3/SI2.701422), Infoblätter, die in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern aus Konsortium & Fokusgruppen sowie Stakeholdern entwickelt wurden






„Indem ich mich nicht wie ein Raubtier verhalte, gebe ich den Rindern die Chance, sich nicht wie Fluchttiere verhalten zu müssen!“

„Der schnellste Weg, mit Rindern zu arbeiten, ist so langsam wie möglich!“


Wahrnehmung:

- Scharfe binokulare Sicht
- Korrekte Sicht bis zu den Schultern
- Reduzierte Sicht hinter den Schultern
- Blinde Zone hinter dem Tier





Die seitliche Stellung der Augen führt zu einer Blindzone direkt vor dem Kopf und hinter dem Tier




Wenn das Tier ruhig ist, sich von der Seite oder von vorne nähern.

Nie von hinten an ein Tier heran treten!

◆ Blinde Zone

◆ Binokulare Zone



(Abbildungen nach DIMBERTON, 1999)

Ein ängstliches, in Panik geratenes Tier ist gefährlich, weil es vor sich nichts sieht.



- ☐ Rinder sehen Farben (v.a. grün, gelb, blau)
- ☐ **Es wird empfohlen, dezente Kleidung zu tragen,**
z.B. braun, blau und grün
- ☐ Sie sind sehr empfindlich auf die Farbhelligkeit
- ☐ Rinder sehen ab 0.05 Lux; Farbsehen ab 5 Lux

Das Auge des Rindes ist viel sensibler auf blendendes Licht als das Auge des Menschen

Blendende Quellen aus dem Umfeld des Tieres entfernen.

- Pheromonabgabe über Urin, Kot und Haut
- Stress des Menschen? → STRESS STINKT!

Metallische Geräusche, quietschende Töne und laute Schreie von Menschen erhöhen den Stresspegel messbar!



Sehfeld der Kuh:

- 330° Rundumsicht
- Seitliche Augenstellung
- 30° schärferes sehen vorne
- Vorne Überschneidung des Sehfeldes
- 30° blind nach hinten
- Verstärktes Kontrastsehen → Dämmerung Bewegungen, Reflexionen
- Reflektierende Schicht im Auge
- Quer-ovale Pupillen → Horizont scannen
- Verbessertes Nachtsehen
- Lange Adaptation Hell-Dunkel 5x ca. 10 Sek.
- 60 Bilder in der Sek. **Rot -Schwäche** (Mensch ca. 25 Bilder Sek.)
- **Dichromaten Blau-Grün**
- Mensch = Trichromaten
- Fluchttier, ständiges scannen der Umgebung
- Verhalten angeboren, nicht weg zu trainieren

Fazit:



- Melkstand Richtung Stall ausleuchten
- Ställe meist zu dunkel (Kontraste)
- Verladung
- LED OHNE Vorschaltgerät (Wechsel- zu Leitstrom FLACKERN) → Stallbau
- 100-150 Lux nach Sonnenuntergang
- Genug Sonnenlicht tagsüber, dunkle Stallecken = Blindheit
- Erfahrungen und AHA Effekt



Normal



Vertraut



Drohhaltung



Untergeordnet



Fluchthaltung

weidend oder
gehend

kalt (Umgebung),
krank, ängstlich

stierig, bedroht
neugierig

rennend

herumtollen,
ausschlagen,



Angstsignale:


- Nervöse Schwanzbewegung (keine Fliegen)
- Weißes im Auge wird sichtbar
- Kopf hoch
- Vermehrter Kotabsatz
- Hautzittern und verstärkte Atmung
- Ohren zur Angstquelle gerichtet

Angst → Stresshormone → senken Immunfunktionen → Tiere werden schneller krank



Haarwirbel über
Augenlinie = schreckhaft

*Studie mit über 1000 Rindern,
Bewertung im
Behandlungsstand, T. Grandin*



Haarwirbel linienförmig, nicht
spiralförmig = höherer Anteil
defekter Spermien



Haarwirbel unter
Augenlinie = ruhig




BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



Gruppenposition





- Dominante Tiere in Problemsituationen innen
- sozial schwache Tiere werden nach Aussen gestossen.



Reaktionsräume beim Rind



Wahrnehmungszone:


- Wahrnehmung durch die Rinder

Bewegungszone:

- Reaktion der Tiere durch Bewegung

Panikzone:

- Flucht, Angriff
- keine Kontrolle durch den Tierbetreuer!




Bewegen der Rinder immer am Rande der Bewegungszone!

Rinder reagieren auf leichten Druck indem sie ausweichen.

Wenn sich die Rinder bewegen Druck wegnehmen → Belohnung für die Rinder!





Bei Betreten der Panikzone keine Kontrolle über das Tier!



Reaktion der Tiere abhängig von:

- Position der Druckrichtung zum Balancepunkt
- Geschwindigkeit
- Winkel
- Umfeld (Tiere, Hindernisse, ...)

Niemals einem Rind direkt von hinten annähern!
Tiere können erschrecken weil sie den Bereich nicht
einsehen können.




Druck vor dem Balancepunkt in
Richtung des Tieres



Druck hinter dem Balancepunkt
in Richtung des Tieres

**Rinder gehen immer dort hin
wohin sie sehen!**




- **Vorsicht nicht zu viel Druck**
- **Bewegung kann auch geradlinig erfolgen**

Ausreißer ignorieren!








Anstatt dem Einsatz von Gewalt sollten wir den Tieren die jeweilige Situation so gestalten, dass sie die von uns gewünschte Bewegung als natürliche Reaktion auf unsere Handlungen von sich aus wollen.






Knoten und Halfter






- 1 Eine grosse Schlaufe formen und hinter die Ohren legen. Das Seilauge liegt auf der mir gegenüberliegenden Kopfseite unter dem Auge



- 2 Das Seilende durchs Maul ziehen (oder unter den Kiefer für ein „normales“ Halfter)



- 3 Das Seilende auf der Arbeitsseite durch die grosse Schlaufe um den Kopf ziehen



- 4 Fertiges Halfter.
Achtung: Das Seil muss **UNTER** dem Auge liegen und nicht **IM** Auge!



Tischsitten erlernt mensch meist im Elternhaus (oder auch nicht). Verkehrsregeln werden uns in der Schule und später in der Fahrschule beigebracht. Ob dir das bereits Erlernte auf der Alp weiter hilft, sei dahin gestellt. Als praxisnahe Alternative habe ich einige Benimm-Regeln für den Umgang mit Rindviechern zusammengestellt.

Der Kuh-Knigge

von Jörg Bäurle

Dein äusseres Auftreten

Kleide dich korrekt

Leuchtende, grelle Farben beunruhigen viele Tiere. Trage sie deshalb nicht, wenn du dich in Gesellschaft von Rindern begibst. Für deine eigene Sicherheit ist festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle und Stahlkappe angebracht.

Wähle ein dezentes Parfüm aus

Rinder stehen nicht auf Chanel N°5 oder den synthetischen Frühjahrsduft von Weichspülern. Sie erkennen dich gut an deinem natürlichen menschlichen Geruch und schätzen es, wenn er durch dezenten Stallduft unterlegt ist.

Vergiss deinen Stock nicht

Tiere, die Stöcke nur als Prügelinstrument kennen, zucken zusammen, wenn sie mit einem Stock berührt werden oder kneifen die Augen zu, wenn er sich ihrem Kopf nähert. Dir dient der Stock jedoch nicht als Waffe. Du benutzt ihn, um die Gesten deiner Arme zu verstärken, um ein Tier in eine gewünschte Richtung zu dirigieren oder um ihm deinen Sicherheitsabstand aufzuzeigen. Auch bereits negativ geprägte Tiere lernen meist schnell, dass dein Stock keine Bedrohung darstellt, wenn du ihn entsprechend einsetzt.

Bewege dich rubig und sicher

Die Rinder erkennen deine Führungsqualitäten schon daran, wie du dich bewegst. Dass die Arbeit mit Tieren einen ruhigen ausgeglichenen Charakter erfordert, hört man immer wieder als notwendige Voraussetzung für TierhalterInnen und ÄlplerInnen. Das ist richtig und trotzdem

realitätsfremd. Auch jähzornige oder unsichere, ängstliche Menschen arbeiten mit Tieren. Wie gut das klappt, hängt vor allem davon ab, wie weit du deine Schwächen kennst und korrigieren kannst. Als Jähzorniger wirst du dir öfter mal eine Beruhigungspause nehmen müssen, um Tiere nicht durch, für sie unverständliche, Wutausbrüche zu verängstigen. Unsichere Menschen werden auch von Rindern nicht für «voll» genommen und müssen deshalb an ihrem Durchsetzungsvermögen arbeiten.

Überschätze dich nicht

Häufig passieren Unfälle, weil sich mit einer gewissen Routine im Umgang mit Rindern die Überheblichkeit und mangelnde Aufmerksamkeit einschleichen.

Beispiel 1: Auch ein zahmer Stier kann sehr ungehalten werden, wenn du ihm freundschaftlich auf's Hinterteil klopfst, während er eine stierige Kuh umwirbt.

Beispiel 2: Verletzungen durch Horn- oder Kopfstösse beim Anbinden von Milchkühen im Stall sind keine Seltenheit. Sehr selten steckt ein gezielter Angriff auf den Menschen dahinter. Meist weicht das Tier einem Kopfstoss der Nachbarin aus oder will durch Kopfschütteln die lästigen Fliegen loswerden. Mensch bemerkt das oft zu spät, wenn er nicht mit wachen Sinnen bei der Sache ist.

Vermeide Kräftemessen

Das Tier bleibt mit Sicherheit Sieger! Erst einige blaue Flecken haben mich überzeugt, dass sich selbst ein Kalb nicht so einfach am Schellenriemen festhalten lässt.

Die Kommunikation

zwischen Mensch und Rind

Sprich ein Tier an, wenn du dich näherst

Das gebietet nicht die Höflichkeit, sondern es geht darum, es nicht zu erschrecken. Durch ruhiges Zureden lässt sich ein nervöses, ängstliches Tier beruhigen.

Widme dem Tier die ganze Aufmerksamkeit

Nur so kannst du erkennen, was das Tier tun wird und entsprechend darauf reagieren. Beispiel: Ein Tier soll in einen Stall getrieben werden, den es nicht kennt. Dabei sind mehrere Reaktionen des Tieres möglich:

- Nach vorne gestreckte Schnauze, gestellte Ohren (die Neugier überwiegt). Günstige Voraussetzung zum Locken oder um es mit sanftem Druck weiter zu bewegen, sobald es einen nächsten Schritt in Richtung Stalltüre macht.
- Reges Ohrenspiel, unruhige Kopfbewegungen, suchender Blick (das Tier hat Angst und sucht einen Fluchtweg). Zügiges Handeln erforderlich, um ihm keine Zeit zum Überlegen zu geben, Fluchtwege abschneiden und trotzdem eine gewisse Distanz einhalten, um es nicht zusätzlich zu ängstigen. Voraussetzendes Handeln beeindruckt ein Tier.
- Gesenkter, herangezogener Kopf, angelegte Ohren, angespannte Körperhaltung (Abwehrhaltung. Ein ansonsten zahmes Tier wird sich dann auch mit Gewalt nicht überzeugen lassen, sich vorwärts zu bewegen, ein scheues Tier wehrt sich möglicherweise durch einen Angriff). Distanz zum Tier vergrössern und beruhigen, bis es sich sichtbar entspannt.

Achte auf deine Körpersprache

Mehr oder weniger bewusst setzt du sie immer beim Umgang mit Tieren ein. Beobachte dich selbst einmal: Um ein Tier an der Flucht zu hindern oder in eine gewünschte Richtung zu treiben, breitest du die Arme aus und machst dich möglichst gross. Willst du das Vertrauen eines Tieres gewinnen, redest du ruhig mit ihm, lässt die Schultern etwas sinken und streckst

ihm eine Hand entgegen. Das alles geschieht fast reflexartig. Oft verrät dich deine Körpersprache auch. Mir war lange nicht klar, warum zahme Tiere einige Meter bevor ich sie erreicht hatte, plötzlich losgelaufen sind, wenn ich sie auf der Weide behandeln wollte. Bei meinen täglichen Kontrollgängen liessen sie sich streicheln und ich hatte mich doch jetzt genau so verhalten wie sonst auch. Zumindest glaubte ich das. Bei bevorstehenden Behandlungen war ich jedoch immer etwas nervös und angespannt. Das bemerkten die Tiere an meinem Schritt und meiner Körperhaltung. Verraten hat mich wohl auch der Blick, mit dem ich ein Tier in dieser Situation fixierte. Während der Kontrollgänge liess ich meine Augen mehr schweifen und richtete meinen Blick eher auf die Beine als auf den Kopf des Tieres. Tiere nehmen solche Veränderungen schneller wahr. Als ich das erkannt hatte, fiel es mir leichter, mich entsprechend zu verhalten.

Der Amerikaner Monty Roberts, bekannt als «Pferdeflüsterer», hat die Körpersprache von Pferden beobachtet, erlernt und publik gemacht. Mit dieser Methode, die auf dem Hierarchie-Prinzip in der Herde basiert, gelingt es ihm, ein Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Pferd aufzubauen. Dass dieses System auch auf Rinder übertragbar ist, hat der Schweizer Mutterkuhhalter Armon Fliri herausgefunden. Vorführungen und Kurse über «Die sanfte Methode der Halfterzähmung» werden inzwischen an landwirtschaftlichen Schulen und vom Schweizer Verband der Ammen- und Mutterkuhhalter SVAMH angeboten. Eine umfassende Erläuterung dieser Methode ist in diesem Rahmen nicht möglich. Interessant und hilfreich ist es trotzdem, sich einmal mit der Körpersprache von Rindern zu befassen und sie selbst anzuwenden.

Nimm es nicht persönlich

Kälber klettern nicht an den steilsten gefährlichen Stellen herum, und «Rösl» hält sich nicht abseits der Herde, um dich zu ärgern. Viele Ver-



haltensweisen lassen sich erklären wenn du das natürliche Verhalten und die Bedürfnisse von Rindern kennst. Meist lässt sich dann eine Lösung des Problems finden, die mensch- und tiergerecht ist.

Gezielte Ursachenforschung solltest du betreiben, wenn du z.B. beim Melken ständig Kuh-schwänze ins Gesicht bekommst, während deine KollegIn unbelästigt melken kann, oder ein Tier immer zusammenzuckt wenn du dich ihm näherst. Vielleicht gibt es dafür einen Grund in deinem Verhalten den Tieren gegenüber oder in deinem Melkstil. Ein Grund, verärgert oder beleidigt zu sein, ist es trotzdem nicht.

Diplomatie im Umgang mit Rindvieh

Wähle nicht den kürzesten, sondern den besten Weg zum Ziel

Führst du ein Tier geradewegs auf einen geöffneten Klauenstand zu, wird es meistens vorher abbremsen. Deshalb führst du es von vorne am Stand vorbei und gehst ums hintere Eck mit ihm in den Stand. Das Tier steht dann schon mit den Vorderfüssen drin, bevor es richtig begreift, was los ist. Den Halfterstrick kannst du so auch leichter am Stand umlenken oder festbinden. Das «Ums Eck-Prinzip» bewährt sich auch beim Eintreiben in einen Stall oder beim Einfang. Ragt die Verladerampe eines Transportfahrzeugs in einen Stall oder Einfang hinein, wird sie von den Tieren ungern betreten. Selbst dann nicht, wenn sie mit einer vertrauten Einstreu bedeckt ist. Befindet sie sich aber ausserhalb des Raums erweckt sie die Neugier der Tiere.

Wer gut schmiert, fährt gut

Nutze die Fresslust der Tiere, setze Salz, Brot, o.ä. als Lockmittel und positive Verstärker ein.

Lenke von deiner Person ab, bevor du dich webren musst

Ein angreifendes Tier kannst du durch das Wegwerfen eines Gegenstandes (z.B. ein Taschentuch) kurzzeitig ablenken, um Zeit zur Flucht zu gewinnen.

Annäherung von Mensch an Rind

Übe dich in Zusammenarbeit

Arbeite für Behandlungen mit einer zweiten Person zusammen. Viele Situationen können nur so sicher gemeistert werden.

Achte auf die richtige Gesellschaft deiner Tiere

Isoliere wenn möglich ein Tier für eine Behandlung nicht von seinen Artgenossen. Der Sichtkontakt zu ihnen wirkt beruhigend. Wenn du ein Tier zum Stall oder Einfang treiben willst, nimmst du die ganze «Bezugsgruppe» des Ziel-tieres mit. Muss es auf die Krankenweide darf seine Freundin oder sein Kumpel es begleiten.

Achte auf das passende Ambiente

Um die Tiere nicht zu beunruhigen, wirst du sie mit möglichst wenig neuen Eindrücken konfrontieren. Ein während des ganzen Sommers nach zwei Seiten geöffneter Einfang, durch den sich die Tiere frei bewegen können, ist etwas Vertrautes für sie.

Bleibe auf der sicheren Seite

Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung gibt es. Technische Einrichtungen um Tiere zu fixieren und zu behandeln, wie Gitterelement-Systeme für Einfang und Treibgang, Klauenstand und Selbstfanggitter sind auf dem Markt. Wird mehr als nur Tierkontrolle von dir verlangt, solltest du darauf bestehen, dass dir geeignete Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

Improviere professionell

Da Theorie und Praxis oft weit auseinander klaffen, folgen noch einige Tipps für das Einfangen scheuer Tiere in Ställen oder Gattern, die nicht mit Fangvorrichtungen ausgerüstet sind. Die Minimal-Ausrüstung dafür sind ein Hütestecken und zwei 6 Meter lange Seile, die an einem Ende ein «Auge» (kleine gespleiste oder genähte Schlinge) haben. Im Idealfall ist das Fangseil mit einem Verschluss der sich unter Belastung öffnen lässt (Panikhaken) ausgerüstet. Mit diesem Seil bildest du eine Schlinge,



die du so über den Stock legst, dass du sie dem Tier über den Kopf streifen kannst (s. Abb.). Ist das gelungen, ziehe möglichst nicht am Seil und warte, bis sich das Tier etwas beruhigt hat. Als Umlenkpunkt für das Seil eignet sich ein stabiler Pfosten oder ein Anbindering. Ziehe das Tier nicht gewaltsam an diesen Punkt heran, sondern treibe es mit ruhigen Gesten dort hin. Versuchst du nun das Seil an dem Umlenkpunkt festzuknoten, wird das Tier zurückschrecken, weil du ihm zu nahe trittst. Befestige deshalb das Seil mit einem Knoten, der sich jederzeit von deinem Standort aus wieder lösen lässt (siehe «Knotologie» Seite 326). Das Tier ist nun vorläufig fixiert und du kannst weitere Schritte unternehmen, um es mit einem Halfter anzubinden. Zur Herstellung eines Achterhalfters oder eines anderen Halftersystems benötigst du das zweite Seil (siehe «Knotologie»). Binde nie ein Tier, das möglicherweise noch nie in seinem Leben angebunden war, an eine Kette und panisch darauf reagieren kann. Einen Strick kannst du notfalls durchschneiden. Sobald das Tier deine Nähe und Berührung duldet, stelle dich mit dem Gesäss an die Tierschulter. Du stehst dann mit dem Rücken zum Tier

und drehst nur den Oberkörper in Richtung Tierkopf. So spürst du die Bewegungen des Tieres und ein Schritt nach vorne bringt dich jederzeit aus dem Gefahrenbereich. Du verminderst die Stosskraft eines Tiers, wenn seine (Hals-) Wirbelsäule seitlich gekrümmt ist. Für eine Behandlung bindest du es entsprechend an.

Ein Rind schlägt nicht mehr aus, wenn du seinen Schwanz mit beiden Händen senkrecht in die Höhe drückst. Eine zweite Person kann dann z.B. eine Euterbehandlung durchführen. Musst du ein nervöses Tier am Halfter führen, gelingt das oft besser mit einer gut befestigten Augenbinde (z.B. ein Pullover).

Der Griff in die Nasenlöcher oder die Verwendung einer Nasenzange sieht brutal aus, hat aber eher einen beruhigenden Effekt, weil dadurch beim Tier Endorphin (körpereigener Ei-weissstoff mit schmerzstillender Wirkung) ausgeschüttet wird.

Willst du Medikamente eingeben, löst du Schluckbewegungen beim Rind aus, indem du ihm einen Finger seitlich ins Maul steckst (zahnloser Kieferbereich zwischen Schneide- und Backenzähnen), um damit leicht reibend den Gaumen zu massieren.

Stellst du beim Umgang mit Rindern fest, dass nicht alles so funktioniert, wie du es gelesen hast, liegt das eventuell daran, dass

- a) ich auch noch nicht alles weiss, was man zu diesem Thema wissen könnte
- b) Rinder keine Maschinen sind, die nach einer Gebrauchsanleitung funktionieren
- c) du so die Möglichkeit hast, dazu zu lernen.

- Quellen**
- Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL), Heft «Tierhaltung»
 - Gespräch und Kursunterlagen von Denis Fuchs, Besamer und «Kuhflüsterer» aus dem Elsass
 - «Hilfe, die Wilden kommen!», zalp 14/2003, Artikel von Regula Wehrli
 - Demonstration und Gespräch mit Armon Fliri (Landwirt ZH) und Carl Brandenburger (LBBZ Plantahof, Landquart)



Ratgeber: So ticken Kühe – zehn Tipps für Sicherheit im Rinderbetrieb

Wer weiß, wie Rinder sich verhalten, kann das im Umgang mit den Tieren berücksichtigen und das Unfallrisiko erheblich reduzieren.

In der [Rinderhaltung](#) gab es Jahr 2019 über 7.000 meldepflichtige Unfälle. Einige davon waren tödlich. Viele kritische Situationen im Stall oder auf der Weide kann man vermeiden, wenn man weiß, wie sich [Rinder](#) verhalten und dieses Wissen im Umgang mit den Tieren einsetzt. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ([SVLFG](#)) gibt einige Tipps, um das [Unfall](#)risiko in der [Rinderhaltung](#) zu senken.

1. Ruhe ausstrahlen

Die Basis für ein erfolgreiches Management in der Milchvieh- und [Rinderhaltung](#) ist der Umgang mit den Tieren. Ruhe ist die erste Tierhalter-Pflicht. Stress beim Tierhalter überträgt sich schnell auf das Tier. Sie sollten ruhig mit den Tieren zu arbeiten und hektische Bewegungen, Schlagen oder Zeitdruck vermeiden.

Körperkontakt und die Berührung spezieller Punkte am Körper können beruhigend wirken. Das sind beispielsweise die Haarwirbel auf der Wirbelsäule, die Augenlider sowie die Ohrwurzel.

2. Druck gezielt einsetzen

Kühe benötigen allerdings auch eine klare Ansage. Durch den gezielten Aufbau und Entzug von Druck können Sie die Tiere lenken. Angst ist dabei ein schlechter Ratgeber, aber Respekt ist notwendig.

Folgende Grundregeln sollten Sie beachten:

- Rinder wollen sehen, wer sie treibt.
- Sie wollen in die Richtung gehen, in die sie schauen.
- Auf jede Bewegung des Menschen folgt eine Bewegung des Tieres.
- Rinder haben meist wenig Geduld und können sich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren.

Bei der Betrachtung des Rindes als Fluchttier hilft ein „Zonenkonzept“. Je nachdem, in welcher Zone man sich befindet, wie weit und aus welcher Richtung man sich dem Tier nähert, kann man es in eine gewünschte Richtung treiben, drehen oder bremsen. Die Zonen sind allerdings bei jedem Tier anders: Eine Aktion kann die eine Kuh mit drei Metern Abstand noch gar nicht interessieren, während sie bei einer anderen Kuh schon zur Flucht führt.

3. Für geregelte tägliche Abläufe sorgen

Tägliche Abläufe sollten möglichst konstant sein. Das entspannt die Tiere und ermöglicht sicheres Arbeiten. „Gute Langeweile ist das Beste für jede Kuh!“, so Manfred Eggers von der [SVLFG](#).



4. Die Sinneswahrnehmungen von Rindern verstehen, um Gefahrenquellen einzuschätzen

Wie sehen Rinder?

- Durch die seitliche Anordnung ihrer Augen haben Rinder einen sehr engen Sichtwinkel.
- Sie können nur zehn Meter weit klar sehen. Allerdings nehmen sie noch über eine Entfernung von sechs Metern eine Handbewegung von nur einem Millimeter wahr.
- Sie sehen keine fließenden Bewegungen, sondern nur einzelne Bildfolgen. Daher lösen hektische Armbewegungen leicht Stress oder Angst aus.
- Die Hell-Dunkel-Anpassung dauert bei Rindern fünfmal länger als beim Menschen. Daher sollten Treibgänge immer gut ausgeleuchtet sein.

Wie hören Rinder?

- Rinder können Geräusche lokalisieren.
- Sie sind empfindlich gegenüber lauten, schrillen und quietschenden Geräuschen.
- Sie können Geräusche unterscheiden und bekannte Töne und Stimmen identifizieren und einordnen.
- Beim Herantreten an die Rinder sollte man sich mit ruhiger Stimme bemerkbar machen.

Wie riechen Rinder?

- Rinder haben einen ausgeprägten Geruchssinn.
- Sie erkennen ihren Tierhalter oder andere Personen am Geruch.
- Auf unbekannte Gerüche reagieren sie sensibel.
- Ausscheidungen enthalten „Botenstoffe“ und können zu Ablehnungs- und Fluchtreaktionen führen. Des Weiteren können chemische Signale Herdenmitglieder warnen, zum Beispiel im Klauenpflegestand.

5. Aufmerksam bleiben und nicht allein arbeiten

Nicht immer gelingt ein entspannter Umgang mit den Rindern. Daher müssen Sie die Tiere genau beobachten und sich aufmerksam durch die Herde bewegen. Machen Sie sich bewusst: Alles, was Tierhalter wollen, ist ein Störfaktor für die Vierbeiner – Ohrmarken einziehen, Klauenpflege, impfen und verladen. Es sollten immer mehrere Personen anwesend sein.

Bei freilaufenden Deckbullen sollten Sie bereits auf erste Anzeichen von Imponiergehabe oder Aggressionen reagieren und sie gegebenenfalls frühzeitig aussortieren.

6. Fluchtmöglichkeiten schaffen

Im Stall können Sie durch Lücken im Fressgitter oder Aussparungen in Trennwänden Fluchtmöglichkeiten vor angreifenden Tieren schaffen. Diese müssen so gestaltet sein, dass Sie den Gefahrenbereich ohne Aufwand sofort sicher verlassen können. Auch auf der Weide sind „Fluchtinseln“ wie Trecker, Futterraufen oder Baumgruppen wichtig.



7. Tiere fixieren

Jedes Tier muss jährlich fünf bis sieben Mal fixiert werden, um Behandlungen durchzuführen, Ohrmarken nachzuziehen oder Impfungen aufzufrischen. Das betrifft nicht nur den Tierhalter, sondern auch Tierarzt, Besamungstechniker und Klauenpfleger.--> [Sicherheit](#)**sfangfressgitter**

Sie gehören zu den wichtigsten Sicherheitseinrichtungen im Milchviehbetrieb, vor allem bei Gruppenbehandlungen. Sie ermöglichen es, die ganze oder zumindest einen Teil der Herde auf einen Schlag zu fixieren. Das reduziert den Stress und Unfallgefahr bei der Behandlung für Mensch und Tier. Bei Arbeiten am Kopf sollte dieser zusätzlich mit einer Kopfstütze fixiert werden, die man am Fangfressgitter einhängt.

Fixiereinrichtungen

Die [SVLFG](#) empfiehlt die Anschaffung eines Behandlungsstandes oder eine am Behandlungsstand angebrachte Behandlungsgrube.

Gerade in Abkalbe- und Behandlungsboxen sollten Fixiereinrichtungen vorhanden sein. Besonders gut eignet sich die Kombination von Schwenkgatter mit Halsfangrahmen. Mit dem Schwenkgatter kann man einen trichterförmigen Gang bilden, damit das [Rind](#) nicht kurz vor dem Fixieren wieder abdreht. Der Halsfangrahmen kann durch einen Seilzug von hinten verriegelt werden und ist weit nach unten geöffnet, sodass sich das Tier gefahrlos ablegen kann, beispielsweise bei der Geburtshilfe.

8. Treibgänge richtig gestalten

- Wege müssen so gestaltet sein, dass sich die Kuh im Treibgang nicht drehen und flüchten kann.
- Treibgänge sollten möglichst nicht in einen 90°-Winkel abbiegen.
- Absperrungen müssen blickdicht sein.
- Klirrende Ketten, ungünstiger Schattenschlag oder grelles Gegenlicht können Rinder irritieren.
- Nur griffige Laufbereiche sind sicher für Mensch und Tier.

9. Enthornung

Hornstöße von Rindern können sehr schwere Verletzungen verursachen. Der erste Beitrag zur Unfallverhütung ist daher schon kurz nach der Geburt des Kalbes die Enthornung. Wichtig ist es, die Enthornung durch Beruhigen (Sedation) und Schmerzmittel so schonend wie möglich zu gestalten. Das vermindert zudem die Gefahr, dass das Kalb unkontrolliert ausschlägt und den Tierbetreuer verletzt.

10. Sicherheit im Melkstand

- Beim Umgang mit Kühen gehören Fußstritte beim Melken zu den häufigsten Verletzungsursachen für Hände und Arme. Freitragende Melkstandgerüste wirken dem entgegen.
- Die Treppenzugänge zum Melkstand sollten nicht zu steil, zu eng oder zu rutschig sein. Ebenerdige Zugänge haben Vorteile.
- Wichtig sind rutschhemmende Bodenbeläge.
- Bei Roboterbetrieben empfiehlt sich zur Euterkontrolle nach dem Abkalben und für Behandlungen bei Euterentzündungen oder Trockenstellen eine Behandlungsgrube, damit ein Euterzugang aus einer ergonomisch günstigen Körperhaltung möglich ist.