

The background image shows a rural landscape with a green field in the foreground, a line of trees and a small building in the middle ground, and mountains in the distance under a clear blue sky.

Moorbodenverträgliche Landwirtschaft -alternativlos?!-

Raphaela Blacek, AELF Weilheim

Gliederung

- Moor, Torf, Entstehung
- Moore im Amtsgebiet
- Ibalis
- Klimaschutz
- Endlichkeit der Böden
- Wasserregulation
- Moorbauernprogramm
 - Nassgrünland
 - Beweidung
 - Paludikultur, Vermarktung
 - Maschinen



Was ist Moor ?

- Dauernd vernässte Feuchtgebiete
- Übergang zwischen Land und Wasser
- Dauernder Wasserüberschuss (Regen oder Grundwasser)
- Bilden durch unvollständige Zersetzung (durch Luftabschluss) Torfböden aus
- Organischer Boden
- Entstanden nach der letzten Eiszeit (vor 12.000 Jahren)



Aufbau Moorboden



Als organischen Boden bezeichnet man Böden mit einem Anteil **organischen Materials** von mind. **15 % = Anmoor** bzw. mind. **30 % = Hochmoor und Niedermoor**.

Organischer Boden (vereinfacht Moor) enthält **Torf**.

Bilder: Thünen-Institut, Bodenzustandserhebung Landwirtschaft

Was ist Torf ?

- Torf ist ein **organisches Sediment** aus **Pflanzenrückständen**, wie zum Beispiel Moosen, Seggen oder Schilf.
- Torf entsteht aus **nicht oder unvollständig zersetztem Pflanzenmaterial**, er kann bis zu **12 000 Jahre alt** sein.
- Die Zersetzung der Pflanzenmaterialien ist durch den **Luftabschluss** durch Wassersättigung extrem gehemmt.
- Torf bildet sich **sehr langsam** (etwa 1 mm pro Jahr).
- Bei der Torf-Entstehung wird **Kohlenstoff** langfristig gespeichert, also CO₂ aus der Atmosphäre entzogen.
- Torf wird seit Jahrhunderten abgebaut und als **Energieträger** in Kraftwerken, Hausheizungen oder Erde im Blumentopf/**Gartenbau**/Gemüseanbau verwendet.




Foto: Ella Papp



Foto: Matthias Drösler

Wie entsteht ein Moor ?


Moore werden aus Torf gebildet. Im Laufe der Zeit entstehen sie in Bereichen mit seichtem Wasser, wobei die Seen im Laufe der Zeit sich mit **Nährstoffen anreichern** und durch die **abgestorbenen Pflanzenreste** verlanden.
=> Moore entstehen bei Wasserüberschuss



Grafik erstellt durch das PSC (2023)

Moortypen

Man unterscheidet zwischen zwei **Moortypen**:



- Zufuhr von Wasser und Nährstoffen überwiegend durch den Regen
- nur sehr wenige Mineralstoffe – kein Kalk
- sehr sauer (pH 3,5 - 4,5)
- weniger ertragreich



- zuerst entsteht ein nährstoffreiches Niedermoor
- intakt vom Grundwasser gespeist
- sie weisen einen höheren Kalkgehalt auf
- weniger sauer bis neutral (pH 4.5 - 7)
- im Prinzip fruchtbar

- offenes Wasser
- Grundwasser
- Regenwasser (Moorwasserstand)
- mineralischer Untergrund
- Mudden (Seeschlamm)
- Niedermooertorf
- Übergangsmoortorf
- Hochmoortorf


Grafik erstellt durch das PSC (2023)



Lage der Moore in Bayern

In Bayern gibt es ca. 228 000 Hektar* Moorböden.
Im Amtsgebiet Weilheim: 27 308 ha


Moortyp	Anteil ca. [%]
Anmoor	48
Hochmoor	11
Niedermoor	41
Gesamt	100




➔ Etwa 95 % der Moore wurden in Bayern vor allem für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung entwässert.

*Moorbodenkulisse (Basis GLÖZ 2) Stand 2023; Karte editiert nach M. Kraut (PSC), auf Grundlage der LfU-Daten, 2018

Lage der Moore im Amtsgebiet – Ausschnitt



Moorboden im Amtsgebiet



iBALIS- Serviceportal StMELF zur Abwicklung von Fördermaßnahmen

The screenshot displays the iBALIS-Serviceportal StMELF interface. On the left, a 'Legende' (Legend) panel is visible, featuring a green header and two icons: a pencil and an eye. A green arrow points to the pencil icon. Below the legend, a dropdown menu labeled 'Ebene hinzufügen' (Add layer) is shown. The main map area displays a satellite view with red outlines indicating specific areas. On the right, a 'Flurkarte' (Map of parcels) panel is visible, showing a list of layers with checkboxes. A green arrow points to the 'Ebene hinzufügen' dropdown menu. Below the map, a 'Speichern' (Save) button is highlighted with a green arrow.

Legende

Ebene hinzufügen

Aktuell gewählte Ebenen

FeKa Bayern

- ☒ Feldstücke
- ☐ LE
- ☐ DG-Einsatz
- ☐ VWK
- ☐ VWK 2023

Flurkarte

- ☒ DFK
- ☐ ALE-DFK

Verwaltung

- ☒ Gemeinde

Gebietskulissen

- ☐ Natura 2000 - FFH
- ☒ Moorbodenkulisse (GLÖZ 2)
- ☐ Förderkulisse FFH
- ☐ Biotop
- ☐ Natura 2000 - SPA
- ☐ Bodenschätzung
- ☐ VNP-Kulisse
- ☐ Benachteiligte Gebiete (ab 2019)

Ebenenwahl

Nachfolgend sehen Sie die aktuell in der Legende dargestellten Ebenen. Sichtbare Ebenen sind mit einem Haken versehen, momentan abgewählte Ebenen sind ohne Haken. Mittels der Mülltonne werden Ebenen aus der Legende entfernt, über „Ebene hinzufügen“ werden Ebenen in die Legende hinzugefügt.

Ebene hinzufügen

Speichern

Bedeutung der Moore

- Lebensraum für viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten

- Z.B. Sonnentau



- Wollgras



- Torfmoos



- Kreuzotter



- Langzeitspeicher Kohlenstoff, Klimawandel


- Regulator Wasser- und Nährstoffhaushalt (Hochwasserschutz)

- Erholungs,-Rückzugs- und Erlebensraum


- Archive der Natur- und Kulturgeschichte



Schwamm statt Flut



Landnutzung der Moorstandorte in Bayern




Verschnitt Moorbodenkulisse (Basis GLÖZ 2) mit „Tatsächliche Nutzung“ (Bayerische Vermessungsverwaltung, <https://geodaten.bayern.de/opengeodata/>, Lizenz CC BY 4.0), Stand 2023



Treibhausgasemissionen aus organischen Böden in Bayern

Gesamtbilanz Bayern




Moore machen **6 %** der **THG-Emissionen in Bayern** aus.

Mind. 5,1 Mio. t CO₂-Äquivalent pro Jahr Emissionen



Moore sind damit die größte Einzelquelle außerhalb des Energiesektors.

Landwirtschaftssektor Bayern



Landwirtschaftliche Moornutzung macht **22 %** der gesamten landwirtschaftlichen THG-Emissionen in Bayern aus.




Obwohl nur **4%** der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf organischen Böden liegt



Entwässerte Moore machen einen bedeutenden Teil der CO₂-Emissionen in der Landwirtschaft aus und bieten damit **großes Einsparungspotenzial auf kleiner Fläche.**

StMUV Klimabericht 2022, Daten des Thünen-Instituts für den Nationalen Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar

Mittlere Emissionen in Abhängigkeit von Landnutzung und Wasserstand




Einsparpotenzial bei Umwandlung von Acker in Paludikultur 53 to CO₂ Äquivalente/ha/Jahr

CO₂ - Rechner

- Mobilität, Wohnsituation, Ernährung...
- Auto? Kraftstoffart, Verbrauch, Kilometer
- ÖPNV, Flugreisen
- Wohnung Größe, Personen
- Ernährung, Vegan, Fleisch...
- Stromverbrauch, Ökostrom ...
- Heizung, Gas, Öl, Holz
- Durchschnitt: 11 to/Person
- Link: https://www.sauberenergie.de/wissen/co2-rechner?msclkid=040384bbf09b17cc952eec22062043b4&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=60-Aktionen&utm_term=co2%20rechner&utm_content=Aktionen%20CO2%20Klimahandeln




Treibhausgasflüsse in Mooren



Grafik erstellt durch das PSC (2023)

Mooremissionskarte

- Ausschnitt Landkreis Weilheim-Schongau -



Legende

[t CO₂-Äquivalente/ha/Jahr]



Klatt, J. et al. (2023). Abschlussbericht Klimaschutz- und Anpassungspotenziale in Mooren Bayerns (KliMoBay). DOI 10.5281/zenodo.10202686


Datengrundlage:
Moorbodenkarte
Flurabstandskarte
Landnutzung




Endlichkeit der landwirtschaftlichen Moornutzung

Durch Entwässerung kommt es zu **Torfschwund**. Dies führt zu zwei möglichen Szenarien:

Das **Grundwasser** wird erreicht (**Überschreitung kritischer Grundwasserflurabstände**) und die bisherige trockene Bewirtschaftung wird nicht mehr möglich sein:



Vollständiger Verlust des Torfkörpers und **Erreichen des unfruchtbaren, mineralischen Untergrunds**
z. B. Kies, Seeton, z. T. Almkalk



Abschätzung der Endlichkeit über **Torfsackungsraten**.

Drainagen im Moor



Photos: Blacek, R. 2025

Moorpegel bayerisches Donaumoos



Blacek, 2025

Moorpegel im Donaumoos
Moorschwund: 3 m seit 1836 !!!!!
⇒ 1,5 cm pro Jahr

Drei Gründe:

- Sackung durch Entwässerung (2m)
- Torfabbau (1m)
- Winderosion nach Trockenheit, Ackerbauregion

Bodenschwund, auch vor Ort



Stadl in Benediktbeuern
Baujahr 1906

Tor ca. 70 cm in der Luft

⇒ ca. 0,6 cm/a Schwund

Blacek, 2025

Bodenschwund, auch vor Ort



Schacht Trinkwassernotversorgung Wielenbach, Baujahr 1962

Ca. 60 cm in der Luft => **1cm Schwund/pro Jahr**

Endlichkeit der landwirtschaftlichen Moornutzung

Etwa 40 % der landwirtschaftlich genutzten Moorböden werden in den kommenden **30 Jahren** nicht mehr wie bisher nutzbar sein; davon


ca. **25 %** innerhalb der nächsten **0 bis 15 Jahre**

ca. **12 %** in den nächsten **15 bis 30 Jahren**

➔ **Boden soll erhalten bleiben bzw. wiederhergestellt werden.**



@ Agroscope (Gabriela Brändle, Urs Zihlmann), LANAT (Andreas Chervet), Schweiz



KlimMoBay-Abschlussbericht 2023

Endlichkeit – bald erreicht !?

Torfboden

Grenze

Unfruchtbarer
Seeton



© Agroscope (Gabriela Brändle, Urs Zihlmann), LANAT (Andreas Chervet), Schweiz

Schätzkarte der Endlichkeit



Erste Zeile: Veränderung der Geländehöhe durchschnittlich pro Jahr

Zweite Zeile: Zeitspanne zwischen den Aufnahmen
GFA- Grundflächenflurabstand (Bezug Jahr 2020)

Beispiel:

Absolute Höhendifferenz

- 1,9 cm/a x 19a = - 36,1 cm

Endlichkeit: 30 cm : 1,9cm/a = 15,7 a (Wasser steht an Oberfläche)

Wasserstand 20 cm unter Flur (Grünlandnutzung)

(30 cm - 20cm) : 1,9 cm/a = 5,2 a

=> Berechnung der Endlichkeit ist überschlägig und muss im Einzelfall plausibilisiert werden

Folgen langjähriger Entwässerung

Bodendegradation (Vermulmung, Vererdung) und **Bodenverdichtung** (als Resultat langjähriger Entwässerung) führen zu Extremen:

Moorhexe



Foto: Matthias Drösler

Bei trockenen unbedeckten Moorflächen (Acker) kann Winderosion entstehen – im Bayerischen Donaumoos hat diese (aufgrund des regelmäßigen Auftretens) einen Namen: Moorhexen.

Trockenrisse



Foto: Bastian Zwack


Risse im Oberboden durch anhaltende Trockenheit und geringer Wasserleitfähigkeit von degradierten Torfen (Trockene Blumenerde); Langenweiher, Bayerisches Donaumoos.

Staunässe (Überstau)



Foto: Bastian Zwack

Staunässe nach Starkregenereignis in Karolinenfeld, nahe Rosenheim, aufgrund des nahezu wasserundurchlässigen Oberbodenhorizonts in Folge langjähriger Entwässerung.



LfL



Peatland
Science
Centre

Grafik erstellt durch das PSC (2023)



Lösungsansatz: Moorverträgliche landwirtschaftliche Nutzung

- Landwirtschaft bei erhöhten Wasserständen
- Ziel: Eindämmung Torfschwund, Reduktion THG Emissionen

Wie kann das erreicht werden?

- Wassermanagement mit angehobenen Wasserständen
- Angepasste Landnutzung z.B. Paludikulturen, Beweidung, Photovoltaik
- Landtechnische Optionen für Niedermoorstandorte
- Angepasste Verwertung der Aufwüchse
- Aufbau neuer Wertschöpfungsketten
- Finanzielle Förderungen (Moorbauernprogramm)




Photo: Raphaela Blacek



Foto: Amika Wootman

Wasserregelungstechniken



Zu beachten: Wasserhaushaltsgesetz, Beteiligung Wasserwirtschaftsamt und Naturschutzbehörde

Maßnahmen der Wasserregulierung

- Rohrlose Unterflurbewässerung



Abbildung 2: Ziehen von Hohlgräben

- Unterflurbewässerung mit Graben




Abbildung 3: Unterflurbewässerung durch die Umfunktionierung von Dränagen

- Hangparallele Überrieselung




Abbildung 4: Hangparallele Überrieselung

- Drainageverschluss




Abbildung 5: Dränagenverschluss durch Rohraufsatz

- Unterflurbewässerung mit Schacht





Abbildung 6: Über den Wasserstand im Schacht wird der Rückstau in der Fläche reguliert

Klimaschutz durch Moorbodenschutz

Ausgangszustände

Entwässert




Acker

Grünland

Moorverträgliche Zielzustände

Angehobener Wasserstand



Schnittnutzung
für Futter

Weidenutzung

Anbau -
Paludikultur

Renaturierung



Wasserstandsanhhebung als Grundvoraussetzung für Moorbodenschutz

Moorbauernprogramm


Hohe Förderungen und Beratung für bayerische Pioniere im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM):

2023: Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)
Umwandlung von Acker in Dauergrünland (**M10**)

2024: Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)

- Bewirtschaftung von nassem Grünland (Nachweis über Zeigerarten) (**M12**)
- Bewirtschaftung von wiedervernässtem Grünland bzw. Nassgrünland mit Stauziel (-20 cm unter Flur, Förderzeitraum 12 Jahre) (**M14**)
- Anbau von Paludikulturen mit Stauziel (-10 cm unter Flur, Förderzeitraum 12 Jahre) (**M16**)

Investivförderung für Wasserregelung bis 100% (Ländliche Entwicklung)



Grafik erstellt durch das PSC in Zusammenarbeit mit der LfL (2024)

Überblick Moorbauernprogramm

Kürzel	Maßnahme	Fördersatz	Laufzeit
M10	Umwandlung von Acker in Dauergrünland	3.300 €/ha/Jahr	5 Jahre
M12	Bewirtschaftung von nassem Grünland	600 €/ha/Jahr	5 Jahre
M14	Bewirtschaftung von wiedervernässtem Grünland mit Stauziel	900 €/ha/Jahr	12 Jahre
M16	Anbau von Paludikulturen mit Stau	2.200 €/ha/Jahr	12 Jahre

Seit
2023

ab 2024
im
Angebot



Moorbauernprogramm

M 10 Umwandlung von Acker in Dauergrünland

- Verpflichtungsdauer: 5 Jahre
- Fläche muss in der **Moorbodenkulisse** liegen
- Muss in 2 Vorjahren als Acker genutzt sein (NC- Ergebnis AUKM Ackerfläche K-Maßnahmen)
- Flächen müssen ab dem 1. Verpflichtungsjahr einer Hauptnutzung als Wiese, Weide oder Mähweide unterliegen
- Rückumwandlung in Acker ausgeschlossen
- Fläche kann nur einmalig einbezogen werden
- Kombinierbar mit anderen KULAP Programmen und Ökoregelungen
- Prämie: **3.300 €/ha** und Jahr



Moorbauernprogramm

M 12 Bewirtschaftung von Nassgrünland

- Verpflichtungsdauer: 5 Jahre
- Fläche muss in **Moorbodenkulisse** liegen
- Mind. 1xJahr Mahd (mit Beräumung des Mähgutes) bzw. Beweidung
- Nutzungsverbot vor dem 15.06. eines Jahres
- **Nässe-Zeigerpflanzen** (mind. 2 Arten aus der entsprechenden Liste) müssen auf der Fläche je 3x in zwei Transekten vorhanden sein, jährlicher Nachweis bis 31.08. (Fal-BYApp)
- Hauptnutzung: NC 451, 452, 453
- Kombinierbar mit anderen KULAP- Programmen und Ökoregelungen
- Prämie: **600 €/ha** und Jahr




Liste der Zeigerarten

Nr.	Art (deutscher und <i>wissenschaftlicher</i> Name)	Erforderliche Ebene für Bestimmung
1	Bach-Nelkenwurz (<i>Geum rivale</i>)	Art
2	Baldrian (<i>Valeriana</i> ssp.)	Gattung
3	Blut-Weiderich (<i>Lythrum salicaria</i>)	Art
4	Engelwurz (<i>Angelica</i> ssp.)	Gattung
5	Großer Schwaden (<i>Glyceria maxima</i>)	Art
6	Mädesüß (<i>Filipendula ulmaria</i>)	Art
7	Mehlprimel (<i>Primula farinosa</i>)	Art
8	Schilf (<i>Phragmites australis</i>)	Art
9	Seggen (<i>Carex</i> spp.), außer der Behaarten Segge (<i>Carex hirta</i>)	Gattung
10	Sumpf-Vergissmeinnicht (<i>Myosotis scorpioides</i>)	Art
11	Wald-Simse (<i>Scirpus sylvaticus</i>)	Art
12	Wassermanze (<i>Mentha aquatica</i>)	Art
13	Wollgras (<i>Eriophorum</i> spp.)	Gattung



2025 - Anträge M 12



Moorbauernprogramm

M 14 Bewirtschaftung von wiedervernässtem Grünland bzw. Nassgrünland mit definiertem Stauziel

- Verpflichtungsdauer: 12 Jahre
- Flächen müssen in der **Moorbodenkulisse** liegen
- Mind. 1xJahr Mahd (mit Beräumung des Mähgutes) bzw. Beweidung
- **Stauziel 20 cm** unter Flur sind dauerhaft einzuhalten; Bau von Stauwehren (Antrag bei ALE)
- Stauziel muss durch externes Gutachten bestätigt werden (ALE)
- KULAP-Antragstellung nach Fertigstellung der Baumaßnahme beim AELF
- Hauptnutzung: NC 451, 452, 453
- Kombinierbar mit anderen KULAP-Programmen und Ökoregelungen
- Prämie: **900 €/ha** und Jahr



Umwandlung in Nassgrünland



Acker
entwässert



Grünland
entwässert


➔
Neuansaat
von nassetoleranten
Futtergräsern **im Herbst**
vor der
Wasserstandsanhebung

➔
Nachsaat
mit nassetoleranten
Futtergräsern
gleichzeitig zur
Wasserstandsanhebung



Nassgrünland
zur Futterproduktion

Fotos: Bastian Zwack



Nach Empfehlung der LfL:
Bayerische Qualitätssaatgutmischung
BQSM®-W 1M als Spezialmischung für
Niedermoorstandorte mit einem angehobenen
Grundwasserstand bei mittelintensiver Nutzung

Art	kg/ha	Gew.-%
Rohrschwinkel	13,5	45
Wiesenlieschgras	7,5	25
Wiesenrispe	4,5	15
Wiesenfuchsschwanz	3	10
Wiesenschwengel	1,5	5

Nassgrünland zur Futterproduktion

Pflanzenbestand und Inhaltsstoffe

- Durch den Einsatz von nässeangepassten Futtergräsern können **konkurrenzstarke Bestände** mit einer festen Grasnarbe erzeugt werden.
- Aufwüchse lassen sich als **Strukturergänzung bei der Milchkuhfütterung**, als Futter für **Jungvieh, Trockensteher, Pferde** und **Schafe** verwerten.
- Aufgrund der natürlicherweise **geringen Kaliumverfügbarkeit** auf Moorböden sind die Aufwüchse besonders zur **Milchfieberprophylaxe** geeignet.

Ernte und Konservierung

- Auf grundwassernahen Standorten ist insbesondere auf die Anforderungen der **Futterhygiene** zu achten.
- Partien mit **starker Verschmutzung** oder **giftigen Pflanzen** sind nicht zur Futtergewinnung geeignet.
- **Schnitthöhe > 8 cm**, Schnittlänge möglichst kurz, Einstellung der Erntegeräte mit geringen Bodenkontakt



Fotos: Bastian Zwack

Beweidung nasser Flächen



Wichtig:

- Klauengesundheit
- Robustheit
- Trotzen Insektendruck
- Trittsicherheit
- Futterverwertung
- Parasitenbefall

Erfahrungen aus dem Donaumoos: (Ganzjahresbeweidung)

- Kombination der Tierarten
- Trockene Liegeflächen
- Zugang zu Trinkwasser
- Zufütterung im Winter, Mineralien
- Unterstand
- Zufahrt zur Fläche



Moorbauernprogramm

M16 Anbau und Nutzung von Paludikulturen

- Verpflichtungsdauer: 12 Jahre
- Flächen müssen in der **Moorbodenkulisse** liegen
- Mind. 1x jährliche Ernte (mit Entfernen des Erntegutes)
- **Stauziel 10 cm** unter Flur sind dauerhaft einzuhalten, Bau von Stauwehren (Antrag bei ALE)
- KULAP-Antragstellung nach Fertigstellung der Baumaßnahme beim zuständigen AELF
- Stauziel muss durch ein externes Gutachten bestätigt werden (ALE)
- Prämie: **2.200 €/ha** und Jahr



Paludikulturen

Definition: Land- und forstwirtschaftliche Nutzung nasser Moorstandorte

Rohrglanzgras



Schilf



Segge



Rohrkolben



Photos: Ella Papp

Verwendungsmöglichkeiten: Stoffliche (s. Folie 41) und thermische (Biogas, Verbrennung)



Beispiele stofflicher Verwertung Paludimaterial



Möbelbauplatte



Papier



Dämmstoffe



Transportkartons
Deutscher
Verpackungspreis
2025

Photos: Blacek, R 2025

Sonstiges: Einweggeschirr, Zaunpfosten, Kleidung, Transportschalen...

Firma Landpack in Alling

➤ <https://landpack.de>



Isolierboxen aus Stroh für den Versand von:

- Lebensmittel
- Medikamente
- Biologische Reagenzien
- Enzyme
- Nützlinge ...

Zusätzlich: Dämmplatten aus Stroh (läuft bereits)

Rohrglanzgras und Seggen in der Testphase


Spezialmaschinen – notwendig?



Photos: Blacek R., 2025



Gewinn für den Landwirt



Übung

**Ordne die
Aussagen aus der
rechten Spalte den
Begriffen aus der
linken Spalte zu:**

1. Moorboden	A. <u>Fleischfressende Pflanze</u>
2. M10, M12, M14, M16	B. Murnau- Werdenfelser, Wasserbüffel
3. Robustheit, Futterverwertung	C. 1-4 cm/Jahr
4. Nassgrünland	D. 99%
5. Anteil entwässerter Moore	E. Stoffliche Verwendung <u>Paludikulturen</u>
6. Beweidung, Nasswiese	F. 30% organischer Anteil
7. Treibhausgase	G. Grundwassermoor
8. Rohrglanzgras	H. CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O
9. Hochmoor	I. Folge langjähriger Drainage
10. Niedermoor	J. Moorbauernprogramm
11. Sonnentau	K. 1 mm/Jahr
12. Torfwachstum	L. Moorbodenkulisie
13. Organisches Sediment	M. Strukturergänzung Milchviehfütterung
14. Grünlandanteil AELF Weilheim	N. Zeigerarten M12
15. Torfschwund	O. <u>Paludikultur</u>
16. Staunässe	P. Förderzeitraum M14, M16
17. Bachnelkenwurz, Mädesüß	Q. Eignung Rinderrasse Moor
18. 12 Jahre	R. Regenmoor
19. GLÖZ2 – Kulisie	S. Torf
20. Möbelbauplatte, Dämmung, Papier	T. 95%



A landscape photograph showing a wide, green field in the foreground. In the middle ground, there is a small, simple building with a red roof, possibly a barn or farmstead, surrounded by trees. The background consists of rolling hills and mountains under a clear blue sky.

**Fazit:
Moorbodenverträgliche Landwirtschaft
- alternativlos?!-**

Nein, aber vielleicht nur anders!

Zusatzinformationen

- Peattalks, jeden letzten Mittwoch im Monat
- HSWT , Peatland Science Center
- LFL (Landesanstalt für Landwirtschaft)
- Greifswald Moorzentrum
- Moorwert
- Filme:
 - Pioniere in Gummistiefeln
 - Landpack

