

BiLa Bayern Online

Landwirtschaftliche Tierhaltung

Geburt von Kälbern

Schwerpunktmodul –

Rinderaufzucht, Rindermast und Vermarktung

Bernhard Aigner, AELF Traunstein

Gliederung

- ▶ Maßnahmen vor der Geburt: siehe auch DLG Broschüre
- ▶ Maßnahmen nach der Geburt
- ▶ Biestmilchgabe
- ▶ Tierkennzeichnung
- ▶ Veröden der Hornanlage

Maßnahmen vor der Geburt

- ▶ Körperliche Entwicklung der Kalbinnen im Blick haben
- ▶ Bullenauswahl beachten: Kalbeverlauf 110
- ▶ Hoher Kuhkomfort im Trockensteherbereich
- ▶ Bewegung ermöglichen
- ▶ Mineralstoff- und Vitaminversorgung
- ▶ Evtl. Mutterschutzimpfung
- ▶ Bedarfsgerechte Fütterung nach Eiweiß, Energie und Ca
- ▶ 3 bis 4 Tage vorher in den Abkalbebereich



Maßnahmen nach der Geburt

- ▶ Überwachung der Geburt
- ▶ Hilfsmittel zur Vorhersage der Geburt nutzen
- ▶ Kalb in Brust-Bauchlage ablegen
- ▶ Mundhöhle und Nase von Häuten und Schleim befreien
- ▶ Mit Kälberretter Schleim absaugen
- ▶ Mit Vorderbein zu „kurbeln“ beginnen
- ▶ Atmung 30 bis 45 Züge und Herzschlag überprüfen



Maßnahmen nach der Geburt

- ▶ Bei Atemnot ohne Schleim:
Kopf nach unten und kaltes Wasser in die Ohren füllen
und Wasser über den Hinterkopf gießen Atemzentrum
- ▶ Atemreflex auslösen durch Drücken auf die Mitte der
Nasenscheidwand
- ▶ Mund-zu-Nase Beatmung durch Landwirt/in mit Risiko
von Infektionen aus dem Fruchtwasser
- ▶ Spray mit ätherischen Ölen
- ▶ Tierarzt, wenn vor Ort kann Medikamente spritzen



Maßnahmen nach der Geburt

- ▶ Kalb will Kopf heben
- ▶ Mutter leckt das Kalb ab => Kreislauf kommt in Schwung
- ▶ Oder selbst mit Stroh trockenreiben
- ▶ Nach 1 h sollen erste Aufstehversuch stattfinden
- ▶ Nabeldesinjektion bei gehäuften Nabelentzündungen
- ▶ Einfaches Sprühen reicht, ansonsten gelangen Krankheitserreger in das Kalb



Weitere Schritte

- ▶ Frisch, saubere, eingestreute Einzelbox
- ▶ Abkalbebox oft hoher Keimdruck
- ▶ Wärmelampe einsetzen
- ▶ Kälberdecke und Kleinklima nutzen
- ▶ Kälberentwicklung durch Gabe von Eisen, Kupfer, Selen, Vitamin A, E (und B) fördern

=> Vorbeuge ist besser als Nachsorge

Erstversorgung der Kuh

- ▶ Bei Geburtshilfe Kuh nachuntersuchen lassen
- ▶ Reinigung und Desinfektion des Geburtsweges
- ▶ Kontrolle, ob Zwillings vorhanden ist
- ▶ Bei Schweregeburten Schmerzmittel einsetzen
- ▶ 50 l Energietrunk für die Kuh evtl. gleich mit Kalzium
- ▶ Milchfieber: kalte Ohren, unsicherer Stand
- ▶ Behandlung durch Tierarzt oder Bolus eingeben
- ▶ Fussfessel gegen ausgrätschen



Biestmilchgabe

1 Mit viel Kolostrum höhere Leistung

Kolostrum-Menge	Zwei Liter	Vier Liter
Anzahl Kälber (Braunvieh)	37	31
Tageszunahmen (g)	798	1 030
Erstbesamungsalter (Monate)	14,0	13,5
Abgangsrate bis Ende 2. Laktation	24,7	12,9
Leistung 1. und 2. Laktation (kg)	16010	17040



Biestmilchgabe

- ▶ 4 Liter Biestmilch in den ersten Lebensstunden
- ▶ In der Nacht aufstehen
- ▶ Qualität überprüfen mit Kolostro- oder Refraktometer
- ▶ Biestmilchvorrat anlegen in 1 l Gebinde von alten Kühen
- ▶ Hohe Dichte und gelbe/orange Farbe für viel Vitamin A
- ▶ Bei Saugschwäche darf und soll gedrencht werden



Biestmilchgabe

- ▶ Passive Immunisierung:
- ▶ Kalb wird ohne Abwehrstoffe geboren (kein Übergang über Nabelschnur/Plazenta)
- ▶ Abwehrstoffe erhält es zunächst aus Biestmilch
- ▶ Aktive Immunisierung:
- ▶ Aufbau der eigenen Abwehrstoffe erfolgt langsam nach der Geburt



Biestmilchgabe

- ▶ hoher Anteil an Immunglobulinen (Abwehrstoffe)
- ▶ hoher Anteil an Fett, Mineralstoffen und Vitaminen
- ▶ sehr dickflüssig
- ▶ Gehalt an Schutzstoffen in der Biestmilch nimmt nach der Geburt rasch ab
- ▶ Darmdurchlässigkeit beim Kalb für Schutzstoffe nimmt rasch ab




Biestmilchgabe


	Milch in %	Kolostrum in %
Trockensubstanz	12,9	25,3
Eiweiß	3,4	17,3
Fett	4,0	8 - 9
Lactose	4,8	2,7
Asche	0,7	1,6
Calcium	0,12	0,2
Immunglobuline	0,5	13,6



Biestmilchgabe



Biestmilchgabe



Biestmilchgabe

	Melken und Tränken 2h nach der Geburt	Melken und Tränken 6h nach der Geburt
<u>Tränkemenge</u>	2 Liter	2 Liter
<u>Immunglobulingehalt (IgG) g/L</u>	130	100
Durchlässigkeit der Darmwand in %	85 %	50 %
Versorgung mit <u>Immunglobulingehalt (IgG) in g</u>	$2 * 0,85 * 130 = 221$	$2 * 0,5 * 100 = 100$
<u>Immunglobulinbedarf (IgG) in g</u>	150	150
Differenz	71	-50

Fazit:


Je früher, je mehr, desto besser! Da die Darmschranke schließt und die Biestmilchqualität mit zunehmender Zeit abnimmt → bis 2h mind. 2 Liter, bis 6 h min 4 Liter

Biestmilchgabe

- ▶ Verbesserung Biestmilchqualität und -versorgung
- ▶ Zeitnahe Versorgung mit Biestmilch
- ▶ Notfall ist Drenchen erlaubt
- ▶ Brixwert >23, besser 26 beim Einfrieren
- ▶ Auftauen im Wasserbad oder Mikrowelle
- ▶ Reserveeinsatz bei schlechter Qualität
- ▶ überprüfen, Kalb genug aufnimmt
- ▶ Hygiene beachten



Biestmilchgabe



Biestmilchgabe




Biestmilchgabe

- ▶ Auswirkungen:
- ▶ Vergehen weniger als 6 Stunden bis zur ersten Tränke verwenden innerhalb der ersten 14 LT nur 7,6 % der Kälber
- ▶ Dauert es hingegen sechs bis zwölf Stunden bis die Kälber die Biestmilch erhalten, verwenden deutlich mehr Tiere (10,4 %) innerhalb der ersten zwei Lebenswochen



Biestmilchgabe



Immunologische Lücke – hohe Krankheitsanfälligkeit

schlechte Biestmilchversorgung – schlechter Immunstatus

große Lücken – sehr hohe Krankheitsanfälligkeit

Tierkennzeichnung

- ▶ Marke einziehen innerhalb von 7 Tagen
- ▶ Meldung in der HI-Tier Datenbank bei LKV-Mitglied:
Geburtsverlauf, Embryotransfer

Daten zur Geburtsmeldung (Rind) , hier zur [dyn. Variante](#) , hier zur [Kurzform](#) , hier zur [Tabelleneingabe](#) , hier zur [Meldungsübersicht](#)

Ohrmarke Kalb :		 (10 Ziffern)
Geburtsdatum :		  (TT.MM.JJJJ)
Ohrmarke Mutter :		 (10-15stellig)
Rasse :	<Wählen Sie die Rasse>	 (laut Liste)
Geschlecht :	☐ weiblich ☐ männlich	 (anklicken)
Mehrling :	☐ nein ☐ ja	 (anklicken)
Festliegen :	☐ nein ☐ ja	 (anklicken)
Nabelbruch :	☐ nein ☐ ja	 (anklicken)
Nachgeburtsverhaltung :	☐ nein ☐ ja	 (anklicken)

Wie gehts weiter:

Bitte geben Sie die Daten der Geburtsmeldung ein und drücken dann die Schaltfläche zum Einfügen



Eintrag Geburtsverlauf

► Geburtsverlauf:

Leichtgeburt (keine Geburtshilfe erforderlich)

Normalgeburt (Geburtshilfe von einer Person erforderlich)

Schwerg Geburt (Geburtshilfe von mehr als einer Person oder mechanischer Geburtshelfer erforderlich)

Kaiserschnitt

Embryotomie (Zerstückeln des Kalbes)



Veröden der Hornanlage

- ▶ Vermeidung gegenseitige Verletzung der Tiere
- ▶ Erhöhung Sicherheit Landwirt
- ▶ Nutzung Fressgitter zu verbessern
- ▶ Vereinfachen des Anbindens
- ▶ ruhigeres Verhalten der Tiere in der Gruppe (entweder alle oder niemand hat Hörner)



Tierschutzgesetz

Tierschutzgesetz

Vierter Abschnitt – Eingriffe an Tieren

§5 (verändert)

- Grundsätzlich darf bei einem Wirbeltier ohne Betäubung ein mit Schmerzen verbundener Eingriff nicht vorgenommen werden.
- Eine Betäubung ist nicht erforderlich für das Enthornen oder das Verhindern des Hornwachstums bei unter sechs Wochen alten Rindern.
- **Ist eine Betäubung nicht erforderlich, sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Schmerzen oder Leiden der Tiere zu vermindern.**

§6 (verändert)

- Grundsätzlich ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise Entnehmen oder Zerstören von Organen und Geweben eines Wirbeltieres verboten.
- **Verbot gilt nicht für das Enthornen von Kälbern, wenn der Eingriff zu dem Schutz des Tieres oder zum Schutz anderer Tiere unerlässlich ist.**



Rechtliches

- ▶ **bis 6 Wochen:** Enthornen mit Beruhigungs- und Schmerzmittel durch den Landwirt → CC-Relevanz
- ▶ Beruhigungsmittel (~1,50€/ Kalb), Schmerzmittel (~2,00€/ Kalb)
- ▶ **ab 6 Woche:** Enthornen nur noch mit Betäubungsmittel durch den Tierarzt
- ▶ **Ökologische Landwirtschaft:** => Tierarzt nötig



Ablauf

- ▶ Vorbereiten Gerätschaften (Enthornungsgerät, Medikamente, Scherapparat, Wundspray, Arbeitshandschuhe)
- ▶ Medikamentengabe unter die Haut und in den Muskel (Beruhigungsmittel (Xylazin) und Schmerzmittel (Meloxicam) – Anästhetika nur durch TA)
- ▶ Warten (ca. 15 Minuten)
- ▶ Scheren vor dem Veröden



Ablauf

- ▶ Veröden unter Drehbewegung des Gerätes (Betriebstemperatur beachten)
- ▶ Kontrolle durchtrenntes Gewebe
- ▶ Wundversorgung mittels Wundspray
- ▶ Kalb in Brustlage (vor Witterung schützen), Beobachten



Fehler vermeiden

- ▶ nur gesunde Kälber behandeln
- ▶ möglichst in den ersten zwei Lebenswochen, Hornknospen noch klein, besseres Handling (Einzelbox)
- ▶ keine gestressten Kälber behandeln, Sedierung wirkt nicht gut
- ▶ ausreichend Abstand zu Mahlzeiten einhalten (1-2 Stunden)
- ▶ Fressgitter und ähnliche Öffnungen schließen (Erdrosselungsgefahr)



Fehler vermeiden

- ▶ Zeitmanagement beachten, zum einen je Kalb (15 Minuten), zum anderen bei mehreren Kälbern (nicht zu viele Kälber vorspritzen: < 4 Kälber)
- ▶ Größe des Brennkopfes muss für Hornknospengröße passen
- ▶ akkubetriebene Geräte eignen sich nur für junge Kälber



Fehler vermeiden

- ▶ Geräte benötigen bei geringen Außentemperaturen längere Aufheizphasen
- ▶ Geräte mit Vorsicht anwenden: unverhältnismäßig starke Krafteinwirkung sowie langes Brennen kann zu Gewebeschädigungen beim Kalb führen
- ▶ Siehe Bilder Umdruck