

Arbeitsanweisung schonendes Veröden der Hornanlage beim Kalb

Alle Kälber, welche älter als 8 Tage sind und gesund, werden am **Donnerstag Vormittag** behandelt.

Ablaufschema:

Vorbereitung und Überprüfung des Enthornungsgerätes und der benötigten Utensilien
(Scherapparat, Einmalkanülen, Ersatzgaskartusche etc.)

1. Sedieren → intramuskuläre (in den Muskel) Gabe von 0,7 – 0,9 ml Xylazin



2. Schmerzmittel → subkutane Gabe (unter die Haut) von 1,5ml Metacam



3. Verwendung einer eigenen Nadel für jedes Kalb (Einmalkanülen)

Maximal 3 Kälber sedieren, bei wenig Übung nur 2 Kälber.

4. Stoppuhr auf 15 Minuten stellen und Kalb möglichst in Ruhe lassen (Wirkzeit der Medikamente)

5. Kurz vor dem Enthornen → Freischeren der Hornknospen, damit man den Hornansatz gut erkennt.



6. Veröden des Hornansatzes mit Gerät unter Drehbewegung –
Vorsicht beim Umgang mit dem heißen Ende!
7. Kontrolle, ob das Gewebe auch sauber durchtrennt wurde;



8. Abdecken der Verödungsstelle mit Wundspray



9. Kalb in Brustlage trocken bzw. schattig legen,
regelmäßige Kontrollgänge durchführen, bis Kalb wieder aktiv/munter ist
(Schutz vor Kälte, Nässe [evtl. Kälberdecke anziehen] und starke Sonneneinstrahlung)
10. Kontrolle und Nachbehandlung der Wundheilung

Quelle Methode: TGD Bayern e.V.