

BiLa Bayern Online

Ökologische Tierhaltung

am 09.12.2025



Meine Vorstellung

- **Name:** **Veit Obermaier**
- **Dienstliche Position:** Bildung und Beratung
- **Aufgaben:** Bildung, Beratung (Lehrer für ökologische Tierhaltung in Landshut- Schönbrunn)

- **Kontakt:** **veit.obermaier@aelf-al.bayern.de**

Was erwartet Sie?



1. Grundlagen und Ziele der ökologischen Tierhaltung

2. Anforderungen an die ökologische Rinderhaltung

- *Anforderungen an die ökologische Schweinehaltung*
- *Anforderungen an die ökologische Geflügelhaltung*

3. Bayerisches Biosiegel und BayProTier

Fragen wir mal nach!

Ist
Öko = Öko





Unterschiedliche ÖKO- Standards...

Mindestanforderungen an die
ökologische Erzeugung
gemäß **gesetzlichen Mindeststandards**
(EG-Öko-Verordnung)

Gesetzliche Vorgaben: Öko-KennzeichnungsO



EU- Bio seit Juli 2010
(**Pflichtangabe** für Ökoprodukte)



D- Bio seit September 2001
(**freiwillig**- Wiedererkennung)

z.B. Handelsketten und deren Bio-Marken



Strengere Vorschriften an die
ökologische Erzeugung
der privatrechtlichen Anbauverbände
in Deutschland
(Verbandsrichtlinien)

Privatrechtliche Vorgaben: Anbauverbände

biologisch bzw. ökologisch:



biologisch-dynamisch:



Umfrage zur eigenen Tierhaltung

- QR- Code öffnen und an Umfrage teilnehmen
- Oder www.menti.com öffnen und Code 98032819 eingeben zum teilnehmen



[Click to download as image](#)



Grundlagen



- Gesetzliche Grundlage: EU-Öko-Verordnung 2018/848 mit den DurchführungsVO und Rechtsakte (über 30!)
- Vorschriften zur Haltung, Fütterung, Behandlung und Zukauf von Tieren...
- Positiv-Listen Futtermittel im Anhang der VO
- Festlegung von Umstellungszeiten für tierische & pflanzliche Produkte

Grundlagen



= gesetzliche Grundlage seit 1991, Tierhaltung seit 1999

NEUE EU Öko-Verordnung (gültig seit 1.1.2022)

- **Öko-Basisverordnung:** neu 2018/848 (alt VO 834/2007)
- **Durchführungsverordnungen/Rechtsakte:** derzeit Anpassung (30 Akte)! für den EU-Binnenmarkt (alt VO 889/2008) *Produktionsregeln...*
- Verordnung für Importe aus Drittländern (alt VO 1235/2008)

Deutschland (nationaler Rechtsrahmen)

- **Ökolandbaugesetz (ÖLG)**
Funktionieren der Bio-Kontrolle in Deutschland zu sichern und so das Vertrauen in Bio-Produkte zu stärken! Zertifizierung der Bio-Außer-Haus-Verpflegung (AHV) und des Bio-Einzelhandels...
- **Ökokennzeichengesetz (ÖkoKennzG)**



Ziele der ökologischen Tierhaltung...



➤ **Tierrgerechte Haltung**

- Gesunde, leistungsbereite Tiere
- Natürliches Verhalten ermöglichen, (möglichst) Weidehaltung
- flächengebundene Tierhaltung...bis hin zu Biodiversität...

➤ **Einsatz von Antibiotika reduzieren**

- Behandlungen durch optimale Haltung und Fütterung vermeiden
- Alternative Heilverfahren (z.B. Homöopathie) bevorzugt



Ziele der ökologischen Tierhaltung...

➤ Geschlossene Betriebskreisläufe

- Verwertung von Gras und Klee gras
- Vermeidung von hohen Futterzukaufen
- Produktion von organischem Dünger

➤ Hochwertige Lebensmittel

- Rückstandsfrei
- Hohe Qualität
- Regionale Vermarktung



Anforderungen im Ökologischen Landbau- Tier

1. Vorgaben Haltung



2. Vorgaben Fütterung

3. Vorgaben Krankheitsvorsorge und -behandlung





Haltungsanforderungen Rind allgemein

- Aufstallung mit freier Bewegungsmöglichkeit
- Auslaufmöglichkeit für alle Tiere (Weide)
- Mindestflächen im Stall und Auslauf (= Laufhof)




Haltungsanforderungen Rind

- Eingestreute Liegefläche (auch Komfortmatten müssen eingestreut sein!)
- Max. die Hälfte der Stallmindestfläche aus Spalten (z.B. min. 3 m² / Kuh planbefestigte Fläche im Stall)
- Auslauf darf maximal zu **¾ überdacht** sein (Bestandsgebäude)

Haltungsanforderungen Rind...

- Weideunterstände/ Schutz vor Wetterextremen (TierschutzNutztierhaltungsVO)
- Tier: Liegeplatzverhältnis 1:1
(Jedes Tier braucht einen Liegeplatz (planbefestigt) **trocken, sauber und eingestreut!**)
- Tier: Fressplatzverhältnis 1:1
(Jedes Tier braucht einen Fressplatz)



Öko Anforderungen an den Fressbereich

Tier Fressplatz Verhältnis 1:1

(75 cm Fressplatzlänge-EIF)



Stützen am Futtertisch!

z.B. lt. Vorgaben EIF:

4,50 m: 0,75 m = 6 Fressplätze

5 m: 0,75 m = 6,66 => auch 6

bei Hornkühe:

AFP Förderung- keine Vorgabe!

=> fachlich 0,85 - 0,9 m!

keine ÖKO Vorgaben, nur: „Tiere wohlgenährt, keine Kümmerer, die vom Futter verdrängt werden“

Platzvorgaben im Stall und Laufhof...

	Stallfläche (den Tieren zur Verfügung stehende Nettofläche)		Außenfläche (Freigelände, auf dem sich die Tiere bewegen können, ausgenommen Weideflächen)
	Mindestleibendgewicht (kg)	m ² pro Tier	m ² pro Tier
Masttiere Und Zuchttiere	bis zu 100	1,5	1,1
	bis zu 200	2,5	1,9
	bis zu 350	4,0	3
	über 350	5, mindestens 1 m ² pro 100 kg	3,7, mindestens 0,75 m ² pro 100 kg
Milchkühe		6	4,5
Zuchtbullen		10	30

Verändert nach Durchführungsverordnung Anhang I, (EU) 2020/464 (EU)

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

Ansonsten gilt:

1. Lebenswoche: Mindestinnenfläche von 1,5 m²

2. bis inkl. 8. Lebenswoche:

- Die Mindestflächen von 2,6 m² (Stall- plus Auslauffläche) müssen eingehalten werden
- Gruppenhaltung **oder Iglus bzw. Boxen, die Sicht- und Sozialkontakt ermöglichen!**
- Die Auslauffläche kann bei Kälbern auch im Stallbereich angeboten werden

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

✓ nur 1. Lebenswoche:

Einzelboxen:

Mindestinnenfläche von 1,5 m²



Kraftfutterflasche

optimal

Frisches Wasser



Kraftfutter

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

✓ nur 1. Lebenswoche:

Einzelboxen:

Stallinnenfläche: 1,5 m²



Wallner, AELF Kaufbeuren

✓ 2. bis inkl. 8. Lebenswoche:

Gruppenhaltung oder Iglus bzw. Boxen, die Sicht –und Sozialkontakte ermöglichen mit Auslauf (Bayern!):

- ✓ Stallinnenfläche mind. **1,5 m² pro Tier** notwendig
+ 1,1 m² (bis 100 kg LG) Auslaufläche ggf. auch im Stall => **2,6 m² pro Tier!**

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

(Gruppenhaltung? derzeit bayerische Auslegung)



Wallner, AELF Kaufbeuren

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

Wallner, AELF Kaufbeuren



✓ 9. bis inkl. 12. Lebenswoche: **Gruppenhaltung ab 4 Kälber, (alters- und gewichtsmäßig zusammenpassen)**

- Stallinnenfläche mind. **1,5 m² pro Tier** notwendig
+ 1,1 m² (bis 100 kg LG) Auslauffläche ggf. auch im Stall => **2,6 m² pro Tier!**
+ 1,9 m² (bis 200 kg LG) Auslauffläche ggf. auch im Stall => **4,4 m² pro Tier!**

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

4. bis inkl. 6. Lebensmonat, Weidegang ab 3. Lebensmonat:

- Bei Weidegang in der Weideperiode (Mai bis Oktober) ist kein ständig zugänglicher Auslauf erforderlich.
- Kälber müssen jedoch nach dem 3. Lebensmonat an die Weide angelernt werden, d.h. in der Weidezeit täglicher, zeitlich befristeter Auslauf auf einem **befestigten Weideanlernplatz** oder einer **Kälberweide**

Gilt: wenn das Wetter und der Boden dies erlauben!

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

Vorgaben Öko Kälberhaltung: Auslauf und Überdachung?

- ✓ Geburt bis inkl. 3. Monat: Auslauffläche im Stall möglich!!!
- ✓ ab 4. Monat: Auslauf im Freien!
 - bis 6 Monate: darf der Auslauf voll überdacht sein- es müssen jedoch Außenklimaverhältnisse gegeben sein!
 - ab 7. Monat: mind. 50 % der Mindestauslauffläche darf **nicht überdacht** sein! (bei Neubauten)

AHA! Kälberhaltung im Öko-Betrieb



- ✓ 1. Lebenswoche: Einzelboxen Maße nach Anhang I VO 2020/464 (= 1,5 m²) und Sicht-, Sozialkontakt ermöglichen
- ✓ ab der 2. Lebenswoche sind die Mindestflächen nach Anhang I VO 2020/464 (Stall- plus Auslauffläche) einzuhalten!
- ✓ bis inkl 8. Lebenswoche sind auch Iglus (bei Sicht- und Sozialkontakt) zulässig
- ✓ ab spätestens 9. Lebenswoche: Gruppenhaltung (ab 4 Kälbern)
- ✓ spätestens nach 3 Monaten: Weidemöglichkeit
- ✓ Auslauffläche kann bis zum Alter von max. 6 Monaten überdacht sein (jedoch Außenklimaverhältnisse!)
- ✓ Bei Weidegang in der Weideperiode (Mai bis Oktober) ist kein ständig zugänglicher Auslauf erforderlich
- ✓ Die Kälber müssen jedoch nach dem 3. Lebensmonat an die Weide angelernt werden, (d.h. regelmäßiger Auslauf bei passender Witterung auf einem befestigtem Weideanlernplatz oder einer Kälberweide)

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

➤ **Kranke Kälber** und schwache Kälber:

Gruppenhaltung und das nach Anhang I VO (EU) 2020/464 vorgeschriebene Platzangebot ist nicht erforderlich, aber das Tierwohl muss beachtet werden, insbesondere ist reichliche Einstreu zu gewähren

Einzelboxen können im Krankheitsfall ausnahmsweise auch für Kälber älter als 1 Woche genutzt werden

(Tierarzt vor Ort und Behandlungsnachweis)

Kälberhaltung im Öko-Betrieb

- **Heu** (Raufutter) muss ab der 2. Lebenswoche gegeben werden (TierschutzNutztierhaltungsVO)
- **Wasser** muss ab der 3. Lebenswoche zur Verfügung gestellt werden (TierschutzNutztierhaltungsVO)
- **Enthornung** mit Ausnahmegenehmigung (LfL) möglich
 - *örtliche Betäubung+ Sedierung+ Schmerzmittel!*
 - (Demeter nicht)



!

Kuhgebundene Kälberaufzucht



Quelle: Wochenblatt

Kuhgebundene Kälberaufzucht

- Muttergebundene Kälberaufzucht: Kalb hat Kontakt zur eigenen Mutterkuh und wird von deren Milch versorgt.
- Ammengebundene Kälberaufzucht: Mehrere (fremde) Kälber werden von einer Ammenkuh versorgt. Diese wird nicht gemolken.

Vor- und Nachteile

- ✓ Hohe Verbraucherakzeptanz
 - ✓ Natürlichste und artgerechteste Kälberhaltungsform
 - ✓ Kälber lernen von der Kuh
 - ✓ Arbeitsentlastung???
 - Hoher Milchverbrauch der Kälber
 - Stallumbau notwendig
 - Trennung von Kalb und Kuh besonders schwierig
- Es muss am Ende wirtschaftlich sein (höherer Milchpreis oder Einsparpotzenial)

Haltung von Jungvieh

➤ Platzangebot richtet sich nach Gewicht (Anhang I, VO (EU) 2020/464)

➤ Keine Vollspalten

➤ Weide im Sommer

➤ (Auslauf)

	Stallfläche (den Tieren zur Verfügung stehende Nettofläche)		Außenfläche (Freigelände, auf dem sich die Tiere bewegen können, ausgenommen Weideflächen)
	Mindestleibendgewicht (kg)	m ² pro Tier	m ² pro Tier
Masttiere Und Zuchttiere	bis zu 100	1,5	1,1
	bis zu 200	2,5	1,9
	bis zu 350	4,0	3
	über 350	5, mindestens 1 m ² pro 100 kg	3,7, mindestens 0,75 m ² pro 100 kg
Milchkühe		6	4,5
Zuchtbullen		10	30

➤ Empfehlung:

- Jungvieh auf Vollweide (~ 1 ha / für 3 GV (Ø 5-6 Rinder/ ha))
- Weiter entfernte Flächen nutzen

Haltung von Jungvieh

- ✓ *Endmast* ausgewachsener Rinder für die Fleischerzeugung kann in Stallhaltung erfolgen
(höchstens 1/5 der Lebensdauer der Tiere und **maximal 3 Monate**)

Neue EU-Öko VO ab 1.1.2022

Regelungen zur Endmast von Rindern ohne Freigeländezugang ist entfallen!

Kurz mal durchschnaufen!



s
i
c
h

d
e
h
n
e
n

u
n
d

s
t
r
e
c
k
e
n

!

Weideverpflichtung Ökobetriebe

Aktueller Stand (Grundlage Weidepapier)

EU-Öko-VO (Anhang II, Teil II, Nr. 1.9.1.1 b):

Pflanzenfresser (Rinder, Schafe, Ziegen, Equiden) müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten

„Umstände“ (Anhang II, Teil II, Nr.1.7.3):

Witterungsbedingungen, jahreszeitliche Bedingungen,
Zustand des Bodens sowie

behördliche Anordnungen zu Quarantänезwecken

→ „Umstände“ sind immer **temporär!**

→ **Strukturelle Gründe**, die den Weidegang schwierig oder unmöglich machen, werden nicht anerkannt!

„Maximierungsgebot Weide“ für Pflanzenfresser

EU-Kommission hat Pilotverfahren gegen Deutschland
geführt:

Das EU-Recht sieht keine Wahlfreiheit zwischen Weide und Auslauf für Pflanzenfresser vor. Wenn Weide möglich ist, dann muss Weidehaltung betrieben werden!

**Umstellung kann nur mit vorhandener Weidemöglichkeit
empfohlen werden, andernfalls besteht derzeit keine
Rechtssicherheit!** (auch Vorgabe Verbände + Molkereien!)

Haltungsvorgaben Milchvieh



Weidepapier, LfL

Anforderungen gemäß aktuelles Weidepapier:

➤ Laufstall + Auslauf + Weide

- Stallmindestfläche: 6 m² / Kuh
- Weide wann immer die Umstände dies gestatten
- Außenfläche/Auslauf, wenn Zugang zu Weide nicht möglich:
4,5 m² / Kuh (davon max. $\frac{3}{4}$ überdacht möglich (3,375 m²) und $\frac{1}{4}$ (1,125 m²) unüberdacht)

➤ Kuh braucht ein „Optimum“ an Weide → Bewegungsaspekt steht im Vordergrund

Haltungsvorgaben Milchvieh

Anforderungen gemäß aktuelles Weidepapier:

➤ Laufstall + **Auslauf** + Weide

- Stallmindestfläche: 6 m² / Kuh
- Weide wann immer die Umstände dies gestatten

➤ Kuh brauch ein „Maximum“ an Weide, da in den Wintermonaten kein Auslauf erfolgt (Fütterungs- und Bewegungsaspekt wichtig)

Haltungsvorgaben Milchvieh

- **Anbindehaltung** in Kleinbetrieben + Weide im Sommer + mindestens 2 x pro Woche Winterauslauf!



Laufhof...“wie es früher einmal war“...



Weide- Regelungen...

- Von April- Oktober (je nach Region und Witterung)
- Erstellung eines gesamtbetrieblichen Weidekonzepts
- Führen eines Weidetagebuchs (Weidezeiten, Weideflächen, Weidenanteil der Tiere)
- Pflicht für Unterstände zum Schutz vor Extremwetter

Weidegröße

- In EU-Öko-VO und das Weidepapier machen keine Angaben
 - Weide muss grün sein und als Weide erkennbar sein
- In KULAP Sommerweidehaltung T10
 - Mindestweidefläche von 0,07 ha je GV (700 m²)
- Öko-Verband
 - Mindestweidefläche 0,06 ha je GV (600 m²)
- Kurzrasenweide
 - Vollweide idealerweise mind. 0,33 ha / Kuh arrondiert am Kuhstall



Weide

Empfehlung:

- Weideanteil der Milchkühe in Abhängigkeit vom Betrieb
- Wenn **keine Milchvieh-Vollweide möglich ist**, dann wenigstens für das Jungvieh (das geht auch auf hoffernden Flächen)



Sommerweidehaltung T10



Merkblatt T10

- Tierwohl-Sommerweidehaltung: Maßnahme T10 (Weideprämie für Rinder)
- 75 € / GV bei maximale Weidezeit von 4 Monaten (120 Tage)

Dabei gelten folgende GV-Werte pro Tier:

Kälber bis 6 Monate:	0,3 GV
Rinder über 6 Monate bis 2 Jahre:	0,6 GV
Rinder über 2 Jahre und Kühe:	1,0 GV

- Mindestweidefläche von 0,07 ha je GV
- Mindestens zweimonatige und maximal viermonatige Weidezeit innerhalb des Zeitraums 15. Mai bis 31. Oktober mit täglichem Weidegang



Verschiedene Weidesysteme



Raumber- Gumpenstein

- Kurzrasenweide (Intensive Standweide)
- Portionsweide
- Koppelweide
- Extensive Standweide
- „Mob Grazing“
- Mischweide
(Kombination aus verschiedenen Weidesystemen)
- Weiterführende Informationen siehe QR-Code



Bildquelle: Matthias Wagner

Vollweide- Kurzrasenweide

- Kurzrasenweide Merkblatt, LfL (Sigi Steinberger)





Weil:

Vorteile der Weide


Ökonomisch

- Kostengünstiges Grundfutter
- Hohe Futterqualität
- Geringerer Kraftfuttereinsatz

Tiergesundheit


Klima

Biodiversität



Grafik: Top Agrar nach Kiefer, Bahrs, Over (2013)

Sie sind dran!



Bitte teilen Sie
Ihre Weideerfahrung
mit uns!

Gerne Hand heben und
Mikro anschalten!

Bitte sprechen Sie....

Allgemeines: Züchtung und Herkunft

- Fortpflanzung darf nicht durch die Behandlung mit Hormonen eingeleitet werden
- Klonen und Embryotransfer sind nicht erlaubt!

Tierzukauf:

- Grundsätzlich: Öko-Tiere in ökologischen Betrieben geboren und aufgezogen werden
- kein Zukauf konventioneller Tiere zur Mast
- Zukauf konventioneller Zuchttiere nur, wenn sie aus dem Ökolandbau nicht verfügbar sind und von der Kontrollbehörde genehmigt sind:
 - bis **max. 10 % des Bestandes jährlich** (bei Rindern)
 - nur Kalbinnen oder jünger (Umstellungszeit Milch = 6 Monate beachten)

Tierzukauf

<https://organicxlivestock.de/>

organic
Xlivestock

Datenbank für ökologische Tiere - Deutschland - Gast

Sprache ▾ Menü ▾

Aquakultur Biene Ente Gans Geweihträger Huhn Kaninchen Pute Rind Schaf Schwein Ziege Sonstige Tiere

Herzlich Willkommen bei organicXlivestock



organic
Xlivestock

Wichtiger Hinweis: nur angemeldete Benutzer*innen können öko-Tiere anbieten und Ausnahmegenehmigungen für den konventionellen Tierzukauf beantragen

Bei Ihrem Konto anmelden


Zum ersten Mal bei uns?
Registrieren!

Nach Öko-Tieren suchen ▾

Länderauswahl

Tierzukauf


Organicxlivestock




- Seit 2022 gibt es diese Datenbank
- Kostenlose Möglichkeit Tiere zum Verkauf anzubieten
- Transparente Auflistung von ökologischen Tieren
- Ausnahmegenehmigung über Datenbank stellen
- Verbandsvorgaben sind auf Datenbank vorhanden

Vorgaben: Fütterung

- Tiere müssen mit ökologischen Futtermitteln gefüttert werden
- Extraktionsschrote sind verboten
- keine gentechnisch veränderten Futtermittel
- Mineralfuttermittel (Zulassung für Ökobereich)
- möglichst hofeigenes Futter als Grundlage (geschlossener Betriebskreislauf)
- Mindestens 60% der Trockenmasse in der Tagesration müssen aus frischem, getrocknetem oder siliertem Raufutter in der Tagesration (bei Frischmelkern max. 3 Monate mind. 50%)
(z.B. 16 kg Grundfutteraufnahme => max. 6,4 kg KF fressen)



Fütterung Rind



- Aufzucht der Kälber mit Vollmilch (mind. 90 Tage)
- Kälber: Sauer- oder Joghurttränke ist möglich
Mutterkühe, Ammengebundene Kälberaufzucht
- Kälber: Heu und Wasser ab 8. bzw. 15. Lebenstag
- Grundfutter darf nicht ausschließlich aus Silage bestehen
→ Weide
- mind. 70 % des Futters müssen aus eigenem Betrieb oder aus der Region (Kooperation) kommen

Fütterung Rind

Definition:

Nulljahresfutter: Futter, das innerhalb des 1. Jahres nach dem Abschluss des Kontrollvertrags geerntet wird

→ nach der Umstellung darf „Nulljahresfutter“ nur bis **max. 20%** (TS) in der Ration verfüttert werden (Grünaufwuchs, Eiweißfutter)

Umstellungsfutter: Futter, das ab dem 1. Jahr nach dem Abschluss des Kontrollvertrags geerntet wird

→ vom eigenen Betrieb dürfen bis zu 100 % in der Ration eingesetzt werden, zugekaufte Umstellungsfuttermittel inkl. eigenem „Nulljahresfutter“ nur **max. 25%**

Beispiel: Fütterung Milchviehbetrieb

➤ Fruchtfolge auf dem Acker:

- Klee gras und Luzerne
- Mais
- Winterweizen
- (Lupinen)
- Wintergerste
- Hafer

➤ Grünland

Beispiel: Fütterung Milchviehbetrieb

➤ Grundfutter:

- Gras- und Kleeegrassilagen
- Maissilage
- Luzerneheu
- Heu

+ Viehsalz und
Mineralfutter

➤ Kraftfutter:

- Energiemischung: Körnermais, Gerste, Weizen, Hafer
- Eiweißmischung: Luzerne-Cobs, Lupine, Malzkeime, Rapskuchen

Beispiel Milchleistungsfutter 18/4

• Weizen	20 %
• Ackerbohnen	16 %
• Erbsen	16 %
• Rapskuchen	15 %
• Körnermais	10 %
• Weizenkleie	10 %
• Gerste	9,5 %
• Mineralfutter (20% Ca, 2% P)	2,2 %
• Melasse	1 %

Eiweißfuttermittel in der Rinderfütterung



https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/publikationen/daten/informationen/eiweissfuttermittel-rinderfuetterung_lfl-information.pdf

Vorsicht: Futtermittel müssen für die Fütterung im Ökologischen Landbau zertifiziert sein



Fütterung Rind

- Mineralstoffe müssen im Anhang V, Spurenelemente im Anhang VI gelistet sein
- Vitamine A, D und E: nach Allgemeinverfügung an Pflanzenfresser verfütterbar
- Der therapeutische Einsatz von B-Vitaminen oder β -Carotin ist erlaubt (Bestätigung Tierarzt)
- Die Verwendung von Wachstumsförderern und synthetischen Aminosäuren ist untersagt
- *In Katastrophenfällen (z.B. Witterung, Brandfolgen) dürfen in einem begrenzten Zeitraum und in einem bestimmten Gebiet mit Genehmigungen der Kontrollbehörde konventionelle Futtermittel eingesetzt werden.*

Fütterung Rind

- Begrenzung (Berechnung der Mindestfläche)
 - 170 kg N / ha nach EU-Öko-VO (Verbände strenger)
→ Futter- Mist- Kooperation
 - Kalkulation für Futterbedarf
 - ~ 5- 6 Rinder / ha Vollweide (entferntere Flächen möglich)
 - ~ 0,33 ha / Kuh in Vollweide
 - 1 Kuh und eine weibliche Nachzucht / ha Futterfläche
- abhängig von Standort und Ertragsrückgang!**

Tiergesundheit Rind



Behandlung im **Krankheitsfall** mit chem.-synthetischen Medikamenten/Antibiotika **uneingeschränkt** möglich, **aber:**

- Kein vorbeugender chem.-synth. Medikamenteneinsatz (Impfung und Entwurmung erlaubt)
- Bevorzugung pflanzlicher und homöopathischer Mittel
- Doppelte Wartezeit nach Einsatz chem.-synth. Arzneimittel (mind. 48 h)
- Max. drei Behandlungen je Jahr und Tier, bei Tieren die älter werden als ein Jahr



Tiergesundheit Rind

- Pauschales antibiotisches Trockenstellen ist nicht erlaubt
- Zitzenversiegler möglich
- selektive Behandlung mit antibiotischem Trockensteller möglich (Vorsicht: Doppelte Wartezeit (nach Kalbung))
- keine systematische Hormonbehandlung
- Propylenglykol nur in Einzelfällen UND medizinische Notwendigkeit

Enthornung

- Das routinemäßige Enthornen ist nicht zulässig, aus Sicherheitsgründen oder zur Verbesserung der Gesundheit kann es jedoch genehmigt werden
- Schmerzmittel + Beruhigungsmittel + Lokalanästhesie (→ nur durch Tierarzt)



Horntragende Milchkuhherden



Quelle: BLE, Jürgen Beckoff

Horntragende Milchkuhherden

- Bei Demeterverband vorgeschrieben
- Höherer Platzbedarf (Richtwert 13 m²/ Kuh)
- Engstellen Vermeiden und Ausweichmöglichkeiten schaffen
- Geeignetes Fressgitter (Pallisadenfressgitter)



Umstellungsablauf Milchviehhaltung

2 Möglichkeiten



➤ getrennter Umstellung:

- Flächen und Tiere werden getrennt voneinander umgestellt

➤ kombinierte (gleichzeitige) Umstellung:

- Flächen und Tiere werden gleichzeitig umgestellt

Umstellungszeiten




- Rinder zur Fleischerzeugung: 12 Monate und mind. $\frac{3}{4}$ ihres Lebens
- Milchproduzierende Tiere: 6 Monate
- Schafe, Ziegen zur Fleischerzeugung: 6 Monate
- Schweine zur Fleischerzeugung: 6 Monate
- Geflügel zur Fleischerzeugung (Zukauf bis 3. Lebenstag) 10 Wochen
- Geflügel zur Eiererzeugung: 6 Woche



Lfi Umstellerbroschüre



Zeitplan für die getrennte Umstellung auf Ökolandbau



Umstellungsfahrplan


Vorteil

getrennte Umstellung:

- 1. Schnitt im Folgejahr bereits als Umstellungsfutter verwendbar
- Bio-Kraftfutter muss erst ab 1.1. zugekauft werden
- Vorhandene Reste von konventionellem Zukaufsfutter dürfen noch verfüttert werden



Lfl, Umstellerbroschüre



Checkliste Umstellungsberatung - Tierhaltung

- Molkerei: Abnahme Biomilch möglich? Anforderungen der Abnehmer? Fleisch...
- 2 tägige Milchabholung, Milchtankgröße, Milchammer?
- Weidehaltung möglich?
- GV-Besatz: max. 170 kg N/ha und Jahr oder Verbandsvorgaben
- Anforderungen Tierhaltung: Mindeststall- und Auslaufflächen, jeweilige Gestaltung; einzelne Tiergruppen durchsprechen, wo sind Umbaumaßnahmen nötig



=> Ökoansprechpartner an den AELFs in Bayern!

BioRegioBetriebsnetz- hingehen und reden!




Bildquellen: Ursula König

Kuh? Weide? Klima?



Anforderungen an die ökologische Schweinehaltung



Bildquellen: Ursula König

Haltungsanforderungen Schwein

- Die Haltungsbedingungen müssen das Ausleben arttypischen Verhaltens ermöglichen dazu gehören das Bewegungs-, Ruhe-, Sozial-, Fortpflanzungs- und Nahrungsaufnahmeverhalten.
- Die Liegeflächen sind für alle Tierarten ausreichend einzustreuen, wobei auf Stroh oder vergleichbare Materialien zurückzugreifen ist.
- Soweit verfügbar, sollen Einstreumaterialien aus ökologischer Bewirtschaftung Verwendung finden.



Haltungsanforderungen Schwein

- Min. 50 % befestigte Fläche (bisher nur Liegefläche **zukünftig auch 50 % der Außenfläche**) Übergänge bis 1.1.2029
- Schweinen ist Auslauf zu gewähren. Anbindung ist verboten
- Zuchtsauen sind in Gruppen zu halten
 - Ausnahme: Säugezeit
- Sauen sollten möglichst frühzeitig in Gruppen gehalten bzw. zusammengeführt werden
- Eber sollte möglichst Kontakt zu Sauen haben
- Schweine brauchen Bewegungsflächen zum Wühlen (Organisches Material wie Stroh)



Haltungsanforderungen Schwein

- Tieren muss neben Innen- auch Auslaufflächen angeboten werden.
- Die Ausläufe dürfen im Abferkelbereich und in der Ferkelaufzucht 100 % überdacht sein, lediglich der Tragebereich als auch der Mastbereich dürfen , max. 75 % überdacht sein
- Keine Weidehaltung vorgeschrieben
- Eingestreuter Liegebereich (Naturmaterial)
- Glatter aber rutschfester Boden



Bildquelle. Matthias Lippl

Eingriffe am Tier

- Routenmäßiges Zähnekneifen und Schwänze kupieren ist verboten
- Ferkelkastration nur zulässig unter Betäubung und Verabreichung eines Schmerzmittels



Quelle: land & forst

Teil III: Besatzdichte, Mindeststallflächen und Mindestaußenflächen für Schweine gemäß Artikel 10

		Stallfläche (den Schweinen zur Verfügung stehende Nettofläche, d. h. Innenmaße einschließlich Futtertrögen, jedoch ohne Futterspender, in denen sich die Schweine nicht hinlegen können)	Außenfläche
	Mindestleibengewicht (kg)	m ² pro Tier	m ² pro Tier
Säugende Sauen mit Ferkeln bis zum Absetzen		7,5 pro Sau	2,5
Mastschweine Absetzferkel, männliche und weibliche Zuchtläufer, Jungsau	bis zu 35 kg	0,6	0,4
	mehr als 35 kg, aber weniger als 50 kg	0,8	0,6
	mehr als 50 kg, aber weniger als 85 kg	1,1	0,8
	mehr als 85 kg, aber weniger als 110 kg	1,3	1
	mehr als 110 kg	1,5	1,2
Weibliche Zuchtschweine Trockengestellte trächtige Sauen		2,5	1,9
Männliche Zuchtschweine Eber		6 10, wenn der Natursprung in Buchten erfolgt	8

Wie viel Platz hat ein Schwein im Stall?*

→ Gesetzlicher Mindeststandard

Kennzeichnung:

→ Staatliches Tierwohlkennzeichen (1. Stufe)

→ Staatliches Tierwohlkennzeichen (2. Stufe)

→ Für mehr Tierschutz (Einstiegsstufe)



→ Staatliches Tierwohlkennzeichen (3. Stufe)

→ Für mehr Tierschutz (Premiumstufe)

→ Neuland

→ EU-Bio

→ Bioland, Naturland, Demeter




■ Stallfläche

■ Auslauffläche
in Quadrat-
meter

* Angaben für ein
100 Kilogramm
schweres Mastschwein.

Mögliche Haltungsformen Zuchtsauen



KTBL-Schrift 484


Mögliche Haltungsformen Zuchtsauen



<https://youtu.be/wNcDAd7Mbm4?feature=shared>
(5min)



Mögliche Haltungsformen Zuchtsauen





Fütterung Schwein

- Ration muss Raufutter enthalten (frische, getrocknete oder silierte Raufuttervorlage oder Stroh)
- 100% Biofutter; Ausnahme: max. 3 % konv. Eiweißfutter in der Trockensubstanz für Tiere bis 35 kg Gentechnik freie Futtermittel
- Kein Einsatz synthetischer Aminosäuren
- mind. 30 % der Futtermittel aus dem Betrieb/ Region

Fütterung Schwein

- Kein Einsatz von Extraktionsschroten
- Säugezeit der Ferkel mind. 40 Tage

Tierzukauf

organic
Xlivestock

Datenbank für ökologische Tiere - Deutschland - Gast

Sprache ▼ Menü ▼

AquakulturBieneEnteGansGeweihtträgerHuhnKaninchenPuteRindSchafSchweinZiegeSonstige Tiere

Herzlich Willkommen bei organicXlivestock



organic
Xlivestock

Wichtiger Hinweis: nur angemeldete Benutzer*innen können öko-Tiere anbieten und Ausnahmegenehmigungen für den konventionellen Tierzukauf beantragen

Bei Ihrem Konto anmelden

Zum ersten Mal bei uns?
Registrieren!

Nach Öko-Tieren suchen ▼

Länderauswahl

Tiergesundheit Schwein/ Eingriffe am Tier

Behandlung im Krankheitsfall mit chem.-synthetischen Medikamenten/Antibiotika uneingeschränkt möglich, aber:

- Kein vorbeugender chem.-synth. Medikamenteneinsatz (Impfung und Entwurmung erlaubt)
- Doppelte Wartezeit nach Einsatz chem.-synth. Arzneimittel (mind. 48 h)
- Keine systematische Hormonbehandlung
- max. 3 antibiotische Behandlungen/Jahr bei Tieren, die älter als ein Jahr werden;
- Achtung! Nur 1 Behandlung möglich, wenn Lebenszyklus kleiner 1 Jahr

Tiergesundheit Schwein/ Eingriffe am Tier

- Künstliche Besamung ist erlaubt
(Natursprung wird empfohlen)
- Haltung vitaler, robuster Rassen
- Bevorzugung pflanzlicher und homöopathischer Mittel

Tierbesatz

Tierbesatz im Durchschnittsbestand:

- maximal 6,5 Zuchtsauen/ha (inkl. Ferkel bis 30 kg)
- maximal 14 Mastschweine/ha, nach den Richtlinien der Öko-Verbände maximal 10 Mastschweine/ha

Reinigung und Desinfektion

- Ställe dürfen nur mit nach Ökorichtlinien zugelassenen Mitteln gereinigt und desinfiziert werden!

Umstellung Schwein

Üblicherweise: **getrennte Umstellung**

- Abschluss Kontrollvertrag für den Pflanzenbau vor Beginn der Ernte des Getreides im Sommer (01.07.)
- Abschluss des Kontrollvertrages für die Tierhaltung zum 01.01 im Folgejahr mit Abschluss KULAP O10
 - Konventionelles Futter darf nach dem Kontrollvertrag bezüglich der Tierhaltung nur noch aufgebraucht, jedoch nicht mehr zugekauft werden und nicht an ökologisch zu vermarkende Tiere verfüttert werden
 - Wenn die Fütterungs- und Haltungsanforderungen erfüllt sind, können Ökoferkel aufgestellt bzw. die geborenen Ferkel als Ökoferkel aufgestellt oder verkauft werden.

Für sich Sorge tragen!



Anforderungen an die ökologische Geflügelhaltung



Bildquellen: Ursula König

<https://youtu.be/oEan35h0hYE?feature=shared>

(Kurzfilm-betrieblicher Rundgang mit Erklärungen der Öko Vorgaben, sowie Entwicklungsmöglichkeiten
(ca. 12 min)

Haltungsanforderungen Geflügel

- mind. 1/3 befestigte Bodenfläche mit Einstreu (Naturmaterial wie Stroh, Holzspäne)
- Geflügel muss während mindestens eines Drittels seiner Lebensdauer Zugang zu Freigelände haben (vom frühestmöglichen Alter an tagsüber uneingeschränkten)
- Freigelände für Geflügel muss überwiegend aus einer Vegetationsdecke bestehen

Ausläufe...



Haltungsanforderungen Geflügel

- In einem einzelnen Stallabteil eines Geflügelstalls dürfen nicht mehr als 3 000 Legehennen gehalten werden
- Obergrenze Gesamtnutzfläche von Ställen für die Geflügelmast (maximale Tierzahl)
- Künstliche Beleuchtung erlaubt (max. 16 Stunden/ Tag)
- Mindestschlachtalter: 81 Tage bei Hühnern aus schnell wachsender Genetik

Platzvorgaben Geflügel

Geflügelart	Stallfläche (zur Verfügung stehende Nettofläche)		Außenfläche (bei Flächenrotation je Tier zur Verfügung stehende Fläche in m ²)
	Anzahl Tiere/m ²	cm Sitzstange/Tier	
Legehennen	6 *)	18	4 (max. 170 kg N/ha/Jahr)
Mastgeflügel in <u>festen</u> Ställen	10, maximales Lebendgewicht 21 kg/m ²	20 (nur Perlhühner)	4 (Masthähnchen u. Perlhühner) 4,5 (Enten) 10 (Truthühner) 15 (Gänse) (max. 170 kg N/ha/Jahr)
Mastgeflügel in <u>beweglichen</u> Ställen	16 **) maximales Lebensgewicht 30 kg/m ²		2,5, (max. 170 kg N/ha/Jahr)

*) Bei Volierenställen ist der max. Tierbestand 12 Tiere je m² Stallgrundfläche

**) Nur in beweglichen Ställen mit einer Bodenfläche von höchstens 150 m², die nachts offen bleiben

Kaltscharraum



Quelle: Nutztierhaltung.de



Legehennen

Anforderung	Ökohaltung	Konventionelle Haltung
Besatzdichte: Tiere / m ²	6	9
Nestfläche: Tiere / m ²	83,33	120
Sitzstangenlänge: cm/Tier	18	15
Auslauffläche: m ² / Tier	4	4/0
Tiere/ Abteil	3000 (Blickdicht)	6000

Anzengruber Andreas

Nester: 7 Hennen pro Nest
Mastgeflügel auch Sitzstangen

Wie werden Legehennen in Deutschland gehalten?



jede siebte Legehennen nach
Öko-Richtlinien gehalten




Bundesinformationszentrum
Landwirtschaft

Quelle: Statistisches Bundesamt
© 2023 BLE




Wie viel Platz hat eine Legehenne im Stall?



- Stallfläche pro Tier in Quadratmetern
- Auslauffläche pro Tier in Quadratmetern

Anteil der jeweiligen Haltungsform an der Legehennenhaltung insgesamt



Bundesinformationszentrum
Landwirtschaft

Quelle: Statistisches Bundesamt

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Abensberg- Landshut



Fütterung Geflügel

- Kein Einsatz synthetischer Aminosäuren
- Mind. 30 % der Futtermittel aus dem Betrieb / Region
- 100% Biofutter;



Legehennenfütterung, Lfl

Ausnahme: Max. 5 % konv. Futter für Junggeflügel möglich (Junghennen) Einsatz nur, wenn keine vergleichbaren Öko-Futtermittel verfügbar (Ende 2026)

- Es muss strukturiertes Futter wie Gras, Stroh, Heu oder Grassilage angeboten werden, das dem Bedürfnis nach Picken, Zupfen, Zerreißen genüge tut
- Keine Extraktionsschrote
- Nur GVO freie Futtermittel

Fütterung Geflügel

- Calcium- und Energiegehalte im Futter beeinflussen Futteraufnahme
- Erstlimitierende Aminosäuren bei Geflügel Methionin, dann Lysin!

Futtermittel	ME	Rohprot.	Rohfett	Rohfaser	Lysin	Meth.	Calcium
	MJ / kg	g / kg Originalsubstanz					
Mais	13,75	77	40	22	2,4	1,6	0,4
Weizen	12,78	126	18	27	3,3	1,8	0,5
Triticale	12,59	118	13	18	3,6	1,9	0,5
Gerste, Winter	11,43	106	16	37	3,9	1,8	0,8
Hafer	10,25	111	51	79	4,3	1,7	1,1
SojaES, HP	10,43	475	16	36	29,2	6,4	3,0
SojaES, Normtyp	10,17	443	13	59	27,3	6,1	3,0
RapsES	8,32	344	20	122	18,1	6,8	6,9
Sonnenbl.ES geschält	8,02	399	20	124	14,8	9,3	3,8
DDGS (Wei.schlempe)	8,40	328	58	76	6,7	4,8	0,4
Luzernegrünmehl	6,06	196	32	200	6,6	1,9	15,5
Grasgrünmehl	5,41	162	37	170	7,0	2,5	8,0
Maiskleber	13,69	630	46	11	10,0	14,5	0,7
Kartoffeleiweiß	14,56	754	20	6	58,5	16,7	-
Bierhefe	1,40	441	8	18	26,3	6,0	2,9
Erbsen	11,03	220	16	55	15,4	1,9	0,9
Süßlupinen	8,00	314	76	121	16,6	2,1	1,8
Süßlupinen	8,25	366	58	159	17,9	2,3	1,8
Ackerbohne	10,79	258	15	69	16,1	1,8	1,4
Sojavollbohne	13,84	350	179	55	22,1	4,8	2,8
Weizenkleie	6,17	146	47	103	6,3	2,3	1,5

Futtermittel	ME	Rohprot.	Rohfett	Rohfaser	Lysin	Meth.	Calcium
	MJ / kg	g / kg Originalsubstanz					
Mais	13,75	77	40	22	2,4	1,6	0,4
Weizen	12,78	126	18	27	3,3	1,8	0,5
Triticale	12,59	118	13	18	3,6	1,9	0,5
Gerste, Winter	11,43	106	16	37	3,9	1,8	0,8
Hafer	10,25	111	51	79	4,3	1,7	1,1
SojaES, HP	10,43	475	16	36	29,2	6,4	3,0
SojaES, Normtyp	10,17	443	13	50	27,3	6,1	3,0
RapsES	8,32	344	20	122	18,1	6,8	6,0
Sonnenbl.ES geschält	8,02	309	20	124	14,8	0,2	2,8
DDGS (Wei.schlempe)	8,40	328	58	76	6,7	4,8	0,4
Luzernegrünmehl	6,06	196	32	200	6,6	1,9	15,5
Grasgrünmehl	5,41	162	37	170	7,0	2,5	8,0
Maiskleber	13,69	630	46	11	10,0	14,5	0,7
Kartoffeleiweiß	14,56	754	20	6	58,5	16,7	-
Bierhefe	1,40	441	8	18	26,3	6,0	2,9
Erbsen	11,03	220	16	55	15,4	1,9	0,9
Süßlupinen	8,00	314	76	121	16,6	2,1	1,8
Süßlupinen	8,25	366	58	159	17,9	2,3	1,8
Ackerbohne	10,79	258	15	69	16,1	1,8	1,4
Sojavollbohne	13,84	350	179	55	22,1	4,8	2,8
Weizenkleie	6,17	146	47	103	6,3	2,3	1,5

Verfügbarkeit
???

Fütterung Geflügel

Futtermittel	Ursache der Limitierung	Höchstanteile
Rapsextraktionsschrot (00-Sorten)	Sinapin, Glucosinolate	10 - 15 %
Rapskuchen	Sinapin, Glucosinolate	5 %
Sonnenblumenextraktionsschrot	Rohfaser, Energie	15 %
Sonnenblumenkuchen	Rohfaser, Energie	15 %
Erbsen	Tannine, SAS	20 – 30 %
Ackerbohnen	Tannine, Lectine, Vicin, Convicin, SAS	10 % (-20 %)
Süßlupinen	Energie, SAS	15 %
getrocknete Weizenschlempe	Rohfaser, NSP, Verdaulichkeit	10-12 %

Quelle: JEROCH & DÄNICKE (2016), KAMPHUES et al. (2014), JEROCH et al. (2012), SAS: schwefelhaltige Aminosäuren (Methionin, Cystin)

Fütterung Geflügel




Abb. 26: absolute Aminosäuregehalte je kg Futtermittel im Vergleich

Quelle: JEROCH & DÄNICKE (2016)

Fütterung Geflügel

Ökolandbau keine synthetischen Aminosäuren erlaubt

Lösung?:

- Niedrigere Energiegehalte des Futters (10,2-11,0 MJ ME)
=> höhere Futteraufnahme
- Höheren Rohproteinanteil im Futter aber Umweltbelastungen
- Andere Legerassen/ Zweinutzungshuhn
- Bisher Einsatz von 5 % konventionellen Eiweißfuttermitteln
(Kartoffeleiweiß und Maiskleber)

Konsequenzen

Methioninmangel:

- Niedrigere Eigewichte
- Niedrigere Ausstattungsgegewichte

Niedrigere Futteraufnahme wegen Geschmackseigenschaften der Komponenten

Höhere Wasseraufnahme zur Entgiftung (XP)

- Feuchtere Einstreu
- Mehr Schmutzeier



Anzengruber Andreas

Fütterung Geflügel

Wichtig:

- Futteruntersuchungen
- Selber mischen

Weitere Vorgaben

- Lebensdauer von Masthühner min. 56 Tage
- Routinemäßiges Schnäbelstutzen verboten

Bruderhahn



Quelle: Bruderhahn Initiative Deutschland e.V

Bruderhahn

- Hähne haben bei den Hochgezüchteten Legerassen nur geringe Tageszunahmen
- Sie eignen sich nicht für eine wirtschaftliche Hähnchenmast
- Lange Zeit wurden die Hähne daher kurz nach der Geburt getötet und als Tierfutter verkauft: **verboten**
- Aktuell: In- Ovo- Selektion: Geschlechtsbestimmung im Ei zur Vermeidung männlicher Küken: **erlaubt**

Bruderhahn

- Öko- Anbauverbände erlauben die Geschlechtsbestimmung im Ei nicht
 - Aufzucht der anfallenden „Bruderhähne“ ist Pflicht
 - Deutlich längere Mastdauer und Futterverbrauch
- Durch Aufschlag auf den Eierpreis wird die Aufzucht der Bruderhähne quersubventioniert
- Zweinutzungsrassen nutzen!



Gliederung



1. Grundlagen und Ziele der ökologischen Tierhaltung
2. Anforderungen an die ökologische Rinderhaltung
3. *Anforderungen an die ökologische Schweinehaltung*
4. *Anforderungen an die ökologische Geflügelhaltung*

5. Bayerisches Biosiegel und BayProTier



Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus



Video „Streue“ anstatt Stroh!

für Tiefstreu-, Tretmist-, Kompostställe

Ein Praktiker berichtet!

Video zeigen ...

Bayerisches Programm Tierwohl (BayProTier)

Ziel des BayProTier ist die
Verbesserung des Tierwohls in der Nutztierhaltung

Dieses Bayerische Programm `funktioniert`
vergleichbar wie das KULAP im Pflanzenbau,

d. h. dabei werden verschiedene Mehraufwendungen,
z. B. Kosten für zusätzliche Arbeit oder Einstreu,
gefördert.

Förderwegweiser des StMELF



BayProTier

- Beantragung für Zuchtsauenhaltung, Ferkelaufzucht, Mastschweinehaltung sowie die Haltung von **Mast- und Aufzuchtrindern**
- Antragsstellung: vor. Juni 2025
- Verpflichtungszeitraum: 1.7.2025 - 30.6.2026
- Förderobergrenzen:
 - 560 Zuchtsauen
 - 2.500 Ferkelaufzuchtplätze
 - 1.500 Mastschweineplätze **und**
 - **360 GV Mast- und Aufzuchtrindern** pro Betrieb

Voraussetzung



- Fördervoraussetzungen sind eingehalten
- In Richtlinie geforderten Haltungsbedingungen und Auflagen werden einhalten
(z.B. Schweine: Mindestallflächen, Außenklimareiz, Schalen- oder Beckentränke)
keine Liegeboxenlaufställe- **sondern Tiefstreu-, Tretmist-, Kompostställe!**
- Teilnahme Qualitätsregelung
(GQ Bayern, Bayerisches Biosiegel)
- betriebliche Stellungnahme vom LKV oder der QAL
(Ausnahme Kleinbetriebe und Ökobetriebe) vorgelegt



Förderhöhen BayProTier (neu 2024/25)

Modul	Komfortstufe	Premiumstufe
Schweinehaltung		
Deckstall	50,00 € je ZS	90,00 € je ZS
Wartestall	15,00 € je ZS	30,00 € je ZS
Abferkelstall	60,00 € je ZS	110,00 € je ZS
Ferkelaufzucht	9,00 € je AF-Platz	32,00 € je AF-Platz
Mastschweine	70,00 € je MS-Platz	
Rinderhaltung		
Mast- und Aufzuchtrinder	220,00 € je GV	

ZS (produktive Zuchtsau,) AF (Absatzferkel), MS (Mastschwein), GV (Großvieheinheit)

BayProTier



- Weitere Informationen stehen im Förderwegweiser des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter nachfolgendem Link

<https://www.stmelf.bayern.de/foerderung/bayerisches-programm-tierwohl-bayprotier/index.html>

...Merkblatt, die Richtlinie, Informationen zur Antragstellung, ein Belegungsplan, die Checklisten und deren Ausfüllhinweise zum Einhalten der Kriterien...



Wir sind noch für Sie da!



Fragen ?

Wenden Sie sich gerne bei weiteren Fragen
an Ihr örtliches
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten