الأستاذ فيصل خليفي

الأستاذ فيصل خليفي مستوى نموذجي	المستوى: 7 أساسي السنة الدراسيّة: 2026 - 2027

إصلاح سلسلة عدد 4

الحساب بأيسر طريقة - مجموع أعداد متتالية - المقارنة والقيم التّقريبيّة - الموسّط العمودي - المماس

⭐ مستوى نموذجي - ما قبل فرض المراقبة عدد 1 ⭐

التّمرين 1

1) ب: 100 000 = 1 + 99 999.

2) أ: 204 626 = 2 026 + 202 600 = 2 026 × 1 + 2 026 × 100 = 2 026 × 101.

3) ب: الأرقام مختلفة، نضع أكبر الأرقام من اليسار: 98 765.

4) ج: الموسّط العمودي لقطعة هو مجموعة النّقاط المتقايسة البعد عن طرفيها.

التّمرين 2

A = (4 783 + 5 217) + (2 500 × 3) = 10 000 + 7 500 = 17 500 (التّبديل والتّجميع).

B = 2 × [(1 + 10) + (2 + 9) + (3 + 8) + (4 + 7) + (5 + 6)] = 2 × (5 × 11) = 2 × 55 = 110

C = 365 × (20 + 4) = 365 × 20 + 365 × 4 = 7 300 + 1 460 = 8 760

D = 37 × (999 + 1) = 37 × 1 000 = 37 000

E = 8 765 − 1 000 + 1 = 7 766

التّمرين 3

1) 31 = … = 29 + 2 = 30 + 1، وعدد الأزواج 15 = 2 ÷ 30، إذن S = 15 × 31 = 465.

2) الأعداد الفرديّة من 1 إلى 39 عددها 20. 40 = … = 37 + 3 = 39 + 1 وعدد الأزواج 10، إذن T = 10 × 40 = 400.

3) كلّ عدد زوجي يساوي العدد الفردي الذي قبله زائد 1: 1 + 1 = 2، 1 + 3 = 4، …، 1 + 39 = 40. إذن U = T + 20 × 1 = 400 + 20 = 420.

تثبّت: U = 2 × (1 + 2 + … + 20) = 2 × 210 = 420.

التّمرين 4

1) 7 997 < 70 097 < 70 907 < 70 970 < 79 007

2) إلى المائة: 68 500 (لأنّ رقم العشرات 5). إلى الألف: 68 000 (لأنّ رقم المئات 4 أصغر من 5).

3) العدد 3d7d: يجب 3 300 ≤ 3d7d ≤ 3 600 إذن d = 3 أو d = 4 أو d = 5: الأعداد 3 373 و 3 474 و 3 575.

التّمرين 5

1) 5 × 24 = 120 تلميذا.

2) 120 − (37 + 46) = 120 − 83 = 37 تلميذا يمارسون كرة اليد.

3) 2 + 5 × 7 = 37: نكوّن 5 فرق كاملة ويبقى تلميذان.

التّمرين 6

2) أ) E نقطة من الموسّط العمودي لـ [AB] إذن EA = EB.

ب) محيط AEC: AC + EC + EB = AC + EC + EA (لأنّ E تنتمي إلى [BC])، إذن المحيط 12 = 5 + 7 صم.

3) Δ و Δ′ عموديّان على نفس المستقيم (AB)، إذن Δ // Δ′.

4) البعد بين C و (AB) هو CH حيث H المسقط العمودي لـ C على (AB).

5) (AB) عمودي على (CF) في H منتصف [CF]، إذن (AB) هو الموسّط العمودي لـ [CF]. A و B تنتميان إليه، إذن AF = AC = 5 و BF = BC = 7.

التَمرين 7

1) $AB = 2 \times 3 = 6$

2) Δ عمودي على [OA] أي على (AB)، و Δ' عمودي على (AB) كذلك، إذن $\Delta \,//\, \Delta'$. والبعد بينهما $AB = 6$.

3) ب) (AB) عمودي على Δ أي على (MP) في A منتصف [MP]، إذن (AB) هو الموسّط العمودي لـ [MP]. و O تنتمي إلى (AB) إذن $OM = OP$.

4) $OM = 5$ يساوي شعاع (C″) إذن M تنتمي إلى (C″)، وكذلك P لأنّ $OP = OM = 5$. المستقيم Δ يقطع (C″) في نقطتين M و P (بعد O عن Δ هو $OA = 3$ وهو أصغر من 5).

بالتّوفيق للجميع

للمزيد من السّلاسل والدّروس التّفاعليّة: Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel |
Instagram : instagram.com/faycel_khlifii