الأستاذ فيصل خليفي

الأستاذ فيصل خليفي مستوى نموذجي	**المستوى: 7 أساسي** السنة الدراسيّة: 2026 - 2027

إصلاح سلسلة عدد 5

العمليّات في ℕ - العدد المجهول - وضعيّات - الموسّط العمودي وشبه المنحرف والدّائرة

⭐ مستوى نموذجي - ما قبل فرض المراقبة عدد 1 ⭐

التّمرين 1

1) أ) 1 000 : 1 000 = 1 789 – 2 789 = (3 456 + 1 789) – (3 456 + 2 789).

ب) 120: إذا أضفنا نفس العدد إلى الحدّين لا يتغيّر الفرق.

ج) الموسّط العمودي لـ [AB]: لأنّ OA = OB (شعاعان).

2) $a - (b - 97) = (a - b) + 97 = 197$ ؛ $(a - 89) - (b - 89) = a - b = 100$ ؛ $a - (b + 37) = (a - b) - 37 = 63$

التّمرين 2

1) $A = 587 - 187 + 98 = 400 + 98 = 498$

$B = 2\,113 + 56 + 1\,887 - 56 = (2\,113 + 1\,887) + (56 - 56) = 4\,000$

$C = 187 \times (93 + 7) + 17 \times (127 + 83) = 187 \times 100 + 17 \times 210 = 18\,700 + 3\,570 = 22\,270$

2) $a = 115 - 35 = 80$ ؛ $a = 156 - 56 = 100$ ؛ $a - 9 = 25$ إذن $a = 34$

التّمرين 3

1) الثّاني: $2\,500 - 300 = 2\,200$. الثّالث: $1\,250 - 300 = 950$. دينارا. $2 \times 1\,250 + 2\,200 = 4\,700$ دينارا.

2) المبلغ في البداية: $1\,000 + 3\,450 + 2\,200 + 1\,250 = 7\,900$ دينار.

التّمرين 4

2) Δ و Δ′ عموديّان على نفس المستقيم (BC) إذن Δ // Δ′. في الرّباعي (AJIE): (AJ) // (EI) (لأنّهما محمولان على Δ′ و Δ)، إذن له ضلعان متوازيان فهو شبه منحرف.

3) ب) (BC) عمودي على (AF) في J منتصف [AF]، إذن (BC) هو الموسّط العمودي لـ [AF].

ج) B و C تنتميان إلى الموسّط العمودي لـ [AF] إذن $BA = BF = 3$ و $CA = CF = 5$. محيط ABFC: $5 + 5 + 3 + 3 = 16$ صم.

4) $IB = IC = 6 \div 2 = 3$ = الشّعاع، إذن B و C تنتميان إلى (C). Δ يمرّ من I مركز الدّائرة، فهو يقطعها في نقطتين، إذن لا يمكن أن يكون مماسّا لها (المماس لا يمرّ من المركز).

5) M تقاطع Δ مع الموسّط العمودي لـ [AB]: M على الموسّط العمودي لـ [AB] إذن MA = MB، و M على Δ الموسّط العمودي لـ [BC] إذن MB = MC. إذن MA = MB = MC.

بالتّوفيق للجميع