

# Métodos numéricos

Diego Alejandro Becerra Becerra

Universidad ECCI

*dbecerrab@ecci.edu.co*

13 de febrero de 2026

## Distribución temática del curso:

- **Aproximación de raíces y solución de sistemas:** Semana 1 a la semana 5 **33 %**
- **Interpolación e integración numérica:** Semana 6 a la semana 10 **33 %**
- **Diferenciación numérica y ecuaciones diferenciales ordinarias:** Semana 11 a la semana 16 **34 %**

- Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Sauer, T. (2013). *Análisis numérico* (2.ª ed.). Pearson Education.
- Kincaid, D., & Cheney, W. (2008). *Numerical Analysis and Computing* (6th ed.). Thomson.
- Suli, E., & Mayers, D. (2003). *An Introduction to Numerical Analysis*. Cambridge University Press.

# Plan de trabajo – Primer corte

- **Semana 1**

Presentación del curso y acuerdos pedagógicos.

Aproximación y errores de redondeo: redondeo, truncamiento, errores absolutos y relativos.

- **Semana 2**

Aproximación de raíces: Método de Bisección, Regula Falsi, Punto Fijo y Newton-Raphson.

- **Semana 3**

Método de Newton-Raphson.

Métodos iterativos para sistemas lineales: Jacobi y Gauss-Seidel.

- **Semana 4**

Métodos iterativos para sistemas lineales: Relajación.

Métodos iterativos para sistemas no lineales: Método de Newton.

- **Semana 5**

Entrega de taller resuelto, Examen Parcial 1 y avance del trabajo escrito aplicado.

# ¿Qué aprenderemos en Métodos Numéricos?

Aprenderemos a transformar modelos matemáticos en algoritmos computacionales.

Para poder resolver:

- Ecuaciones que no se pueden despejar
- Sistemas muy grandes
- Modelos dependientes del tiempo
- Problemas reales de ingeniería

# ¿Cómo se resuelven realmente los problemas en ingeniería?

En ingeniería no basta con observar.

Tampoco basta con conocer teoría.

Los problemas reales se resuelven con un doble enfoque:

**Datos (empirismo)                      +                      Teoría (modelos)**

Cuando ese modelo se vuelve complejo...

**entra en juego los métodos numéricos y la  
computadora.**

# ¿Qué es un modelo matemático?

Un modelo matemático describe un sistema mediante una relación:

Variable dependiente =  $f$ (variable independiente, parámetros)

Ejemplo:

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

# Cuando el modelo se puede resolver exactamente

Dada la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

Se puede resolver fácilmente integrando:

$$y = \int 2x \, dx$$

$$y = x^2 + C$$

Aquí obtenemos la **familia de soluciones exactas**.



# ¿Qué ocurre si existe una condición inicial?

Si se conoce un valor inicial:

$$y(0) = 1$$

Sustituimos en la solución general:

$$y = x^2 + C$$

$$1 = 0^2 + C \Rightarrow C = 1$$

La solución particular es:

$$y = x^2 + 1$$

Ya no es una familia, ahora es **una única solución**.

# La pregunta clave

Dada la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = e^{-x^2}$$

La pregunta no es:

“no se puede resolver”

La pregunta correcta es:

¿POR QUÉ no se puede resolver  
analíticamente?

# Intentando el método de sustitución

Miremos la integral:

$$\int e^{-x^2} dx$$

Supongamos que hacemos la sustitución:

$$u = -x^2 \quad \Rightarrow \quad du = -2x dx \quad \Rightarrow \quad dx = -\frac{du}{2x}$$

Sustituimos en la integral:

$$\int e^u dx = \int e^u \left( -\frac{du}{2x} \right) = -\frac{1}{2} \int \frac{e^u}{x} du$$

¡Aquí aparece el problema! Aparece una  $x$  en el denominador que \*\*no se puede expresar en términos de  $u$ \*\* de manera simple:

$$x = \sqrt{-u} \quad \text{o} \quad x = -\sqrt{-u}$$

# Conclusión sobre sustitución

- La sustitución falla porque no podemos escribir toda la integral solo en función de  $u$ . - Esto significa que  $\int e^{-x^2} dx$  \*\*no tiene solución cerrada\*\* usando funciones elementales.
- Sin embargo, \*\*sí se puede calcular aproximadamente con métodos numéricos\*\*, como:
  - Regla del trapecio
  - Regla de Simpson

# Ejemplo de aproximación numérica

Queremos calcular:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

Dividimos el intervalo  $[0, 1]$  en  $n = 4$  subintervalos de ancho  $h = 0,25$ .  
La regla del trapecio dice:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \frac{h}{2} \left( f(0) + 2f(0,25) + 2f(0,5) + 2f(0,75) + f(1) \right)$$

Valores de la función en cada punto:

$$\begin{aligned}f(0) &= 1, \\f(0,25) &\approx 0,9394, \\f(0,5) &\approx 0,7788, \\f(0,75) &\approx 0,5698, \\f(1) &\approx 0,3679\end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en la fórmula del trapecio:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \frac{0,25}{2} \left( f(0) + 2(f(0,25) + f(0,5) + f(0,75)) + f(1) \right)$$

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0,7468$$

- Con más subintervalos, la aproximación mejora significativamente.

-  $\int e^{-x^2} dx$  \*\*no tiene solución cerrada\*\*. - La sustitución falla porque no se puede expresar todo en función de  $u$ . - \*\*Se puede aproximar con métodos numéricos\*\*, obteniendo valores muy cercanos al real. - Métodos numéricos son fundamentales cuando la integral no se puede expresar en forma explícita.

# ¿Dónde aparecen los métodos numéricos?

Cuando el modelo es:

- No lineal
- Grande
- No ideal
- Dependiente del tiempo

Aquí ya no sirve el álgebra.

Sirven los algoritmos.



# Aproximación y errores de redondeo

Hasta ahora vimos:

- Algunos modelos matemáticos **no tienen solución exacta**.
- Podemos usar **métodos numéricos** para obtener aproximaciones.

## Pregunta clave

Al trabajar con aproximaciones, **nunca obtenemos el valor exacto**.

¿Qué tan confiable es nuestra aproximación?

Conceptos importantes:

- Error absoluto y error relativo
- Errores por redondeo y truncamiento
- Cifras significativas para controlar la precisión

# ¿Por qué estudiar el error en Métodos Numéricos?

Los métodos numéricos no entregan soluciones exactas, sino aproximaciones.

## Ejemplo práctico

Solución exacta:

$$x = 2,7182818$$

Resultado numérico:

$$x_a = 2,72$$

**Discrepancia:** existe una diferencia llamada **error**.

## Reflexión clave en ingeniería

No se trata de eliminar el error, sino de:

**¿Qué tan grande es el error y es tolerable para el problema?**

# Limitaciones de los números en la computadora

Los números en una computadora se almacenan en **punto flotante**. Esto implica dos limitaciones fundamentales:

- 1 El rango de números representables es **limitado**.
- 2 Solo puede almacenarse un **número finito de cifras significativas**.

## Consecuencias

- Números muy grandes producen **overflow**.
- Números muy pequeños producen **underflow**.
- Muchos números reales no pueden representarse exactamente.

# Error absoluto y error relativo

## Definiciones

- **Error absoluto:** Diferencia en magnitud entre el valor exacto y el valor aproximado.
- **Error relativo porcentual:** Relación entre el error absoluto y el valor exacto, expresado en porcentaje.

Si el valor exacto es  $x$  y el aproximado es  $x_a$ :

$$E_a = |x - x_a| \quad E_r(\%) = \frac{|x - x_a|}{|x|} \times 100$$

## Ejemplo explicado

Valor exacto:  $x = 50$

Valor aproximado:  $x_a = 47$

$$E_a = |50 - 47| = 3$$

Esto significa que el valor aproximado se aleja **3 unidades** del valor real.

# Cálculo del error absoluto y relativo

Usando la regla del trapecio con  $n = 4$  subintervalos, obtuvimos:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0,7468$$

**Valor real (usando software o tablas):**

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0,746824$$

## Cálculo del error

Error absoluto:  $E_a = |0,746824 - 0,7468| \approx 0,000024$

Error relativo:  $E_r = \frac{0,000024}{0,746824} \approx 3,2 \times 10^{-5} \approx 0,0032 \%$

*Interpretación:* Con solo 4 subintervalos, la aproximación es muy cercana al valor real y el error relativo es prácticamente despreciable.

# ¿Qué son las cifras significativas?

Las **cifras significativas** son los dígitos de un número en los que se puede confiar.

## Ejemplo del velocímetro

Si el velocímetro marca entre 48 y 49 km/h, no es correcto decir:

48,8642138 km/h

Lo razonable es afirmar:

48,5 km/h

Los dos primeros dígitos son seguros y el tercero es estimado.

**Idea clave:** Un número no es exacto, sino una aproximación confiable hasta cierto número de dígitos.

# Reglas y uso de cifras significativas en métodos numéricos

**Idea clave:** No todos los ceros indican precisión en un número.

## 1) Ceros a la izquierda no son significativos

$$0,0001845 = 1,845 \times 10^{-4}$$

Los ceros desaparecen en notación científica, por lo tanto no aportan información del valor.

Las cifras significativas son: 1, 8, 4, 5  $\Rightarrow$  4 cifras significativas.

## 2) En números grandes existe ambigüedad

$$45300 \quad (\text{¿3, 4 o 5 cifras significativas?})$$

No es posible saber si los ceros finales son exactos o producto de un redondeo.

**La ambigüedad se elimina con notación científica:**

$$4,53 \times 10^4 \quad (3 \text{ cifras})$$

$$4,530 \times 10^4 \quad (4 \text{ cifras})$$

# Error por redondeo

## Definición

El **redondeo** aproxima un número al valor representable más cercano según una cantidad fija de cifras significativas.

## Regla de redondeo

- Si el dígito siguiente es  $\geq 5$ , se aumenta en una unidad la última cifra conservada.
- Si el dígito siguiente es  $< 5$ , la última cifra conservada se mantiene igual.

## Ejemplo

Redondear  $\pi = 3,141592$  a 4 cifras significativas:

Primeras 4 cifras: 3,141

El siguiente dígito es 5  $\Rightarrow$  se redondea hacia arriba:

$$3,141592 \approx 3,142$$



# Error por redondeo: errores absoluto y relativo

## Ejemplo

Redondear  $\pi = 3,141592$  a 4 cifras significativas.

Primeras 4 cifras: 3,141

El siguiente dígito es 5  $\Rightarrow$  se redondea hacia arriba:

$$x_a = 3,142$$

## Cálculo de errores

Valor exacto:

$$x = 3,141592$$

$$E_a = |x - x_a| = |3,141592 - 3,142| = 0,000408$$

$$E_r = \frac{E_a}{|x|} = \frac{0,000408}{3,141592} \approx 0,0001299$$

$$E_r \approx 0.01299\%$$

# Error por truncamiento

## Definición

El **truncamiento** consiste en cortar el número después de cierta cantidad de cifras significativas, **sin aplicar la regla de redondeo**.

## Ejemplo

Truncar  $\pi = 3,141592$  a 4 cifras significativas:

$$x_a = 3,141$$

## Cálculo de errores

Valor exacto:

$$x = 3,141592$$

$$E_a = |x - x_a| = |3,141592 - 3,141| = 0,000592$$

$$E_r = \frac{E_a}{|x|} = \frac{0,000592}{3,141592} \approx 0,0001885$$

# Redondeo vs Truncamiento

Valor real	Redondeo (4 cifras)	Truncamiento (4 cifras)
3.141592	3.142	3.141

$$E_{\text{redondeo}} = 0,000408, \quad E_{\text{truncamiento}} = 0,000592$$

**Conclusión:** Truncar genera mayor error, por eso es preferible redondear correctamente.

# Taller : Error con redondeo

**Valor real:**

$$x = 8,37654$$

Trabaje con **4 cifras significativas** usando **redondeo**.

**Paso 1.** Determine el valor aproximado  $x_a$ .

**Paso 2.** Calcule el error absoluto:

$$E_a = |x - x_a|$$

**Paso 3.** Calcule el error relativo porcentual:

$$E_r(\%) = \frac{|x - x_a|}{|x|} \times 100$$

**Pregunta:** ¿Qué tan grande es el error respecto al valor real?

# Taller : Error con truncamiento

**Valor real:**

$$x = 8,37654$$

Trabaje con **4 cifras significativas** usando **truncamiento**.

**Paso 1.** Determine el valor aproximado  $x_a$ .

**Paso 2.** Calcule el error absoluto:

$$E_a = |x - x_a|$$

**Paso 3.** Calcule el error relativo porcentual:

$$E_r(\%) = \frac{|x - x_a|}{|x|} \times 100$$

**Compare con el taller anterior: ¿En cuál caso el error es mayor?**

# Resultados: Redondeo vs Truncamiento

## Valor real

$$x = 8,37654$$

Trabajando con **4 cifras significativas**

	Redondeo	Truncamiento
Valor aproximado $x_a$	8.377	8.376
Error absoluto $E_a$	0.00046	0.00054
Error relativo $E_r$ (%)	0.00549 %	0.00645 %

## Conclusión

El truncamiento genera un error mayor que el redondeo, por lo tanto reduce más la precisión del cálculo.

