

FROWEIN GMBH &amp; CO. KG

# CONTRAX-D BLOCK

## Verwendung

Bekämpfung von Wander- und Hausratten. Anwendung nur in der Kanalisation durch den berufsmäßigen und / oder sachkundigen Verwender.

Manchmal leben Ratten dort, wo übliche Bekämpfungsmittel unbrauchbar sind. Hierfür wurde der Contrax-D Block entwickelt.

## Typ

Blockköder, Gewicht ca. 100 g.

## Wirkstoff

0,025 g/kg Difethialon. Blutgerinnungshemmer (Antikoagulans) der zweiten Generation.

## Wirkung

Vergiftungen führen zu einer Bewußtseinsstrübung mit gleichzeitig abnehmenden Lebensfunktionen. Aufgrund zunehmender Kapillardurchlässigkeit kommt es zur langsamen, überwiegend inneren Verblutung unter weitestgehendem Ausschluß von Schmerzen.

## Besonderheiten

- Überragende Annahme durch Ratten (insbesondere Wanderratten).
- Gute Beständigkeit gegen Verderb.
- Sichere Wirkung auch bei resistent gewordenen Stämmen.
- Verzögerter Wirkungseintritt verhindert Köderscheu und führt zur restlosen Befallstilgung.
- Sicheres Gegenmittel bei versehentlicher Aufnahme ist Vitamin K<sub>1</sub>.
- Zulassung nach Richtlinie 98/8/EG (Biozid-Richtlinie): DE-2011-MA-14-00002-aa.

## Anwendung und Bedarf

### Aufwandsmengen

Starker Befall: 4 Blöcke befestigt an der Leiter zu jedem Abwasserschacht.

Geringer Befall: 2 Blöcke befestigt an der Leiter zu jedem Abwasserschacht.

Köder müssen in der Art ausgelegt werden, daß das Risiko des Verzehrs durch Nicht-Zielorganismen (Tiere) und Kinder auf ein Minimum beschränkt ist. Köder nach Möglichkeit so sichern, daß sie nicht entfernt werden können.

Der Block-Köder muß so befestigt werden, daß kein leichtes Wegspülen oder eine rasche Verschleppung durch die Zieltiere möglich ist. Die Köder sind oberhalb der Hochwassermarken sicher zu befestigen.

Dazu Blocks mit speziellem Kunststoffhaken (separater Artikel) aufziehen und an Tritteisen pendelfrei befestigen (ggf. mit Verlängerungsdraht).

Contrax-D Block darf niemals wahllos ausgelegt werden.

Das Produkt darf nicht als Permanentköder verwendet werden.

Während der Anwendung des Biozid-Produktes muß regelmäßig nach den durch die Anwendung des Biozids bereits getöteten Zielorganismen gesucht und diese müssen entsorgt werden. Dies muß mindestens so oft geschehen, wie die Köder kontrolliert und / oder nachgelegt werden. Dabei sind die lokalen Anforderungen an die Entsorgung von Tierkadavern zu beachten.

Nach Abschluß der Bekämpfungsmaßnahme sind alle ausgelegten und nicht angenommenen Köder wieder einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.

BIOZIDE



Eine versehentliche Aufnahme durch Kinder, Vögel und andere Tiere (vor allem Hunde, Katzen, Schweine und Geflügel) ist zu verhindern.  
Das Biozid-Produkt ist gefährlich für Wildtiere.

Während der Verwendung des Biozid-Produktes sind die betroffenen Gebiete entsprechend zu kennzeichnen. Zudem sind allgemein verständliche Warnhinweise auf das Risiko der Primär- und Sekundärvergiftung durch Antikoagulantien im Bereich der Anwendung anzubringen und zusätzlich Angaben zu ersten Maßnahmen, die im Falle einer Vergiftung ergriffen werden können, zu machen. Gegenmittel: Vitamin K<sub>1</sub> (unter ärztlicher Kontrolle).

#### **Vorsichtsmaßnahmen**

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Gegenmittel: Vitamin K (unter ärztlicher Kontrolle). Nur im Originalbehälter aufbewahren. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Mißbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

Zur Vermeidung von Risiken von Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.

Contrax-D Block hebt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes auf und erzeugt innere Blutungen. Gefahr kumulativer Wirkung. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Packung dicht verschlossen, kühl und trocken lagern. Nicht über 50 °C erwärmen.

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

**Handschutz:** Bei der Verwendung Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Schichtstärke mindestens 0,4 mm, Durchbruchzeit (Tragedauer) ca. 480 Minuten, z. B. Schutzhandschuhe „Camatril Velours 730“ der Firma KCL.

**Erste Hilfe:** Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen - Gegenmittel: Vitamin K<sub>1</sub> (unter ärztlicher Kontrolle).

#### **Entsorgung**

Anfallende Köderreste und Verpackungen mit Köderresten gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

#### **Verpackung**

Karton mit 13 kg.



**BIOZIDE**



**FROWEIN GMBH & CO. KG**

D-72437 Albstadt, Postfach 201440

D-72461 Albstadt, Am Reislebach 83

Tel. +49 7432 956-0 · Fax +49 7432 956-138

www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de