

FROWEIN GMBH & CO. KG

CONTRAX-TOP BLOC

Verwendung

Rattenbekämpfung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit bzw. im Freien (Kanalisation, Wasserläufe bzw. Uferböschungen, Müllplätze u. ä.).

Manchmal leben Ratten dort, wo übliche Bekämpfungsmittel unbrauchbar sind. Hierfür wurde der Contrax-top bloc entwickelt.

Typ

Blockköder, Gewicht ca. 100 g.

Wirkstoff

0,05 g/kg Bromadiolon. Blutgerinnungshemmer (Antikoagulans) der zweiten Generation.

Wirkung

Vergiftungen führen zu einer Bewußtseinsstrübung mit gleichzeitig abnehmenden Lebensfunktionen. Aufgrund zunehmender Kapillardurchlässigkeit kommt es zur langsamen, überwiegend inneren Verblutung unter weitestgehendem Ausschluß von Schmerzen.

Besonderheiten

- Überraschende Annahme durch Ratten (insbesondere Wanderratten).
- Gute Beständigkeit gegen Verderb.
- Sichere Wirkung.
- Verzögerter Wirkungseintritt verhindert Köderscheu und führt zur restlosen Befallstilgung.
- Sicheres Gegenmittel bei versehentlicher Aufnahme ist Vitamin K₁.

Anwendung und Bedarf

Gebäude

Mehrere Köderstellen an Wänden und in Ecken mit jeweils 2 - 3 Blocks einrichten, und zwar in der Nähe der Baue und Schlupflöcher sowie auf Laufwegen und Futterplätzen.

Die Köderstellen sind nach etwa 7 Tagen zu kontrollieren und nötigenfalls aufzufüllen, bis der Verbrauch aufhört. Die ersten toten Ratten sind nach 3 - 5 Tagen zu finden. Bis zur Befallstilgung können bis zu 2 - 3 Wochen vergehen. Dann Köderreste einsammeln und vorschriftsmäßig beseitigen. Contrax-top bloc nicht in Räumen anwenden, die der Lagerung landwirtschaftlicher Vorratsgüter dienen. Als Köderstation eignet sich die Contrax-Box.

Kanalisation

Im Befallsgebiet jeden Schacht je nach Befallsstärke mit 2 - 4 Blocks belegen. Bei geraden Kanalstrecken ohne Abzweigung genügt es, jeden zweiten Schacht zu belegen. Köderstellen so lange auffüllen, bis nichts mehr angenommen wird. Contrax-top bloc ist vor Wegschwemmen, Verschleppen und vor Nässe zu schützen. Dazu Blocks mit speziellem Kunststoffhaken (separater Artikel) aufziehen und an Tritteisen pendelfrei befestigen (ggf. mit Verlängerungsdraht) oder Blocks auf der Kanalsole aufliegen lassen.

Uferböschungen:

Etwa 1 Block je 50 m Länge.

Mülldeponien:

1 Block je 5 - 10 lfm.

Räume:

1 - 2 Blocks, je nach Befallsstärke.

Vorsichtsmaßnahmen

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

BIOZIDE



Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Mißbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.

Contrax-top bloc hebt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes auf und erzeugt innere Blutungen. Gefahr kumulativer Wirkung. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Gegenmittel: Vitamin K₁.

Köder unerreichbar für Kinder und Haustiere und nicht offen auslegen. Sowohl im Raum als auch im Freiland nur sachgerecht, d. h. nach anwendungstechnischen Grundsätzen auslegen.

Das behandelte Areal ist bis zum Abschluß der Bekämpfung mit entsprechenden Sicherheitshinweisen kenntlich zu machen.

Packung dicht verschlossen, kühl und trocken lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht über 50 °C erwärmen.

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht außerhalb der Kanalisation in Gewässer gelangen lassen.

Entsorgung

Anfallende Köderreste und Verpackungen mit Köderresten gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

Tote oder geschädigte Nager sofort einsammeln und entsprechend den Bestimmungen des Tierkörperbeseitigungsgesetzes beseitigen.

Verpackung

Karton mit 13 kg.



BIOZIDE



FROWEIN GMBH & CO. KG

D-72437 Albstadt, Postfach 201440

D-72461 Albstadt, Am Reislebach 83

Tel. +49 7432 956-0 · Fax +49 7432 956-138

www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de