

Contrax- flüssig

Wirkstoff: Natrium-Warfarin (10,0 g/l)

Flüssigkonzentrat zur Bereitung von Gifttränken gegen Ratten. Besonders geeignet, wo Nahrung trocken ist und Gelegenheit zum Trinken fehlt oder beseitigt wurde. Nur für den berufsmäßigen Verwender.

Giftig für Tiere. Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Gegenmittel: Vitamin K₁. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Contrax-flüssig hebt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes auf und erzeugt innere Blutungen. Berührung mit der Haut vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Nach der Arbeit Hände gründlich waschen. – Tränken unerreichbar für Kinder und Haustiere aufstellen. Tote und geschädigte Nager möglichst täglich einsammeln und beseitigen.

Giftig



Packung frostsicher und dicht verschlossen lagern. Verpackung darf nicht wiederverwendet werden.

Entsorgung: Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

Inhalt: 0,5 Liter – Vor Entnahme schütteln!

Gebrauchsanweisung genau beachten. Da wir keinen Einfluß auf Handhabung und Anwendung haben, haften wir nur für einwandfreie Qualität.

Anwendung: Mit 20facher Wassermenge verdünnen, dann 3 % Zucker zusetzen. Zum Mischen nur saubere Gefäße benutzen. Im Durchschnitt braucht man für 100 m² Fläche 5 – 10 Tränken mit je 0,5 Liter Verdünnung. Beispiel: 200 m² = 10 Tränken = ca. 5 Liter Verdünnung = 5 Liter Wasser + 0,25 Liter Contrax-flüssig + 150 g Zucker.

Vor Entnahme schütteln. Danach roten Schraubverschluß lockern. Flasche langsam drücken, bis Dosierkammer randvoll gefüllt ist. Drücken beenden. Evtl. Überschuß läuft zurück. Eine Dosierkammerfüllung sind 25 ml.

Besonders praktisch zum Aufstellen sind Contrax-Tränken aus Plastik. Aber auch saubere, flache und standsichere Schalen können benutzt werden. Nicht frei in den Raum stellen, sondern in die Laufwege der Nager, an Wänden und Sockeln entlang, in Ecken sowie auch in die Nähe der Fenster, wo die Tiere schwitzende Scheiben ablecken. Andere Trinkmöglichkeiten möglichst beseitigen, dabei auch an Zugang zu Dachrinnen denken. Schalen täglich kontrollieren! Bei halber Entleerung säubern und neu füllen, um eine übermäßige Erhöhung der Wirkstoffkonzentration durch Verdunsten und eine damit verbundene Geschmacksveränderung zu vermeiden.

Contrax-flüssig muß mehrmals in 1 – 2 tägigem Abstand aufgenommen werden. Dabei genügen geringste Mengen. – Die Wirkung ist kumulativ. Pausenlos anbieten, bis der Befall restlos getilgt ist.

Nicht in Räumen anwenden, die der Lagerung landwirtschaftlicher Vorratsgüter dienen.

Volle Wirksamkeit der ungeöffneten Originalpackung bis mindestens 12/2013.

BAuA-Reg.Nr. N-11892.

0079



FROWEIN GMBH & CO. KG
D-72461 Albstadt
Tel. (07432) 9560

Contrax- flüssig