

BONUS 1 · FARMAKOLOJİ HARİTASI

Klinik Farmasi Terimleri Sözlüğü

Sınavda, eczanede ve klinikte en çok geçen terimler, bir bakışta.

Sözlüğü nasıl kullanırsın?

Alfabetik düzen

119 terim alfabetik sıradadır. Her terimin yanında alanı, altında kısa tanımı ve bir örnek bulunur.

Etiket	Alan
farmakokinetik	Vücudun ilaca yaptığı
farmakodinamik	İlacın vücuda yaptığı
klinik	Tedavi ve hasta takibi
eczacılık	Eczane ve ilaç hazırlama
güvenlik	Yan etki, toksisite, etkileşim
düzenleme	Mevzuat ve kurumlar

💡 Takıldığın terimi bul, tanımı oku, sonra Farmakoloji Haritası'nda ilgili bölümün şemasına dön.

A–B

Absorpsiyon FARMAKOKİNETİK

İlacın uygulandığı bölgeden sistemik dolaşıma geçiş sürecidir. Sen emilimin hızını ve miktarını değerlendirirsin.

Örnek: Ağızdan alınan ilacın bağırsaktan kana geçmesi.

Advers ilaç reaksiyonu GÜVENLİK

Bir ilacın normal kullanımında ortaya çıkan zararlı ve istenmeyen yanıtıdır.

Örnek: Antibiyotik kullanımından sonra gelişen alerjik döküntü.

Agonist FARMAKODİNAMİK

Bir reseptöre bağlanarak onu aktive eden ve biyolojik yanıt oluşturan maddedir.

Örnek: Beta reseptörlerini aktive eden bir ilaç.

Akılcı ilaç kullanımı KLİNİK

Hastanın klinik gereksinimine uygun ilacı, bireysel özelliklerine göre belirlenen süre ve maliyetle kullanmasıdır.

Örnek: Enfeksiyonun türüne uygun antibiyotik seçimi.

Albumin bağlanması FARMAKOKİNETİK

İlacın plazma albuminine bağlanmasıdır. Serbest ilaç fraksiyonunu, dağılımını ve farmakolojik etkisini etkileyebilir.

Örnek: Albumine bağlanan ilacın serbest fraksiyonunun azalması.

Antagonist FARMAKODİNAMİK

Reseptöre bağlanarak agonistin reseptör aktivasyonunu engelleyen veya azaltan maddedir.

Örnek: Reseptör aktivasyonunu engelleyen bir ilaç.

Antibiyotik direnci GÜVENLİK

Bakterilerin antibiyotiklerin etkisine karşı duyarsızlaşması veya bu ilaçların etkisinden kaçınabilme yeteneği geliştirmesidir.

Örnek: Bakterinin kullanılan antibiyotiğe yanıt vermemesi.

Antidot GÜVENLİK

Belirli bir zehirlenmede toksik maddenin etkisini önleyen veya azaltan tedavi edici maddedir.

Örnek: Zehirlenmede özgül karşıt maddenin kullanılması.

AUC FARMAKOKİNETİK

Plazma ilaç konsantrasyonu-zaman eğrisinin altında kalan alandır. İlacın sistemik maruziyetini gösterir.

Örnek: İki formülasyonun sistemik maruziyetini karşılaştırmak.

Birikim FARMAKOKİNETİK

Tekrarlanan ilaç uygulamalarında, eliminasyon tamamlanmadan yeni ilaç alınması sonucunda vücuttaki ilaç miktarının artmasıdır.

Örnek: Böbrek işlevi azaldığında ilacın birikmesi.

Biyoeşdeğerlik DÜZENLEME

İki farmasötik ürünün biyoyararlanım hızının ve miktarının önceden belirlenmiş kabul edilebilir sınırlar içinde benzer olmasıdır.

Örnek: Jenerik ürünün referans ürünle karşılaştırılması.

Biyoyararlanım FARMAKOKİNETİK

Uygulanan etkin maddenin değişmeden sistemik dolaşıma ulaşan miktarını ve ulaşma hızını ifade eder.

Örnek: Ağızdan alınan ilacın dolaşıma ulaşan kısmı.

B–E

Böbrek klirensi FARMAKOKİNETİK

Böbreklerin birim zamanda ilaçtan tamamen arındırdığı varsayılan plazma hacmidir.

Örnek: İdrarla atılan ilacın klirensinin değerlendirilmesi.

Böbrek yetmezliği KLİNİK

Böbreklerin filtrasyon ve düzenleyici işlevlerinin bozulmasıdır. İlaçların atılımını ve tedavi gereksinimlerini etkileyebilir.

Örnek: İlaçların böbrekten atılımının azalması.

Çapraz etkileşim GÜVENLİK

Bir ilacın başka bir ilaç, besin veya maddeyle etkileşerek etkisini ya da güvenliliğini değiştirmesidir.

Örnek: Besin tüketiminin ilaç emilimini değiştirmesi.

Çoklu ilaç kullanımı KLİNİK

Bir hastanın aynı dönemde birden fazla ilaç kullanmasıdır. Klinik gereklilik ve olası etkileşimler açısından değerlendirilmelidir.

Örnek: Birden fazla kronik hastalığı olan hastanın tedavisi.

Dar terapötik indeks GÜVENLİK

Etkili ve toksik ilaç konsantrasyonları arasındaki farkın dar olduğu durumdur. Yakın klinik veya laboratuvar izlemi gerektirebilir.

Örnek: Kan düzeyi yakından izlenen ilaç kullanımı.

Dağılım FARMAKOKİNETİK

İlacın sistemik dolaşımdan vücut dokularına ve sıvılarına geçiş sürecidir.

Örnek: İlacın kandan beyin dokusuna ulaşması.

Dağılım hacmi FARMAKOKİNETİK

Vücuttaki toplam ilaç miktarının plazma konsantrasyonuna oranıyla hesaplanan teorik hacimdir.

Örnek: Dokularda yoğun biriken ilacın dağılım hacminin yüksek olması.

Değişkenlik FARMAKOKİNETİK

İlacın emilim, dağılım, metabolizma ve atılım özelliklerinin bireyler arasında veya aynı bireyde zamanla farklılık göstermesidir.

Örnek: Aynı ilacın farklı hastalarda farklı konsantrasyonlara ulaşması.

Doku dağılımı FARMAKOKİNETİK

İlacın sistemik dolaşımdan farklı organ ve dokulara geçerek bu bölgelere yayılmasıdır.

Örnek: Yağda çözünen ilacın yağ dokusunda birikmesi.

Doz-yanıt ilişkisi FARMAKODİNAMİK

Uygulanan ilaç miktarı veya konsantrasyonu ile ortaya çıkan farmakolojik yanıt arasındaki ilişkidir.

Örnek: İlaç konsantrasyonu arttıkça etkinin değişmesi.

Duyarlılık FARMAKODİNAMİK

Bir organizmanın veya reseptör sisteminin belirli bir ilaç konsantrasyonuna verdiği yanıtın derecesidir.

Örnek: Hastanın düşük ilaç konsantrasyonunda yanıt vermesi.

Eczacılık bakımı ECZACILIK

İlaç tedavisinin güvenli, etkili ve uygun yürütülmesini sağlamak amacıyla eczacının sunduğu hasta odaklı bakım hizmetidir.

Örnek: Hastanın ilaç kullanımının düzenli değerlendirilmesi.

E–F

Eczacılık müdahalesi ECZACILIK

İlaçla ilişkili bir sorunu çözmek veya önlemek amacıyla eczacının gerçekleştirdiği mesleki uygulamadır.

Örnek: Uygunsuz ilaç kullanımının hekimle görüşülmesi.

Eliminasyon FARMAKOKİNETİK

İlacın metabolizma ve atılım süreçleriyle vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

Örnek: İlacın metabolize edilerek idrarla atılması.

Emilim FARMAKOKİNETİK

İlacın uygulandığı bölgeden sistemik dolaşıma geçiş sürecidir.

Örnek: Ağızdan alınan ilaç bağırsaklardan emilebilir.

Emilim biyoyararlanımı FARMAKOKİNETİK

Uygulanan ilacın sistemik dolaşıma değişmeden ulaşan miktarını ifade eder.

Örnek: İntravenöz uygulamada biyoyararlanım yüzde yüzdür.

Enzim indüksiyonu FARMAKOKİNETİK

Bir maddenin metabolize edici enzimlerin aktivitesini veya üretimini artırmasıdır.

Örnek: Enzim indüksiyonu bazı ilaçların etkisini azaltabilir.

Enzim inhibisyonu FARMAKOKİNETİK

Bir maddenin enzim aktivitesini azaltarak ilgili metabolik reaksiyonları yavaşlatmasıdır.

Örnek: Enzim inhibisyonu bazı ilaçların plazma düzeyini artırabilir.

Etkin madde ECZACILIK

Bir farmasötik ürünün tedavi edici veya biyolojik etkisinden sorumlu bileşenidir.

Örnek: Bir tabletin farmakolojik etkisini sağlayan bileşen.

Etkinlik FARMAKODİNAMİK

Bir ilacın reseptör veya biyolojik sistem üzerinden oluşturabileceği maksimum farmakolojik yanıtı ifade eder.

Örnek: İlacın kan basıncını düşürme kapasitesi.

Farmakodinamik FARMAKODİNAMİK

İlaçların organizma üzerindeki biyokimyasal ve fizyolojik etkilerini ve etki mekanizmalarını inceler.

Örnek: Reseptör aktivasyonu farmakodinamik bir süreçtir.

Farmakodinamik FARMAKODİNAMİK

İlaçların organizma üzerindeki biyokimyasal ve fizyolojik etkilerini ve etki mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır.

Örnek: Reseptör etkileşimleri farmakodinamik kapsamındadır.

Farmakokinetik FARMAKOKİNETİK

İlacın vücuttaki emilim, dağılım, metabolizma ve atılım süreçlerini inceler.

Örnek: Böbrek fonksiyonu ilaç atılımını etkiler.

Farmakokinetik FARMAKOKİNETİK

İlacın vücuttaki emilim, dağılım, metabolizma ve atılım süreçlerini inceleyen bilim dalıdır.

Örnek: Böbrek fonksiyonları ilaç farmakokinetiğini etkiler.

F–F

Farmakolojik etkinlik FARMAKODİNAMİK

Bir ilacın biyolojik sistemde oluşturduğu ölçülebilir farmakolojik yanıttır.

Örnek: Reseptör aktivasyonu farmakolojik etkinlik oluşturabilir.

Farmakovijilans GÜVENLİK

İlaçlara bağlı advers reaksiyonların ve diğer güvenlilik sorunlarının saptanması, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine yönelik faaliyetlerdir.

Örnek: Şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi.

Farmakovijilans GÜVENLİK

İlaçların advers etkilerini ve diğer güvenlilik sorunlarını saptama, değerlendirme, anlama ve önleme faaliyetleridir.

Örnek: Advers reaksiyonları farmakovijilans sistemine bildirirsin.

Farmakovijilans GÜVENLİK

İlaçların advers etkilerinin ve diğer güvenlilik sorunlarının saptanması, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine yönelik faaliyetlerdir.

Örnek: Şüpheli advers etkiler farmakovijilans kapsamında bildirilir.

Farmasötik bakım ECZACILIK

Hastanın ilaç tedavisinden en iyi sağlık sonuçlarını elde etmesini amaçlayan sorumlu eczacılık hizmetidir.

Örnek: Eczacı ilaç tedavisini farmasötik bakım kapsamında değerlendirir.

Farmasötik eşdeğerlik ECZACILIK

Aynı etkin maddeyi, aynı miktarda ve aynı farmasötik biçimde içeren ürünlerin eşdeğerliğidir.

Örnek: İki tablet aynı etkin maddeyi içerebilir.

Farmasötik eşdeğerlik DÜZENLEME

Aynı etken maddeyi, aynı miktarda ve aynı farmasötik formda içeren ürünlerin farmasötik özellikler bakımından eşdeğer olmasıdır.

Örnek: Jenerik ürünlerin değerlendirilmesinde farmasötik eşdeğerlik incelenir.

Farmasötik form ECZACILIK

İlacın etken ve yardımcı maddelerinin uygulanmaya uygun şekilde hazırlanmış fiziksel biçimidir.

Örnek: Tablet ve kapsül farklı farmasötik formlardır.

Farmasötik şekil ECZACILIK

Etkin maddenin uygun şekilde hastaya uygulanmasını sağlayan fiziksel ilaç biçimidir.

Örnek: Tablet, kapsül ve şurup farmasötik şekillerdir.

Faz I çalışması DÜZENLEME

Yeni bir ilacın insanlarda güvenliliğini, tolerabilitesini, farmakokinetiğini ve uygun olduğunda farmakodinamiğini değerlendiren klinik araştırma aşamasıdır.

Örnek: İlk insan çalışmasında güvenlilik değerlendirilir.

Faz II çalışması DÜZENLEME

İlacın hedef hasta grubunda ön etkinliğini, güvenliliğini ve uygun kullanım özelliklerini değerlendiren klinik araştırma aşamasıdır.

Örnek: Hastalarda erken etkinlik bulguları incelenir.

Faz III çalışması DÜZENLEME

İlacın etkinlik ve güvenliliğini daha geniş hasta gruplarında, genellikle standart tedavi veya plaseboyla karşılaştırarak değerlendiren aşamadır.

Örnek: Yeni tedavi standart tedaviyle karşılaştırılır.

F–İ

Faz IV çalışması DÜZENLEME

Ruhsatlandırma sonrasında ilacın gerçek yaşam koşullarındaki güvenliliğini, etkinliğini ve uzun dönem sonuçlarını değerlendiren araştırmalardır.

Örnek: Nadir advers etkiler ruhsatlandırma sonrasında izlenir.

Genel ad ECZACILIK

Bir etkin maddeyi ticari markadan bağımsız olarak tanımlayan uluslararası veya ulusal kabul görmüş addır.

Örnek: Reçetede etkin maddenin genel adını kullanırsın.

Geri ödeme DÜZENLEME

İlaç veya sağlık hizmeti maliyetinin belirlenmiş koşullar çerçevesinde yetkili kurum tarafından karşılanmasıdır.

Örnek: İlacın geri ödeme koşullarını kontrol edersin.

Geçimsizlik ECZACILIK

İlaçların birlikte hazırlanması veya uygulanması sırasında fiziksel, kimyasal ya da farmasötik uyumsuzluk oluşmasıdır.

Örnek: Karışımda çökelti oluşması geçimsizliği düşündürür.

Güvenlilik GÜVENLİK

Bir ilacın kullanımına bağlı risklerin, beklenen klinik yararlarıyla birlikte değerlendirilmesidir.

Örnek: Tedavi öncesinde güvenlilik profilini incelersin.

Hacim dağılımı FARMAKOKİNETİK

İlacın vücuttaki dağılımını plazma konsantrasyonuyla ilişkilendiren görünür farmakokinetik hacim parametresidir.

Örnek: Yüksek değer yaygın doku dağılımını gösterebilir.

Hasta uyuncu KLİNİK

Hastanın ilaç kullanımı ve diğer tedavi davranışlarının sağlık profesyoneliyle kararlaştırılan önerilere uygunluğudur.

Örnek: İlaçlarını kararlaştırılan şekilde kullanması uyuncunu gösterir.

Hepatotoksisite GÜVENLİK

İlaç veya diğer maddelere bağlı olarak karaciğerde gelişen zararlı etkidir.

Örnek: Karaciğer enzimlerindeki yükselme hepatotoksisiteyi düşündürebilir.

İlaç etkileşimi GÜVENLİK

Bir ilacın başka bir ilaç, besin veya maddeyle etkileşerek etkisinin ya da güvenliliğinin değişmesidir.

Örnek: İki ilacın birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir.

İlaç hatası GÜVENLİK

İlacın reçetelenmesi, hazırlanması, dağıtılması veya uygulanmasında önlenebilir bir hatanın ortaya çıkmasıdır.

Örnek: Yanlış hastaya ilaç verilmesi ilaç hatasıdır.

İlaç uzlaşısı KLİNİK

Bakım geçişlerinde hastanın kullandığı ilaçların doğrulanması ve yeni tedavi listesiyle karşılaştırılarak farklılıkların giderilmesidir.

Örnek: Hastaneye yatışta mevcut ilaç listesini doğrularsın.

İnhibisyon FARMAKODİNAMİK

Bir biyolojik sürecin, enzimin veya moleküler hedefin aktivitesinin baskılanmasıdır.

Örnek: Enzim inhibisyonu biyokimyasal reaksiyonu yavaşlatabilir.

İ–M

İnteraksiyon GÜVENLİK

İki veya daha fazla madde arasındaki etkileşimdir; ilaçların etkinliğini veya güvenliliğini değiştirebilir.

Örnek: Besin-ilaç interaksiyonu emilimi değiştirebilir.

İntravenöz uygulama ECZACILIK

İlacın doğrudan damar içine verilerek sistemik dolaşıma ulaştırılmasıdır.

Örnek: İntravenöz uygulamada emilim basamağı atlanır.

Kararlı durum FARMAKOKİNETİK

Tekrarlanan ilaç uygulamalarında vücuda giriş ve vücuttan uzaklaştırılma hızlarının dengelendiği farmakokinetik durumdur.

Örnek: Plazma konsantrasyonu kararlı durumda dalgalanarak dengelenir.

Klerens FARMAKOKİNETİK

Bir zaman biriminde ilaçtan tamamen arındırılmış kabul edilen plazma veya kan hacmidir.

Örnek: Böbrek klerensi ilaçların renal eliminasyonunu yansıtır.

Kontrendikasyon KLİNİK

Bir ilaç veya tedavinin belirli bir klinik durumda kullanılmasını sakıncalı ya da kabul edilemez kılan koşuldur.

Örnek: Ciddi alerji, ilgili ilaç için kontrendikasyondur.

Kümülatif toksisite GÜVENLİK

Tekrarlanan maruziyet veya birikim sonucunda zararlı etkilerin zamanla ortaya çıkması ya da şiddetlenmesidir.

Örnek: Uzun süreli maruziyet kümülatif toksisiteye yol açabilir.

Laksatif ECZACILIK

Bağırsak hareketlerini veya dışkılamayı kolaylaştırarak kabızlığın giderilmesinde kullanılan ilaç grubudur.

Örnek: Kabızlık tedavisinde laksatif kullanılabilir.

Laktasyon KLİNİK

Meme bezlerinde süt üretimi ve salgılanması sürecidir.

Örnek: İlaç güvenliği laktasyon döneminde değerlendirilmelidir.

Lökopeni KLİNİK

Kandaki lökosit sayısının referans aralığının altına düşmesidir.

Örnek: Bazı ilaçlar lökopeniye neden olabilir.

Maksimum konsantrasyon FARMAKOKİNETİK

Bir ilacın belirli bir uygulama sonrasında plazmada ulaştığı en yüksek konsantrasyondur.

Örnek: Maksimum konsantrasyon emilim hızından etkilenir.

Maruziyet FARMAKOKİNETİK

Organizmanın belirli bir zaman aralığında ilaç veya metabolitlerine maruz kalma düzeyidir.

Örnek: Böbrek yetmezliği bazı ilaçlara maruziyeti artırabilir.

Medikasyon hatası GÜVENLİK

İlaç istemi, hazırlanması, dağıtımı veya uygulanması süreçlerinde ortaya çıkan önlenebilir olaydır.

Örnek: Yanlış ilacın uygulanması medikasyon hatasıdır.

M–O

Metabolit FARMAKOKİNETİK

Bir ilacın veya başka bir maddenin metabolik dönüşümü sonucunda oluşan kimyasal üründür.

Örnek: Bazı metabolitler farmakolojik aktivite gösterebilir.

Metabolizma FARMAKOKİNETİK

İlacın enzimler aracılığıyla kimyasal değişime uğrayarak farklı bileşiklere dönüştürülmesi sürecidir.

Örnek: Karaciğer ilaç metabolizmasında önemli rol oynar.

Mikrobiyal direnç KLİNİK

Mikroorganizmaların antimikrobiyal ilaçların etkisine karşı doğal veya kazanılmış olarak duyarsız olmasıdır.

Örnek: Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı direnci artırabilir.

Minimum inhibitör konsantrasyon FARMAKODİNAMİK

Bir mikroorganizmanın görünür üremesini belirli laboratuvar koşullarında engelleyen en düşük antimikrobiyal konsantrasyondur.

Örnek: Antibiyotik duyarlılık testlerinde ölçülür.

Monoterapi KLİNİK

Bir hastalığın tedavisinde tek bir ilaç etken maddesinin kullanılmasıdır.

Örnek: Bazı hastalarda monoterapi yeterli olabilir.

Mutlak biyoyararlanım FARMAKOKİNETİK

Ekstravasküler uygulanan ilacın sistemik dolaşıma ulaşan miktarının intravenöz uygulamayla karşılaştırılmasıdır.

Örnek: Mutlak biyoyararlanım emilim ve ilk geçiş metabolizmasından etkilenir.

Nefrotoksisite GÜVENLİK

Bir ilaç veya maddenin böbreklerde yapısal ya da işlevsel hasara neden olabilmesidir.

Örnek: Nefrotoksik ilaçlarda böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Negatif inotropi FARMAKODİNAMİK

Kalp kasının kasılma gücünün azalmasıdır.

Örnek: Bazı ilaçlar negatif inotropik etki gösterir.

Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç ECZACILIK

Ağrı, ateş ve inflamasyonu azaltmak amacıyla kullanılan ilaç grubudur.

Örnek: Bu ilaçlar gastrointestinal yan etkilere neden olabilir.

Nöbet eşiği KLİNİK

Beyinde epileptik nöbet oluşması için gereken uyarılabilirlik düzeyini ifade eden kavramdır.

Örnek: Bazı ilaçlar nöbet eşiğini düşürebilir.

Obezite KLİNİK

Sağlığı olumsuz etkileyebilecek aşırı vücut yağ birikimiyle karakterize kronik ve çok faktörlü bir hastalıktır.

Örnek: Obezite bazı ilaçların dağılım hacmini etkileyebilir.

Oral biyoyararlanım FARMAKOKİNETİK

Ağızdan alınan ilacın değişmeden sistemik dolaşıma ulaşan oranıdır.

Örnek: İlk geçiş metabolizması oral biyoyararlanımı azaltabilir.

O–R

Oral uygulama ECZACILIK

İlacın ağız yoluyla alınarak gastrointestinal sistem üzerinden uygulanmasıdır.

Örnek: Tabletler oral uygulama için hazırlanır.

Ototoksisite GÜVENLİK

Bir ilaç veya maddenin iç kulakta hasara yol açarak işitme veya denge fonksiyonlarını bozmasıdır.

Örnek: Ototoksik ilaçlarda işitme fonksiyonları izlenmelidir.

Palyatif bakım KLİNİK

Ciddi hastalıklarda ağrı ve diğer rahatsız edici semptomları hafifletmeyi, yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bütüncül bakımdır.

Örnek: Semptom kontrolü palyatif bakımın önemli parçasıdır.

Parenteral uygulama ECZACILIK

İlacın gastrointestinal sistem dışında, genellikle enjeksiyon veya infüzyon yoluyla uygulanmasıdır.

Örnek: İntravenöz uygulama parenteral bir yöntemdir.

Plazma proteinlerine bağlanma FARMAKOKİNETİK

İlacın kan dolaşımındaki proteinlere genellikle geri dönüşümlü olarak bağlanmasıdır.

Örnek: Protein bağlanması serbest ilaç konsantrasyonunu etkiler.

Rabdomiyoliz KLİNİK

İskelet kası hücrelerinin parçalanmasıyla hücre içeriğinin kana salındığı, akut böbrek hasarına yol açabilen klinik durumdur.

Örnek: Kas ağrısı, güçsüzlük ve koyu idrar rabdomiyolizi düşündürür.

Radyofarmasötik ECZACILIK

Tanı veya tedavi amacıyla kullanılan, bir veya daha fazla radyoaktif izotop içeren farmasötik üründür.

Örnek: Nükleer tıpta organ görüntülemesi için radyofarmasötik kullanılır.

Randomizasyon KLİNİK

Klinik araştırmalarda katılımcıların tedavi veya kontrol gruplarına rastgele atanması yöntemidir.

Örnek: Randomizasyon, gruplar arasındaki seçim yanlılığını azaltır.

Renal klirens FARMAKOKİNETİK

Böbreklerin birim zamanda ilaçtan temizlediği varsayılan plazma hacmidir.

Örnek: Renal klirens böbrek fonksiyonlarından etkilenir.

Rezidüel etki FARMAKODİNAMİK

İlacın farmakolojik etkisinin, plazma konsantrasyonu azaldıktan veya ilaç kesildikten sonra devam etmesidir.

Örnek: Rezidüel sedatif etki gündüz uykululuğuna neden olabilir.

Reçete ECZACILIK

Yetkili sağlık profesyonelinin hastanın ilaç tedavisini ve gerekli kullanım talimatlarını belirttiği yazılı veya elektronik belgedir.

Örnek: Reçeteyi hazırlarken ilaç etkileşimlerini kontrol et.

Reçeteleme ECZACILIK

Hastanın klinik gereksinimlerine göre uygun ilaç tedavisinin seçilmesi, düzenlenmesi ve belgelenmesi sürecidir.

Örnek: Reçeteleme öncesinde hastanın alerjilerini değerlendir.

R–T

Risk değerlendirmesi GÜVENLİK

Bir ilaç veya tedaviyle ilişkili olası zararların gerçekleşme olasılığı ve ciddiyeti açısından sistematik olarak incelenmesidir.

Örnek: Tedavi öncesinde kanama riskini değerlendir.

Salım FARMAKOKİNETİK

Etkin maddenin farmasötik dozaj şeklinden ayrılarak biyolojik ortama geçmesi sürecidir.

Örnek: Uzatılmış salım, etkin maddenin kontrollü açığa çıkmasını sağlar.

Sağkalım KLİNİK

Bir hastanın belirli bir süre boyunca hayatta kalmasını ifade eden klinik sonuç ölçütüdür.

Örnek: Araştırmada beş yıllık sağkalım oranı incelendi.

Sağlık teknolojisi değerlendirmesi DÜZENLEME

İlaç ve sağlık uygulamalarının klinik etkinlik, güvenlik, ekonomik ve toplumsal etkiler açısından sistematik değerlendirilmesidir.

Örnek: Yeni tedavinin maliyet etkinliğini sağlık teknolojisi değerlendirmesiyle incele.

Semptomatik tedavi KLİNİK

Hastalığın temel nedenini ortadan kaldırmayı amaçlamadan belirtilerini hafifletmeye yönelik tedavidir.

Örnek: Ağrı kesici kullanımı semptomatik tedaviye örnektir.

Serum düzeyi FARMAKOKİNETİK

Bir ilacın kan serumunda ölçülen konsantrasyonudur.

Örnek: Serum düzeyini terapötik ilaç izlemiyle takip et.

Seçicilik FARMAKODİNAMİK

Bir ilacın belirli reseptörlere veya biyolojik hedeflere diğerlerine kıyasla daha fazla etki gösterme özelliğidir.

Örnek: Yüksek seçicilik bazı istenmeyen etkileri azaltabilir.

Sistemik etki FARMAKODİNAMİK

İlacın sistemik dolaşıma ulaşarak uygulama bölgesi dışındaki organ ve dokularda oluşturduğu etkidir.

Örnek: Emilen bir ilaç sistemik etki gösterebilir.

Sitotoksisite GÜVENLİK

Bir maddenin hücrelere zarar verme veya hücre ölümüne neden olma özelliğidir.

Örnek: Sitotoksisite testleri hücresel güvenliği değerlendirmeye yardımcı olur.

Stabilite ECZACILIK

Bir ilacın belirlenen saklama koşullarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini kabul edilebilir sınırlar içinde koruma yeteneğidir.

Örnek: Uygun saklama koşulları ilacın stabilitesini korur.

Şelasyon FARMAKODİNAMİK

Bir maddenin metal iyonlarına birden fazla bağlanma noktası üzerinden bağlanarak halka yapılı kompleks oluşturmasıdır.

Örnek: Şelasyon tedavisi bazı ağır metal zehirlenmelerinde kullanılır.

Terapötik aralık FARMAKOKİNETİK

Bir ilacın etkili olduğu ve toksisite riskinin kabul edilebilir düzeyde kaldığı plazma konsantrasyonu aralığıdır.

Örnek: Dar terapötik aralıklı ilaçlarda yakın izlem gerekir.

T–Z

Terapötik ilaç izlemi KLİNİK

İlaç konsantrasyonlarının biyolojik örneklerde ölçülerek tedavinin etkinlik ve güvenlik açısından değerlendirilmesi ve bireyselleştirilmesidir.

Örnek: Terapötik ilaç izlemi toksisite riskini azaltmaya yardımcı olur.

Toksisite GÜVENLİK

Bir ilaç veya maddenin organizmada hücresel, doku düzeyinde ya da sistemik zararlı etkiler oluşturmasıdır.

Örnek: Karaciğer toksisitesini tedavi sırasında izle.

Tolerans FARMAKODİNAMİK

Tekrarlanan ilaç maruziyeti sonucunda aynı maruziyet düzeyinde oluşan farmakolojik yanıtın azalmasıdır.

Örnek: Uzun süreli kullanım bazı ilaçlara tolerans geliştirebilir.

Trombositopeni KLİNİK

Kandaki trombosit sayısının laboratuvarın belirlediği normal referans aralığının altına düşmesidir.

Örnek: Bazı ilaçlar trombositopeniye neden olabilir.

Uyarı GÜVENLİK

Bir ilacın kullanımıyla ilişkili önemli riskleri, dikkat edilmesi gereken durumları veya alınması gereken önlemleri bildiren güvenlik bilgisidir.

Örnek: Gebelikte kullanım uyarılarını mutlaka incele.

Uygunluk KLİNİK

İlaç tedavisinin hastanın klinik gereksinimleri, endikasyonu, etkinlik, güvenlik ve bireysel özellikleriyle uyumlu olmasıdır.

Örnek: Antibiyotik seçiminin enfeksiyona uygunluğunu değerlendir.

Ürün bilgisi DÜZENLEME

Bir ilacın onaylanmış endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, uyarılarını, yan etkilerini ve kullanım özelliklerini açıklayan resmi bilgilendirmedir.

Örnek: Ürün bilgisinden kontrendikasyonları kontrol et.

Varyasyon DÜZENLEME

Ruhsatlı bir ilacın ruhsat koşullarında veya onaylanmış dosyasında yapılan, düzenleyici değerlendirme gerektiren değişikliktir.

Örnek: Üretim değişikliği için varyasyon başvurusu gerekebilir.

Yan etki GÜVENLİK

Bir ilacın normal kullanımında ortaya çıkan, istenmeyen ve genellikle zararlı farmakolojik etkidir.

Örnek: Tedavi sırasında gelişen döküntüyü yan etki açısından değerlendir.

Yarı ömür FARMAKOKİNETİK

Eliminasyon fazında bir ilacın plazma konsantrasyonunun veya vücuttaki miktarının yarıya düşmesi için gereken süredir.

Örnek: Uzun yarı ömür ilacın vücutta daha uzun kalmasına neden olabilir.

Zehirlenme GÜVENLİK

Bir maddeye maruziyet sonucunda organizmada zararlı biyolojik etkiler ve klinik bozukluklar ortaya çıkmasıdır.

Örnek: Zehirlenme şüphesinde acil klinik değerlendirme yap.