

- 1 (1) ① E ② G ③ H ④ B
 ⑤ C ⑥ D ⑦ F ⑧ A
 (2) ① エ ② ア ③ イ, ウ
 (3) (ロ→) D→E→H→G (→こう門)
- 2 (1) じゅう毛
 (2) B: 毛細血管 C: リンパ管
 (3) ア, エ
- 3 (1) ヨウ素液 (2) 青むらさき色
 (3) A, C, D (4) B

解説◆

- (1) 図のAはだ液せん, Bはかん臓, Cはたんのう, Dは食道, Eは胃, Fはすい臓, Gは大腸, Hは小腸です。
- ② Gの大腸では, 小腸で吸収されなかった残りかすから水分が吸収され, その後, 残りかすはこう門から出されます。
- ④ Bのかん臓では, ブドウ糖をグリコーゲンに変えてたくわえたり, たくわえたグリコーゲンをブドウ糖に変えて血液中に流したりして, 血液中のブドウ糖の量を調節します。
- (2) 小腸のじゅう毛から吸収されるときには, 炭水化物はブドウ糖, タンパク質はアミノ酸, しぼうはしぼう酸とモノグリセリドに変化しています。
- (3) 食べ物は, ロ→食道→胃→小腸→大腸→こう門の順に通ります。この1本の管を消化管といいます。
- (2)(3) ブドウ糖とアミノ酸は毛細血管に入り, しぼう酸とモノグリセリドはじゅう毛の中でしぼうにもどったあと, リンパ管に入ります。
- (1)(2) でんぷんにヨウ素液を加えると青むらさき色に変化します。
- (3)(4) Bでは, だ液のはたらきによって, でんぷんが分解されて麦芽糖に変化するので, ヨウ素液を加えても青むらさき色にはなりません。また, ベネジクト液を加えて加熱すると, 赤かっ色のちんでんができます。Dにもだ液は入っていますが, 温度が低いのでだ液ははたらきません。