

◆解答◆

- ① (1) イ (2) 堆積作用
 (3) ① イ ② ア ③ ウ
- ② (1) 凝灰岩 (2) マグマ
 (3) C (4) ウ (5) 示相化石
- ③ (1) ① 震度 ② 10
 ③ マグニチュード
 (2) 津波 (3) ア
- ④ (1) 最も長い：C 最も短い：B
 (2) B：イ C：ア D：イ

◆解説◆

- ① (1) アは中流、イは上流、ウは下流の特ちょうです。
- (2) 川が山地から平地に出ると、流れが急におそくなるため、堆積作用が大きくなり、扇状地ができます。
- ② (3) ねん土の層は水を通しにくいので、ねん土の層の上からわき水が出ています。
- (4) シジミは淡水の湖、または汽水域（川の水と海の水が混じり合うところ）の河口付近に生息しています。
- ③ (2) 海底を震源とした地震において、海底の地形が急激に変化することによって起こることがある大きな波を津波といい、沿岸地方に大きな被害が発生することがあります。
- (3) 最初に起こる小さなゆれXを初期微動といい、P波によって起こります。そのあとで起こる大きなゆれYを主要動といい、S波によって起こります。
- ④ (1) ふり子の周期はふり子の長さのみにによって決まり、ふり子の長さが長いほど周期が長くなります。よって、ふり子の長さが最も長いCが木片に当たるまでの時間が最も長くなり、ふり子の長さが最も短いBが木片に当たるまでの時間が最も短くなります。
- (2) ふり子のおもりをはなす高さが高く、おもりの重さが重いときに、木片が動いた距離は最も大きくなります。よって、Aよりもおもりをはなす高さが高いCでは10cmより大きくなり、鉄よりも軽いガラスのおもりをつるしたDでは10cmよりも小さくなります。